

$$f(0)=0$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{z^7}{(z+2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (z-0)^n \stackrel{\downarrow}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n! (n-1)}{2^n} \cdot \frac{1}{n!} z^n =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-z}{2}\right)^n (n-1) \quad \forall z \in D(0,2).$$

e) $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2} \quad z_0 = -1.$

holomorfa en $D(-1,2)$

$$f(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2} = \frac{z^2 - 2z + 1 + 2z - 1}{z^2 - 2z + 1} = 1 + \frac{2z-1}{(z-1)^2} = 1 + \frac{2}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2}$$

Veamos que $f^{(n)}(z) = 2(-1)^n n! (z-1)^{-n-1} + (-1)^n (n+1)! (z-1)^{-n-2}$

Para $n=1$

$$f'(z) = 2(-1)(z-1)^{-2} + (-2) \cdot (z-1)^{-3} = 2 \cdot (-1) \cdot 1! \cdot (z-1)^{-1-1} + (-1) \cdot 2! \cdot (z-1)^{-1-2}$$

Supuesto para n

$$f^{(n+1)}(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(2(-1)^n n! (z-1)^{-n-1} + (-1)^n (n+1)! (z-1)^{-n-2} \right) =$$

$$= 2(-1)^n n! (-n-1) (z-1)^{-n-1-1} + (-1)^n (n+1)! (-n-2) (z-1)^{-n-2-1} =$$

$$= 2(-1)^{n+1} (n+1)! (z-1)^{-(n+1)-1} + (-1)^{n+1} (n+2)! (z-1)^{-(n+1)-2}$$

$$\Rightarrow f^{(n+1)}(-1) = 2(-1)^{n+1} n! (-2)^{-n-1} + (-1)^{n+1} (n+1)! (-2)^{-n-2} =$$

$$= (-1)^{n+1} n! (-2)^{-n-1} \left(2 + \frac{n+1}{2} \right) = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1} \cdot (-1)^{n+1}} n! \left(\frac{n+5}{2} \right) =$$

$$= - \frac{(n+5) \cdot n!}{2^{n+2}}$$



Asignatura..... Fecha

Alumno/a..... Curso..... Nº.....

Apellidos

Nombre

Por tanto

$$f(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-1)}{n!} (z+1)^n \stackrel{f(-1)=1/4}{=} \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{(n+5)n!}{2^{n+2}} \frac{1}{n!} (z+1)^n =$$
$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (n+5) \left(\frac{z+1}{2} \right)^n$$

3.- Sea f una función entera tal que $|f(z)| \geq |z| \quad \forall z \in \mathbb{C}$. ¿Qué se puede decir de f ?

$$\text{Si } z \neq 0 \Leftrightarrow |z| > 0 \Rightarrow |f(z)| \geq |z| > 0 \Rightarrow f(z) \neq 0$$

Veamos que $f(0) = 0$

Si $f(0) \neq 0$ entonces f no se anula en \mathbb{C}

Por tanto la función $g(z) = \frac{z}{f(z)}$ es entera, pero

$$|g(z)| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z}{f(z)} \right| \leq 1 \Leftrightarrow |z| \leq |f(z)|$$

Por el Teorema de Liouville $g(z)$ es constante

$$\text{Pero } g(0) = 0 \quad \text{y } g(1) = \frac{1}{f(1)} \neq 0 \quad !!$$

Por tanto $f(0) = 0$. Como f tiene un cero en 0

$$\Rightarrow f(z) = z \cdot h(z) \quad \text{con } h(z) \text{ una función entera.}$$

$$|f(z)| = |z \cdot h(z)| = |z| \cdot |h(z)| \geq |z| \Rightarrow |h(z)| \geq 1.$$