3° de Secundaria 2024-2025 Unidad 3

Obtenidos

Practica la Unidad 3

Nombre del alumno: Fecha:

Aprendizajes:

- Comprende las series y sucesiones cuadraticas y geométricas y sus respectivas formulaciones algebraicas.
- Reconoce y aplica los principales productos notables y su interpretación geométrica.
- Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.
- In Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
- Usa las funciones trigonométricas para resolver problemas geométricos con aplicación en la vida diaria.

Pun	tu	aci	101	٦:

Pregunta	Puntos	Obtenidos	Pregunta	Punt
1	6		13	6
2	3		14	6
3	3		15	12
4	3		16	10
5	3		17	3
6	3		18	3
7	3		19	3
8	3		20	3
9	3		21	6
10	3		22	6
11	3			
12	6		Total	100

Sucesiones cuadráticas y geométricas

Ejemplo 1

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

$$2n^2 + 5n + 2$$

$$9,20,35,54$$
 b n^2+5n

6, 14, 24, 36

$$n = 1 (1)^2 + 5(1) = 6$$

$$n = 2 (2)^2 + 5(2) = 14$$

$$n = 3 (3)^2 + 5(3) = 24$$

$$n = 4 (4)^2 + 5(4) = 36$$

Ejercicio 1 de 6 puntos

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

$$a$$
 $2n^2$

b
$$5n^2 + 2n$$

$$n^2 - 6n$$




Completando la sucesión cuadrática


Ejemplo 2

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a 5, 12, 21, **32**, **45**, **60**, ...



 $b = -5, -8, -9, -8, -5, 0, \dots$



Ejercicio 2 de 3 puntos

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones cuadráticas:

c 8, 20, 36, ___,__, ...

Término general

Ejemplo 3

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a 8, 15, 24, 35, . . .

b 6, 9, 14, 21, . . .

$$n^2 + 4n + 3$$

 $n^2 + 5$

Ejercicio 3 de 3 puntos

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a 4, 10, 18, 28, . . .

b 0, 3, 8, 15, . . .

c 1, 13, 33, 61, ...



Sucesión geométrica

Ejemplo 4

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

 $a_n = -\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

$$-1, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{25}, -\frac{1}{125}$$

b $a_n = 4(2)^{n-1}$

4, 8, 16, 32

Ejercicio 4 de 3 puntos

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

 $a_n = (-2)^{n-1}$

b $a_n = (4)^{n-1}$

 $a_n = 2(5)^{n-1}$

Razón de una sucesión geométrica

Ejemplo 5

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

 $\mathbf{a} \ 3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \dots \ r = \frac{1}{4}$

b $3, \frac{6}{5}, \frac{12}{25}, \frac{24}{125}, \dots$ $r = \frac{2}{5}$



Ejercicio 5 de 3 puntos

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:





Productos notables

Binomios conjugados

Ejemplo 6

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(x-15)(x+15) = x^2-225$$

b
$$(9x-1)(9x+1) = 81x^2 - 1$$

Ejercicio 6

de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(x+7)(x-7) =$$

b
$$(x-12y)(x+12y) =$$

$$(10x - 9y)(10x + 9y) =$$

Binomios con término común

Ejemplo 7

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(x-5)(x-6) = x^2 - 11x + 30$$

b
$$(x+4)(x+6) = x^2 + 10x + 24$$

Ejercicio 7

de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(x-2)(x+6) =$$

b
$$(x+6)(x-10) =$$

$$(x-9)(x-2) =$$

Binomio al cuadrado

Ejemplo 8

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

b
$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

Ejercicio 8

de 3 puntos

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

$$(x+7y)^2 =$$

b
$$(x-9)^2 =$$

$$(6x+5y)^2 =$$

Binomios de la forma (mx+a)(nx+b)

Ejemplo 9

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(4x-3)(2x+9) = 8x^2 + 30x - 27$$

b
$$(3x-5)(3x+6) = 9x^2 + 3x - 30$$

Ejercicio 9

de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

$$(3x-3)(2x-8) =$$

b
$$(4x-1)(3x+2) =$$

$$(3x-3)(2x-8) =$$

Binomio al cubo

Ejemplo 10

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a
$$(5x-2y)^3 = 125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$$
 b $(x-4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

b
$$(x-4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$$

Ejercicio 10

de 3 puntos

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

$$(x-3)^3 =$$

b
$$(2x+5)^3 =$$

$$|c|(3x-4)^3 =$$

Ecuaciones cuadráticas

Discriminante

Ejemplo 11

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

$$25x^2 - 10x + 1$$

$$d=0$$
, Soluciones: 1

b
$$3x^2 + 8x - 9$$

b
$$3x^2 + 8x - 9$$
 d=172, Soluciones: 2

$$d = b^2 - 4ac$$

$$d = (-10)^2 - 4(25)(1)$$

$$d = 100 - 100$$

$$d = 0$$

$$d = b^2 - 4ac$$

$$d = (8)^2 - 4(3)(-9)$$

$$d = 64 + 108$$

$$d = 172$$

Ejercicio 11 de 3 puntos

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

b
$$x^2 - 5x$$

$$3x^2 + 7x + 13$$

$$x^2 + 14x + 49$$

$$x^2 - 5x$$





Ecuaciones cuadráticas incompletas

Ejemplo 12

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

 $4x^2 - 7x = 0$

b
$$3x^2 - 4x = 0$$

$$0 = 4x^2 - 7x$$

$$0 = x(4x - 7)$$

$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{7}{4}$$

$$0 = 3x^2 - 4x$$

$$0 = x(3x - 4)$$

$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{4}{3}$$

Ejercicio 12 de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

 $x^2 + 9x = 0$

b $x^2 - 49 = 0$

 $x^2 + 4x = 0$

Ecuaciones cuadráticas completas

Ejemplo 13

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

 $x^2 - 13x + 30 = 0$

b
$$x^2 + 2x - 63 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm 7}{2 \cdot 1}$$

$$c_{1,2} = \frac{(2)^{n}}{2 \cdot 1}$$
$$-(-13) + 7$$

$$x_1 = \frac{-(-13) + 7}{2 \cdot 1} = 10$$

$$x_2 = \frac{-(-13) - 7}{2 \cdot 1} = 3$$

$$x + 2x - 65 = 0$$

$$x_{1, 2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_{1, 2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$

$$x_{1} = \frac{-2 + 16}{2 \cdot 1} = 7$$

$$-2 - 16$$

$$x_{1,\,2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$

$$x_1 = \frac{-2+16}{2\cdot 1} = 7$$

$$x_2 = \frac{-2 - 16}{2 \cdot 1} = -9$$

Ejercicio 13

de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

- $x^2 3x 40 = 0$
- $x^2 2x 15 = 0$

- **b** $x^2 3x 28 = 0$
- **d** $2x^2 9x 5 = 0$




b


Teorema de Pitágoras

Hallando la hipotenusa y catetos

Ejemplo 14

En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:





a

x = 38.11

$$c^{2} = a^{2} + b^{2}$$

$$44^{2} = 22^{2} + x^{2}$$

$$44^{2} - 22^{2} = x^{2}$$

$$\sqrt{44^{2} - 22^{2}} = x$$

$$38.11 \simeq x$$

x = 21.54

$$c^{2} = a^{2} + b^{2}$$

$$x^{2} = 8^{2} + 20^{2}$$


$$x^{2} = 64 + 400$$


$$x = \sqrt{464}$$

$$x \approx 21.54$$

Ejercicio 14 de 6 puntos En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado \boldsymbol{x} que falta: С a е x =x =x =21 Ь d f x =x =

Áreas y perímetros







Resolución de problemas


Ejemplo 16	
Resuelve los siguientes problemas:	
O Desde la ventana de una torre en la playa se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros de la torre. ¿A qué altura está la ventana?	b Calcula la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 12 cm y sus lados iguales miden 25 cm.
13	24.26
Ejercicio 16	de 10 puntos
Resuelve los siguientes problemas: © En una rampa, un ciclista avanza una distancia real e de 78 metros. ¿Cuál es la altura de la rampa?	de 85 metros mientras que avanza una distancia horizontal
	s y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya de n si sale desde el punto de penalti y se estrella en la parte

Trigonometría


Identificando lados








Identificando funciones







Encontrando lados



Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:





x = 37.08

x = 24.84


Ejercicio 20

a


de 3 puntos

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:

Ь




x =



Encontrando ángulos



Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



x = 13.13

x = 34.33


Ejercicio 21

de 6 puntos


С

sando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:

b



b x =



Resolución de problemas

Ejer	mplo 21				
Resi	uelve los siguientes problemas:				
a	El piloto de un avión debe aproximarse a la pista de aterrizaje con un ángulo de 7° con respecto a la horizontal. Si vuela a una altura de 8,000 metros, ¿a qué distancia de la pista debe iniciar su descenso?	Ь	El sonar de un barco de salvamiento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 40°. Un buzo es bajado 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio?		
	65154.77		47.67		
 Ejer	rcicio 22		de 6 puntos		
	uelve los siguientes problemas: Cuando el sol se encuentra a 20° sobre el horizonte 50 m de altura?	, ¿cuá	nto medirá la sombra proyectada por un edificio de		
Ь	b Una escalera de extensión de 7.62 metros recargada contra un edificio forma un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura del edificio llega la escalera?				
С	La diagonal de un rectángulo mide 8.25 cm y el mer por la diagonal y el lado mayor del rectángulo.	nor de	e sus lados mide 3.14 cm. Calcula el ángulo formado		