

Nombre del alumno: _____

Soluciones propuestas

Fecha: _____

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ☒ No se permite salir del salón de clases.
- ☒ No se permite intercambiar ningún tipo de material.
- ☒ No se permite el uso de celular o cualquier otro dispositivo.
- ☒ No se permite el uso de apuntes, libros, notas o formularios.
- ☒ No se permite mirar el examen de otros alumnos.
- ☒ No se permite la comunicación oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Aprendizajes a evaluar:

- ☒ Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.
- ☒ Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten.
- ☒ Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros sistemas).
- ☒ Describe las características y dinámica del Sistema Solar.
- ☒ Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.

Calificación:

Pregunta	Puntos	Obtenidos
1	10	
2	20	
3	12	
4	6	
5	20	
6	10	
7	10	
8	10	
Total	98	

1 [10 puntos] Relaciona cada enunciado con su respuesta.

- | | |
|--|---|
| Es un indicador de su distancia si se conoce cuán luminosa es una estrella. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Radiotelescopios |
| Nos indica la temperatura de una estrella. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> El brillo |
| Telescopios que permiten observar las ondas de radio emitidas por algunos cuerpos celestes. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Electromagnética |
| Radiación que emiten algunos cuerpos celestes que nos permite obtener nueva afirmación acerca de ellos. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> El color |

2 [20 puntos] Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Microondas	1×10^{-2}	3×10^{10}	1.98×10^{-23}
Rayos X	2×10^{-10}	1.5×10^{18}	9.939×10^{-16}
Radiación infrarroja	8.33×10^{-6}	3.6×10^{13}	2.3×10^{-20}

Tabla 1: Comparación entre algunos tipos de ondas electromagnéticas.

Solución:

Microondas:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{10} \quad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{10} = 1.98 \times 10^{-23}$$

Rayos X:

$$\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1.5 \times 10^{18}} = 2 \times 10^{-10} \quad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{18} = 9.939 \times 10^{-16}$$

Radiación infrarroja:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{8.33 \times 10^{-6}} = 3.6 \times 10^{13} \quad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 3.6 \times 10^{13} = 2.3 \times 10^{-20}$$

3 [12 puntos] Elige la respuesta correcta.

3a La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.

- A.** Ley de Hook
- B.** Ley de Faraday
- C. Ley de Hubble**
- D.** Ley de Moore

3b Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo.

- A.** Supercúmulo
- B.** Concilio de Gigantes
- C.** Cúmulos de galaxias
- D.** Grupo local

3c Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más.

- A.** Supercúmulo
- B.** Concilio de Gigantes
- C.** Cúmulos de galaxias
- D.** Grupo local

3d Indica que el Universo se expande.

- A.** El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
- B. El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.**
- C.** Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
- D.** La Teoría de la Relatividad General

3e Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc.

- A.** Supercúmulo
- B.** Concilio de Gigantes
- C.** Cúmulos de galaxias
- D.** Grupo local

3f Grupo formado por cúmulos de galaxias.

- A.** Supercúmulo
- B.** Concilio de Gigantes
- C.** Cúmulos de galaxias
- D.** Grupo local

4 [6 puntos] Elige la respuesta correcta.

4a Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.

- A. Bastones
- B. Esferas
- C. **Conos**
- D. Rizos

4b Perturbación eléctrica que se genera cuando una neurona recibe un estímulo.

- A. Impulso eléctrico
- B. **Impulso nervioso**
- C. Impulso magnético
- D. Impulso atómico

4c Pulso eléctrico que se propaga a través de la neurona.

- A. **Potencial de acción**
- B. Potencial eléctrico
- C. Potencial magnético
- D. Energía potencial

5 [20 puntos] El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz: $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ años luz}$. Como no es muy diferente de él, en realidad lo práctico consiste en usar sus múltiplos, como el kiloparsec, $1 \text{ kpc} = 10^3 \text{ pc}$, o el megaparsec, $1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$. El uso del parsec en la astronomía es una cuestión más bien de tradición.

5a ¿A cuántos metros equivale un parsec?

Solución:

Usando la fórmula $d = vt$, donde d es la distancia, v es la velocidad y t es el tiempo, la distancia d que hay en un año luz es:

$$\begin{aligned} d &= (3 \times 10^8 \text{ m/s}) (365.25 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ s}) \\ &= 9.46 \times 10^{15} \text{ m} \end{aligned}$$

Si 1 año luz equivale a $9.46 \times 10^{15} \text{ m}$, entonces $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ años luz} \cdot 9.46 \times 10^{15} \text{ m} = 3.08 \times 10^{16} \text{ m}$

5b La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. ¿En cuánto tiempo “chocará” con ella?

Solución:

Sabemos que $1 \text{ pc} = 3.08 \times 10^{13} \text{ km}$, entonces

$$\begin{aligned} 650 \text{ kpc} &= 650 \times 10^3 \text{ pc} \\ &= 650 \times 10^3 \times 3.08 \times 10^{13} \text{ km} \\ &= 2.002 \times 10^{19} \text{ km} \end{aligned}$$

Usando la fórmula $t = \frac{d}{v}$, el tiempo t en segundos es:

$$\begin{aligned} t &= \frac{2.002 \times 10^{19} \text{ km}}{350 \text{ km/s}} \\ &= 5.72 \times 10^{16} \text{ s} \\ &= 1,812.5 \text{ millones de años} \end{aligned}$$

6 [10 puntos] Elige la respuesta correcta a cada inciso.

6a Longitud del diámetro del Universo.

- A. Un millón de años luz.
- B. **Cien mil millones de años luz.**
- C. Un billón de años luz.
- D. Mil millones de años luz.

6b Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.

- A. 4.9 %
- B. 26.8 %
- C. 33.3 %
- D. **68.3 %**

6c Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.

- A. 4.9 %
- B. **26.8 %**
- C. 33.3 %
- D. 68.3 %

6d Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.

- A. **4.9 %**
- B. 26.8 %
- C. 33.3 %
- D. 68.3 %

6e Antigüedad estimada del Universo.

- A. 14,800 millones de años
- B. 10,800 millones de años
- C. 15,800 millones de años
- D. **13,800 millones de años**

7 [10 puntos] Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

7a En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.

- A. Verdadero B. Falso

7b La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.

- A. Verdadero B. Falso

7c La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.

- A. Verdadero B. Falso

7d El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.

- A. Verdadero B. Falso

7e) Cuando se viaja de norte a sur, o viceversa, la altura aparente de las estrellas cambia.
A. Verdadero B. Falso

8) [10 puntos] Elige la respuesta correcta.

8a) Instrumento gracias al cual es posible observar cuerpos celestes muy lejanos.
A. Microscopio
B. Estetoscopio
C. Telescopio
D. Electroscopio

8b) Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.
A. Eclipse
B. Declinación
C. Transformación
D. Paralaje

8c) Aparato que sirve para medir ángulos muy pequeños que ayudó a medir la distancia a la cual se encuentran algunos objetos celestes.
A. Vernier
B. Micrómetro
C. Astrolabio
D. Transportador

8d) Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.
A. Radiografía
B. Radiometría
C. Fotografía
D. Espectroscopía