

Estimado/a paciente:

Con la finalidad de garantizar la precisión y seguridad del resultado de la prueba de **Intolerancia a la Lactosa**, solicitamos seguir y cumplir a cabalidad el siguiente protocolo, previo a la realización de la prueba.

1. PREPARACIÓN DEL PACIENTE E INTERFERENCIAS

1. No se tomarán antibióticos ni aspirina ni laxantes (incluyendo Plantaben u otras fibras) ni Prebióticos ni Procinéticos (Motilium, Cidine, Bloaston o similares) durante **cuatro (4) semanas** antes de la prueba, y debe permanecer en ayunas de 8 a 12 horas previas a la prueba.
2. No se realizará la prueba si se ha realizado una **colonoscopia** o preparación de limpieza intestinal por otro motivo durante las últimas cuatro (4) semanas antes de la prueba, o si ha presentado un cuadro diarreico en los 7 días previos a realizarse la prueba.
3. Se efectuará una **dieta sin azúcares ni féculas 24 horas antes** de la prueba. No ingerir habas, salvado, cereales con fibra, chicles ni caramelos el día antes de la prueba.
4. El día de la exploración **no se fumará** una hora antes ni durante la prueba.
5. **No hacer ejercicio físico intenso** 6 horas antes de la prueba, ni durante la prueba (se recomienda permanecer sentado).
6. El día de la prueba acudir **en ayunas de 8 a 12 horas** (no beber agua).
7. El día de la prueba el paciente debe **cepillarse los dientes**. Puede hacer enjuague bucal con Clorhexidina.
8. La prueba tiene una **duración de 3 horas**.

2. NORMAS DIETÉTICAS PREVIAS A LA PRUEBA

A continuación se detallan los alimentos que **NO SE PUEDEN CONSUMIR** el día previo a la prueba y los que **SÍ SE PUEDEN INGERIR**:

✗ NO PUEDE CONSUMIRSE	✓ SÍ PUEDE CONSUMIRSE
• Leche y productos lácteos (yogures, quesos, mantequillas).	• Huevos (tortilla francesa, huevo duro o frito).
• Cereales, pan, galletas, tostadas, biscotes, tortitas.	• Arroz blanco (sin ajo, cebolla ni salsa de tomate).
• Productos de pastelería o bollería (magdalenas, donuts), dulces (caramelos, chicles) y mermeladas.	• Embutidos no elaborados (jamón serrano o ibérico).
• Legumbres, patata, verduras y vegetales.	• Carne; pescado blanco o azul.
• Frutas y zumos de frutas.	• Agua, té e infusiones sin azúcar.
• Refrescos.	
• Embutidos elaborados (jamón cocido, pavo, mortadela, fuet, salchichón, etc.).	
• Frutos secos.	
• Azúcar blanco o morena, ni edulcorantes.	



INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA: INTOLERANCIA A LA LACTOSA

3. EJEMPLO DE DIETA

Desayuno

- Tortilla de 2 huevos, o 1 yema y 2 claras, más 2 o 3 lonchas de jamón serrano o ibérico.
- Té, infusión o agua.

Comida / Cena

- Arroz blanco sin condimentación, solo con aceite de oliva o hierbas aromáticas.
- Carne (pollo, pavo, conejo o bistec) o pescado (blanco o azul).
- **NO POSTRE.**

Importante: esta prueba se realiza únicamente **bajo previa cita** en nuestro laboratorio Matriz, ubicado en la calle Emma E. Ortiz Bermeo y Justino Cornejo, Mz. 14 Solar 2 (frente al Parque Japonés). No se realiza domingos ni feriados.

Ante cualquier duda sobre la preparación, comuníquese con nosotros antes de la fecha de su cita. Gracias por confiar en **INTERLAB**, el laboratorio clínico de su confianza.