

Funções de pertinência

- ▶ A **função de pertinência** é que define um dado conjunto difuso.
- ▶ Estas funções podem ter qualquer aspeto ou forma, mas têm no entanto de satisfazer as seguintes restrições:
 - ▶ O contradomínio da função tem de ser o intervalo $[0, 1]$.
 - ▶ A cada valor $x \in X$ deve corresponder apenas um valor de $\mu_A(x)$.

Luís A. Alexandre (UBI)

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

7 / 22

Operadores difusos

- ▶ Vejamos alguns **operadores** que podem agir sobre os conjuntos difusos.
- ▶ No que se segue consideramos X como o domínio e A e B dois conjuntos difusos definidos em X .
- ▶ **Igualdade** de conjuntos difusos: dois conjuntos difusos são iguais sse $\mu_A(x) = \mu_B(x), \forall x \in X$.
- ▶ **Pertinência** em conjuntos difusos: A é sub-conjunto de B sse $\mu_A(x) \leq \mu_B(x), \forall x \in X$. Nesse caso podemos escrever $A \subseteq B$.

Luís A. Alexandre (UBI)

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

9 / 22

Operadores difusos: exemplo

- ▶ Consideremos que o conjunto difuso A representa números de vírgula flutuante com valores aproximadamente entre $[50, 80]$ e B representa números de cerca de 40.
- ▶ A seguinte figura representa as funções de pertinência:




Fig. de Engelbrecht p. 217

Luís A. Alexandre (UBI)

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

11 / 22

Função de pertinência: exemplo

- ▶ Consideremos o seguinte conj. difuso: o das pessoas altas.
- ▶ Podemos definir uma função de pertinência para este conj. da seguinte forma:

$$\text{Alto}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{Altura}(x) < 1.5\text{m} \\ (\text{Altura}(x) - 1.5)/0.5 & \text{se } 1.5\text{m} \leq \text{Altura}(x) \leq 2.0\text{m} \\ 1 & \text{se } \text{Altura}(x) > 2.0\text{m} \end{cases}$$




Fig. adaptada de Engelbrecht p. 214

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

8 / 22

Operadores difusos

- ▶ **Complemento (NOT)**: Seja \bar{A} o complemento de A . Então,

$$\forall x \in X, \mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

- ▶ **Interseção (AND)**:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \forall x \in X$$

- ▶ **União (OR)**:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \forall x \in X$$

Luís A. Alexandre (UBI)

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

10 / 22

Operadores difusos: exemplo

- ▶ A figura à esquerda representa o complemento de A e a da direita a interseção de A e B




Fig. de Engelbrecht p. 217

Luís A. Alexandre (UBI)

Inteligência Computacional

Ano lectivo 2023-24

12 / 22

Operadores difusos: exemplo

- ▶ A figura abaixo representa a reunião de A e B




Fig. de Engelbrecht p. 217

Propriedades dos conjuntos difusos

- ▶ **Núcleo:** o núcleo de A é o conj. de todos os elementos do domínio X , que pertencem a A com grau de pertinência 1

$$\text{núcleo}(A) = \{x \in X : \mu_A(x) = 1\}$$

- ▶ **Corte- α :** o corte- α de A é o conj. dos elementos de A com grau de pertinência maior ou igual a $\alpha \in (0, 1]$

$$\text{corte-}\alpha(A) = \{x \in A : \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

- ▶ **Unimodalidade:** A diz-se unimodal se a sua função de pertinência tem apenas um máximo (é unimodal).

Propriedades dos conjuntos difusos

- ▶ Finalmente, os conj. difusos gozam das propriedades:

- ▶ comutativa:
 - ▶ $A \cap B = B \cap A$
 - ▶ $A \cup B = B \cup A$
- ▶ associativa:
 - ▶ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 - ▶ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- ▶ distributiva:
 - ▶ $A \cap (B \cup C) = A \cap B \cup A \cap C$
 - ▶ $A \cup (B \cap C) = A \cup B \cap A \cup C$
- ▶ transitiva:
 - ▶ $A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C$
 - ▶ $A \supset B, B \supset C \Rightarrow A \supset C$
- ▶ idempotência:
 - ▶ $A \cap A = A$
 - ▶ $A \cup A = A$

de forma análoga aos conj. bivalentes.

Propriedades dos conjuntos difusos

- ▶ No que se segue vamos considerar A um conjunto difuso e X o domínio do problema.
- ▶ **Normalidade:** A diz-se normal (ou normalizado) se contém um elemento cujo grau de pertinência ao conj. seja igual a 1

$$\exists x \in A : \mu_A(x) = 1$$

- ▶ **Altura:** a altura de A é o supremo da função de pertinência

$$\text{altura}(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x)$$

(Qual é a altura de um conj. normalizado?)

- ▶ **Suporte:** o suporte de A é o conj. de todos os elementos do domínio X , que pertencem a A (têm grau de pertinência maior que zero)

$$\text{suporte}(A) = \{x \in X : \mu_A(x) > 0\}$$

Propriedades dos conjuntos difusos

- ▶ **Cardinalidade:** o cardinal de A , se X for finito, é

$$\text{card}(A) = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$$

e se X for infinito é

$$\text{card}(A) = \int_X \mu_A(x) dP(x)$$

onde P é uma medida em X : $\int dP(x) = 1$

- ▶ **Normalização:** a normalização de A faz-se da seguinte forma

$$\text{normalização}(A) = \frac{\mu_A(x)}{\text{altura}(A)}$$

Exercícios

1. Verifique se são verdadeiras, para um conj. difuso A , as seguintes propriedades da lógica bivalente:

- 1.1 $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- 1.2 $A \cup \bar{A} = X$

2. Dados os dois conjuntos difusos seguintes:

lápiz grandes = $\{0.1/\text{lápis1}, 0.2/\text{lápis2}, 0.4/\text{lápis3}, 0.6/\text{lápis4}, 0.8/\text{lápis5}, 1.0/\text{lápis6}\}$

lápiz médios = $\{1.0/\text{lápis1}, 0.6/\text{lápis2}, 0.4/\text{lápis3}, 0.3/\text{lápis4}, 0.1/\text{lápis5}\}$

Ache a união e a intersecção destes conjuntos.

Exercícios

3. A figura abaixo contém as funções de pertença de dois conjuntos difusos A e B .

3.1 Desenhe a função de pertença para o conjunto $C = A \cap \bar{B}$

3.2 Ache o valor de $\mu_C(5)$.

3.3 Será C normal?




Fig. de Engelbrecht p. 223

Sistemas difusos e probabilidades

- ▶ Muitas vezes se confunde a lógica difusa e as probabilidades.
- ▶ Ambos os conceitos se referem à certeza relativa ao acontecimento de determinados eventos.
- ▶ Mas, no caso das probabilidades, só faz sentido referir esses valores antes do evento acontecer (ou não). Após o evento, não faz sentido falar na probabilidade pois o acontecimento já ocorreu.
- ▶ No caso dos sistemas difusos, a pertença dum elemento a um conj. difuso faz sentido mesmo após o acontecimento.
- ▶ Apesar das diferenças, (os conceitos são complementares) estes conceitos podem ser usados simultaneamente: a probabilidade de um acontecimento difuso. Exemplo: qual a probabilidade de Pedro pertencer ao conj. difuso dos bons jogadores de basket com grau de pertença igual a 0.9?

Sistemas difusos e probabilidades: exemplo

- ▶ Vejamos um exemplo. O evento consiste em saber se o Pedro é um bom jogador de basket.
- ▶ O Pedro pertence ao conjunto difuso dos bons jogadores de basket com pertença igual a 0.9.
- ▶ Existe uma probabilidade de o Pedro ser um bom jogador, digamos 0.8.
- ▶ Após a realização do evento (determinação se o Pedro é ou não um bom jogador de basket), já não faz sentido falar na probabilidade de Pedro ser um bom jogador de basket, pois agora ou é um bom jogador de basket ou não (de acordo com a lógica bivalente usada nas probabilidades).
- ▶ No entanto, ainda faz sentido falar na pertença do Pedro ao conjunto difuso dos bons jogadores de basket.

Leitura recomendada

- ▶ Engelbrecht, cap. 18.