MITO VS FACTO

DESMONTADO

MITO

«Estás constipado? Vai treinar forte e sua a constipação para fora.»

FACTO

O suor **não expulsa vírus**. A constipação segue o seu curso — cerca de uma semana — treines ou não. **Treino moderado não a piora nem a encurta.** Treino intenso com febre é outra conversa: aí o risco é real.

0	=	38°
diferença na gravidade e duração dos sintomas entre quem treinou e quem descansou	função pulmonar e capacidade de esforço iguais no pico da constipação	com febre a partir de 38 °C, não há treino. Ponto final.
Weidner et al., 1998	*Weidner et al., 1997*	*consenso de medicina desportiva*

// PORQUE O MITO NÃO COLA

O rinovírus vive nas **mucosas do nariz e da garganta**, não nas glândulas sudoríparas. Suar faz-te perder água e sódio — não vírus.

No estudo de referência, 50 voluntários foram **infetados de propósito** com o mesmo vírus. Metade treinou 40 min em dias alternados. Os investigadores chegaram a pesar os lenços usados. Resultado: empate.

Com febre, o exercício **soma calor ao calor**: mais frequência cardíaca, mais desidratação, menos rendimento.

// A REGRA DO PESCOÇO

ACIMA DO PESCOÇO

- nariz a pingar
- espirros
- congestão
- garganta arranhada

→ treino leve, ~50%

ABAIXO DO PESCOÇO

- febre
- dores no corpo
- tosse de peito
- cansaço extremo, náuseas

→ zero treino

⚠ O RISCO QUE NINGUÉM CONTA

Um vírus pode inflamar o músculo cardíaco — **miocardite**. Esforço intenso nos primeiros dias da infeção agrava-a, e é uma das causas de morte súbita em atletas. Sinais para parar e ir ao médico: **frequência cardíaca em repouso 5-10 bpm acima do habitual, palpitações, falta de ar desproporcionada, dor no peito.**

// NA PRÁTICA

01 **Faz o teste do pescoço** antes de cada sessão. Honestamente.

02 **Acima do pescoço:** corta volume e intensidade para metade. Caminhada, mobilidade, técnica. Nada de máximos nem HIIT.

03 **Abaixo do pescoço:** repouso até estares 24-48 h sem febre — sem antipiréticos a mascarar.

04 **Regresso gradual:** 2-3 sessões a subir de 50% até 100%. Voltar a fundo é a receita da recaída.

05 **Desportos de combate:** sparring, clinch, luvas e sacos partilhados espalham o vírus. Fica em casa nos primeiros dias.

06 **Séniores, asmáticos, cardíacos, DPOC:** sê mais conservador e fala com o médico.

Não se sua uma constipação. Gere-se.

FONTES · Weidner TG et al. *Med Sci Sports Exerc* 1998;30(11):1578-83 · Weidner TG et al. *Med Sci Sports Exerc* 1997;29(5):604-9 · Weidner TG, Schurr T. *Br J Sports Med* 2003;37:304-6 · Eichner ER. *Phys Sportsmed* 1993 (regra do pescoço) · Halle M et al. *Eur J Prev Cardiol* 2021 (miocardite em atletas) · Jaworski CA. *Paediatr Child Health* 2008