

1 Text S1. Transparency statement for secondary data analysis (after van den Akker et al. 2021)

Prior knowledge of the data. All 48 deposits were downloaded on 28 August 2026 and inspected for file structure before the grid of decision nodes was written on the same day. No specification had been computed at that point. The published analyses were extracted from the papers on 12 September 2026, and the mapping rules of Methods 2.3 were fixed after that extraction.

Order of analyses. First complete multiverse run: 28 August 2026, with the ad hoc mapping (registry v1). Rule-based mapping (registry v2) and rerun: 12 September 2026. Statistical review and corrections (pooled within-group denominator, reproduction rule, multiple imputation): 12 September 2026. Adversarial review, reclassification of outlier rules, addition of the strict grid, long-format baseline correction, refit of the published models: 13 September 2026. Displacement analysis: 13 September 2026.

Decisions made after seeing results. Outlier rules were moved from the core grid to a sensitivity arm after a winsorising rule on a bounded outcome had produced a range of 1.08 standard deviations. The strict grid was added after the first run showed that in most trials only baseline handling could vary. The core grid was renamed from principled to estimand-preserving after the precision criterion had been applied to baseline handling. The reproduction rule (2% and 10% relative difference) was fixed before any computation. An absolute criterion introduced on 12 September was withdrawn on 13 September and the prespecified rule reinstated, with the absolute difference reported without threshold.

Registry v1 versus v2. Table S2 lists both mappings, Table S7 the effect of v1 on the results. The sign of the median effect reversed in 7 of 16 trials.

Coders. One coder to date. A second, blind coding is planned and its agreement will be reported.

2 Table S1. Exclusions at manual assessment (n = 32)

study_id	category	reason_code	reason
2016_early-sitting-in-ischemic-stroke-patients-sevel	design	binary_outcome	Primaeres Outcome ist der Anteil mit modifiziertem Rankin-Score 0-2 und damit binaer; das Gitter ist fuer stetige Outcomes gebaut
2017_predicting-outcome-in-frozen-shoulder-shoulder-c	duplicate	duplicate_data	Nutzt denselben Datensatz wie die Adhesive-Capsulitis-Studie (106 Zeilen, Group 1/2/3, identische SPADI-Spalten); Doppelzaehlung
2020_an-age-adapted-plyometric-exercise-program-impro	design	feasibility_primary	Machbarkeitsstudie; primaerer Endpunkt ist die Durchfuehrbarkeit des Programms
2021_home-based-exercise-for-people-living-with-frail	design	feasibility_primary	Primaere Endpunkte sind Eignung, Rekrutierung, Adhaerenz und Abbruchquote; kein Effektschaetzer
2022_dependence-of-learning-outcomes-in-flipped-and-l	design	not_clinical	Lehrforschung zu Unterrichtsformaten; keine klinische Studie an Patienten
2022_a-comparison-of-psychological-characteristics-in	design	not_rct	Querschnitts- bzw. Kohortenvergleich psychologischer Merkmale; keine randomisierte Intervention
2025_subphenotypic-classification-of-covid-19-survivo	duplicate	duplicate_data	Latent-Class-Sekundaeranalyse desselben TEREKO-Datensatzes (119 Zeilen, group_randomized, SF12-Spalten)
2025_isoenergetic-pre-exercise-meals-varying-in-carbo	design	crossover_design	Crossover-Design; das Gitter unterstellt parallele Gruppen und wuerde die Within-Person-Struktur ignorieren
2021_impact-of-assessment-and-intervention-by-a-healt	data	outcome_not_identifiable	Primaeres Outcome laut Abstract ED length of stay; im Deposit ist keine Spalte eindeutig als solche erkennbar

study_id	category	reason_code	reason
2024_effects-of-anodal-tacs-on-resting-state-ecg-powe	data	outcome_data_not_tabular	Die Tabellendatei enthaelt nur Basischarakteristika; die EEG-Outcomes liegen in 7z-Archiven
2022_influence-of-the-statistical-significance-of-res	design	not_clinical	Leserstudie: Wie interpretieren Leser Abstracts mit und ohne Spin; keine Intervention an Patienten
2021_the-impact-of-a-physician-s-recommendation-and-g	design	not_clinical	Qualtrics-Vignettenbefragung zu Arzttempfehlung und Geschlecht; keine klinische Intervention
2021_effect-of-an-inverted-seated-position-with-upper	design	crossover_design	Vier Bedingungen je Person mit Rest/Pre/Post; Crossover, keine parallelen Gruppen
2023_a-clinical-model-to-predict-the-progression-of-k	design	not_rct	Prognosemodell fuer den Verlauf der Gonarthrose; keine Randomisierung
2025_comparative-effects-of-combined-aerobic-and-resi	data	no_ipd	Das Deposit enthaelt nur eine Ergebnistabelle mit Gruppendifferenzen und CIs, keine Individualdaten
2025_comparing-structured-note-taking-and-multiple-ch	design	not_clinical	Lehrforschung zu Notiztechniken; keine klinische Studie
2026_effects-of-modest-carbohydrate-energy-supplement	design	crossover_design	Jede Person erhaelt beide Supplemente (Supplement_1 und Supplement_2 in allen 20 Zeilen belegt, je 10 C und 10 P); Crossover statt paralleler Gruppen
2026_preliminary-efficacy-of-cognitive-multisensory-r	data	arm_not_in_data	Das Paper randomisiert in sofortige CMR (Gruppe A) und Beobachtung (Gruppe B), im Deposit gibt es aber keine Gruppenspalte
2025_time-restricted-eating-without-exercise-enhances	design	crossover_design	Drei Phasen je Person (Phase 1, 2, 3) ohne Gruppenvariable; Within-Person-Design
2024_eight-weeks-of-high-intensity-interval-training	data	file_not_readable	Die beiden CSV-Dateien im Deposit lassen sich nicht als Tabelle einlesen (inkonsistente Spaltenzahl)
2022_the-effect-of-mindfulness-on-the-inflammatory-ps	data	no_data_in_deposit	Das im Availability-Statement verlinkte Archiv enthaelt ausschliesslich eine README.md und keine Daten
2025_a-sensor-augmented-telerehabilitation-system-for	data	outcome_data_not_tabular	Das Deposit enthaelt nur EMG- und IMU-Rohsignale als NumPy-Arrays je Proband und Versuch, keine Outcome-Tabelle
2026_effects-of-low-load-blood-flow-restriction-train	data	arm_not_in_data	Die Daten liegen als extdata eines R-Pakets in Parquet- und Excel-Dateien; in der Kontraktilitaetstabelle fehlt eine Gruppenvariable
2023_the-effects-of-creatine-supplementation-on-cogni	design	crossover_design	Supplement-Reihenfolge je Person (order_supplement, guess_first_supplement); Crossover statt paralleler Gruppen, dazu vier getrennte Testdateien
2025_the-effect-of-proximity-to-failure-on-perceptual	design	within_person_design	Beide Gliedmassen je Person erhalten unterschiedliche Protokolle (FAIL gegen RIR); Within-Person-Design
2026_anatomy-of-a-failure-a-retrospective-evaluation	data	arm_not_in_data	Retrospektive Auswertung; die Spalte CONDITION kodiert Messzeitpunkte (1w, 1m, 3m, 6m, 12m), eine Gruppenvariable ist nicht auffindbar
2025_lengthened-partial-repetitions-elicite-similar-mu	design	within_person_design	Beide Arme je Person erhalten unterschiedliche Protokolle (pROM/iROM kontralateral); kein Parallelgruppen-Kontrollarm. Gleiche Regel wie bei der Proximity-to-Fa
2024_pilot-randomized-controlled-trial-of-i-lymfit-i	design	feasibility_primary	Pilot-Machbarkeits-RCT (n=26); primaeres Ziel sind Feasibility-Benchmarks, kein Wirksamkeits-Primaeroutcome. Gleiche Regel wie bei den zwei anderen Machbarkeits

study_id	category	reason_code	reason
2022_understanding-how-individualised-physiotherapy-o	no_estimate	no_group_estimate	Explorative Netzwerkanalyse (Mixed Graphical Model) ueber 10 ODI-Items einer Sekundaeranalyse des STOPS-Trials; kein Gruppendifferenz-Schaetzer, kein primaeres
2025_effects-of-an-aquatic-protocol-on-electromyograp	data	outcome_not_identifiable	Kein primaeres Outcome deklariert; Abstract nennt zuerst EMG-Aktivierung gemittelt ueber 4 Muskeln, im Deposit nur Einzelmuskel-Spalten mit unbeschrifteten Suff
2015_a-12-week-exercise-program-for-pregnant-women-wi	data	outcome_timepoint_not_in_deposit	Primaeres Outcome (nach dokumentiertem Outcome-Switching) ist MVPa in Bouts bei 36 SSW; das Deposit enthaelt nur v1 (14 SSW) und v2 (28 SSW). Regel: publizierte
2026_changes-in-repetitive-negative-thinking-and-stre	no_estimate	secondary_analysis_no_estimate	Mediationsanalyse (SEM) des ImPuls-RCT (Wolf et al. 2024, Lancet Psychiatry); kein eigener Gruppenvergleichs-Schaetzer; Primaerbericht liegt anderswo

3 Table S2. Trial registry, version 2 (rule-based) against version 1 (ad hoc)

study_id	report_type	outcome_v2	outcome_v1	control_v2	control_v1	covariates_v2	covariates_v1	primary_declared
physiofeedback_PMC12837702	secondary	AP_RMS	AP_RMS	Control	Control	Age,BMI,Gender,Race	Age,BMI,Gender,Race	secondary_report
mulligan_PMC13092435	primary	NPRS2	NPRS2	3	1		Age,Gender	registration
lytras_fms_PMC12942207	primary	NRPSLBPost	NRPSLBPost	2	1		Age,Gender,BMI	registration
clusterset_PMC13140343	primary	IRM	CMJ_mean	TS	TS	Sex	Age,Sex	sample_size
tereco_PMC8318721	primary	X_6MWD2	X_6MWD2	2	1			registration
spadi_PMC4880881	primary	SPADI8wks	SPADI8wks	3	1			registration
tses_PMC13085461	primary	BBS_Post	BBS_Post	2	1		Age,BMI	registration
tdcs_PMC13257960	secondary	CAR_post_all	CAR_post_all	2	1		age,BMI	secondary_report
etip_PMC6886967	secondary	Post_PGWB	EPDS_total	2	1		Pre_preg_BMI	secondary_report
phosphatidic_PMC4891923	primary	LBM2	LBM2	2	1		Age,Sex	none
facial_PMC11164989	primary	T3	VM2	2	1		Age	registration
gainingmore_PMC10809978	primary	RF50Post	RF50Post	2	1		SEX	none
etre_PMC11945196	primary	Weight	Weight	Control	Control			paper
creatine_PMC11944689	primary	dxa_leanmass_kg_post_1	legs_post1	Control	Control		sex	registration
free_PMC6733445	primary	rmdq_tot	rmdq_tot	Control	Control	agegp_w0		registration
mallorca_PMC8198819	secondary	edimburgtotal	edimburgtotal	C	C			secondary_report

4 Table S3. Summary measures per trial and grid

grid_type: principled = estimand-preserving; strict = baseline handling fixed to analysis of covariance; defensible = Type E and N nodes; outlier_arm = sensitivity arm.

study_id	grid_type	n_spec	n	d_median	d_q25	d_q75	d_min	d_max	share_same_sign	s_median
clusterset_PMC13140343	defensible	36	36	0.0644	0.0559	0.157	0.0528	0.179	1	1.49
clusterset_PMC13140343	outlier_arm	18	36	0.0593	0.0542	0.155	0.0528	0.171	1	1.52
clusterset_PMC13140343	principled	18	36	0.0593	0.0542	0.155	0.0528	0.171	1	1.52
clusterset_PMC13140343	strict	6	36	0.0583	0.0528	0.0637	0.0528	0.0637	1	1.55
creatine_PMC11944689	defensible	48	64	0.0431	0.0414	0.196	0.0163	0.28	1	3.18
creatine_PMC11944689	outlier_arm	9	63	0.0446	0.0439	0.256	0.0439	0.256	1	5.16
creatine_PMC11944689	principled	9	63	0.0446	0.0439	0.256	0.0439	0.256	1	5.16
creatine_PMC11944689	strict	3	63	0.0439	0.0439	0.0439	0.0439	0.0439	1	5.14
etip_PMC6886967	defensible	48	91	0.132	0.0802	0.185	-0.0161	0.254	0.938	0.98
etip_PMC6886967	outlier_arm	30	59	0.227	0.192	0.275	0.0447	0.289	1	1.6
etip_PMC6886967	principled	9	59	0.192	0.0447	0.254	0.0447	0.254	1	1.23
etip_PMC6886967	strict	3	59	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	1	1.22
etre_PMC11945196	defensible	18	16	-0.916	-1.24	-0.887	-1.26	-0.874	1	9.41
etre_PMC11945196	outlier_arm	9	16	-0.903	-1.24	-0.874	-1.24	-0.874	1	9.7
etre_PMC11945196	principled	9	16	-0.903	-1.24	-0.874	-1.24	-0.874	1	9.7
etre_PMC11945196	strict	3	16	-0.874	-0.874	-0.874	-0.874	-0.874	1	8.97
facial_PMC11164989	defensible	30	24	1.51	1.45	1.55	1.35	1.6	1	9.53
facial_PMC11164989	outlier_arm	16	23	1.49	1.45	1.51	1.44	1.55	1	9.57
facial_PMC11164989	principled	9	23	1.49	1.45	1.55	1.45	1.55	1	9.64
facial_PMC11164989	strict	3	23	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1	10.6
free_PMC6733445	defensible	96	226	0.092	0.0752	0.0977	-0.0605	0.137	0.948	0.79
free_PMC6733445	outlier_arm	219	214	0.0549	0.0203	0.085	-0.0309	0.117	0.913	0.424
free_PMC6733445	principled	35	214	0.0911	0.0753	0.0952	0.0562	0.117	1	0.797
free_PMC6733445	strict	12	214	0.0911	0.0847	0.0936	0.0753	0.105	1	0.886
gainingmore_PMC10809078	defensible	18	39	-0.102	-0.468	-0.06	-0.499	-0.0423	1	1.07
gainingmore_PMC10809078	outlier_arm	9	39	-0.0901	-0.468	-0.06	-0.468	-0.06	1	0.956
gainingmore_PMC10809078	principled	9	39	-0.0901	-0.468	-0.06	-0.468	-0.06	1	0.956
gainingmore_PMC10809078	strict	3	39	-0.0901	-0.0901	-0.0901	-0.0901	-0.0901	1	0.956
lytras_fms_PMC12942207	defensible	9	40	-0.884	-1.01	-0.785	-1.01	-0.785	1	7.35
lytras_fms_PMC12942207	outlier_arm	9	40	-0.884	-1.01	-0.785	-1.01	-0.785	1	7.35
lytras_fms_PMC12942207	principled	9	40	-0.884	-1.01	-0.785	-1.01	-0.785	1	7.35
lytras_fms_PMC12942207	strict	3	40	-0.884	-0.884	-0.884	-0.884	-0.884	1	7.7
mallorca_PMC8198840	defensible	10	294	-0.301	-0.313	-0.295	-0.315	-0.281	1	5.82
mallorca_PMC8198840	outlier_arm	19	263	-0.287	-0.304	-0.244	-0.315	-0.236	1	6.36
mallorca_PMC8198840	principled	3	263	-0.315	-0.315	-0.315	-0.315	-0.315	1	6.48
mallorca_PMC8198840	strict	3	263	-0.315	-0.315	-0.315	-0.315	-0.315	1	6.48
mulligan_PMC13092435	defensible	18	29	-0.325	-0.329	-0.22	-0.411	-0.117	1	1.52
mulligan_PMC13092435	outlier_arm	9	29	-0.22	-0.32	-0.117	-0.32	-0.117	1	1.03
mulligan_PMC13092435	principled	9	29	-0.22	-0.32	-0.117	-0.32	-0.117	1	1.03
mulligan_PMC13092435	strict	3	29	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	1	1.03
phosphatidic_PMC4891023	defensible	18	18	0.101	0.0637	0.105	0.0562	0.106	1	4.01
phosphatidic_PMC4891023	outlier_arm	9	18	0.105	0.0637	0.106	0.0637	0.106	1	3.83
phosphatidic_PMC4891023	principled	9	18	0.105	0.0637	0.106	0.0637	0.106	1	3.83
phosphatidic_PMC4891023	strict	3	18	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	1	4.41
physiofeedback_PMC12821712	defensible	45	276	0.0744	0.0493	0.108	-0.0194	0.141	0.956	0.762
physiofeedback_PMC12821712	outlier_arm	157	276	0.0913	0.0704	0.108	0.0222	0.141	1	1.13
physiofeedback_PMC12821712	principled	23	276	0.108	0.0666	0.133	0.0493	0.141	1	1.38
physiofeedback_PMC12821712	strict	8	276	0.114	0.108	0.133	0.0899	0.133	1	1.51
spadi_PMC4880881	defensible	24	72	-0.952	-0.975	-0.91	-1	-0.869	1	14

study_id	grid_type	n_spec	n	d_median	d_q25	d_q75	d_min	d_max	share_same_sign	s_median
spadi_PMC4880881	outlier_arm	9	71	-0.975	-1	-0.904	-1	-0.904	1	12.3
spadi_PMC4880881	principled	9	71	-0.975	-1	-0.904	-1	-0.904	1	12.3
spadi_PMC4880881	strict	3	71	-0.975	-0.975	-0.975	-0.975	-0.975	1	17.3
tdcs_PMC13257960	defensible	18	20	1.41	1.39	1.43	1.38	1.46	1	7.3
tdcs_PMC13257960	outlier_arm	41	20	1.38	1.22	1.41	0.384	1.46	1	7.94
tdcs_PMC13257960	principled	9	20	1.42	1.41	1.46	1.41	1.46	1	7.47
tdcs_PMC13257960	strict	3	20	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1	7.59
tereco_PMC8318721	defensible	96	119	0.758	0.655	0.808	0.537	0.917	1	16.4
tereco_PMC8318721	outlier_arm	126	112	0.826	0.801	0.858	0.762	0.913	1	19.1
tereco_PMC8318721	principled	18	112	0.843	0.808	0.901	0.793	0.913	1	17.9
tereco_PMC8318721	strict	6	112	0.843	0.834	0.851	0.834	0.851	1	24.3
tscs_PMC13085461	defensible	18	20	1.09	0.976	1.36	0.975	1.5	1	10.8
tscs_PMC13085461	outlier_arm	9	20	1.03	0.975	1.36	0.975	1.36	1	12.3
tscs_PMC13085461	principled	9	20	1.03	0.975	1.36	0.975	1.36	1	12.3
tscs_PMC13085461	strict	3	20	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	1	17.3

4.1 Table S3b. Wilson intervals for proportions and study-bootstrap intervals for medians

quantity	k	n	prop	wilson_lo	wilson_hi
reproduced full	11	12	0.917	0.646	0.985
reproduced full or minor	11	12	0.917	0.646	0.985
published inside principled range	9	11	0.818	0.523	0.949
published inside defensible range	11	12	0.917	0.646	0.985
sign stable principled	16	16	1	0.806	1
sign stable defensible	13	16	0.812	0.57	0.934
range includes 0 principled	0	16	0	0	0.194
spec fully representable	7	12	0.583	0.32	0.807
reproduced full or minor, denominator 48 assessed RCTs	11	48	0.229	0.133	0.365
reproduced full or minor, denominator 152 with link	11	152	0.0724	0.0409	0.125
included, denominator 48	16	48	0.333	0.217	0.475
included, denominator 152	16	152	0.105	0.0658	0.164

quantity	est	boot_lo	boot_hi
median range d, principled	0.119	0.0917	0.212
median range d, defensible	0.239	0.132	0.322
median ratio defensible/principled (finite only)	1.35	1.12	1.52
median /published d - multiverse median d/ (principled)	0.0156	0.00272	0.0564

5 Table S4. Variance partition with two-way interactions, trial-by-grid combinations with at least 30 specifications

study_id	grid_type	n_spec	n_nodes	top_additive	share_additive	top_interaction_model	share_main_in_interactions	share_all_interactions
free_PMC6733445	principled	35	4	covars	55.3	covars	42.7	17.7
physiofeedback_PMC12821712	defensible	45	5	transform	43.7	transform	38.2	9.31
clusterset_PMC13140343	defensible	36	4	baseline	98.2	baseline	97.4	0.848
tereco_PMC8318721	defensible	96	5	transform	46.6	transform	45.5	2.42
etip_PMC6886967	defensible	48	4	transform	75.7	transform	44.9	40.7
facial_PMC11164989	defensible	30	4	baseline	98.8	baseline	79.8	19.2
creatine_PMC11944689	defensible	48	4	baseline	97.9	baseline	95.4	2.48
free_PMC6733445	defensible	96	5	baseline	49.9	baseline	12.5	74.6

6 Table S5. Range drivers per trial and range with baseline handling fixed

study_id	n	baseline_imbalance_sd	cor_base_outcome	frac_missing	range_p	range_d
physiofeedback_PMC12821712	276	0.0411	0.466	0	0.0917	0.16
mulligan_PMC13092435	29	0.162	0.632	0	0.203	0.294
lytras_fms_PMC12942207	40	0.217	0.379	0	0.229	0.229
clusterset_PMC13140343	36	0.105	0.985	0	0.118	0.126
tereco_PMC8318721	119	0.165	0.613	0.0588	0.121	0.38
spadi_PMC4880881	72	0.108	0.486	0.0139	0.0975	0.132
tscs_PMC13085461	20	0.409	0.882	0	0.386	0.522
tdcs_PMC13257960	20	0.0711	0.19	0	0.0569	0.0866
etip_PMC6886967	91	0.038	0.549	0.352	0.209	0.27
phosphatidic_PMC4891923	18	0.0434	0.994	0	0.0419	0.0495
facial_PMC11164989	24	0.101	0.502	0.0417	0.101	0.249
gainingmore_PMC10809978	39	0.411	0.915	0	0.407	0.457
etre_PMC11945196	16	0.398	0.873	0	0.366	0.386
creatine_PMC11944689	64	0.239	0.997	0.0156	0.212	0.263
free_PMC6733445	226	0.0237	0.227	0.0531	0.0607	0.198
mallorca_PMC8198819	294	NA	NA	0.105	0	0.034

study_id	range_full	n_spec	range_fixed
clusterset_PMC13140343	0.0159	6	0.0159
creatine_PMC11944689	0.212	3	0
etip_PMC6886967	0.244	12	0.0372
etre_PMC11945196	0	3	0
facial_PMC11164989	0.11	6	0.00598
free_PMC6733445	0.148	48	0.109
gainingmore_PMC10809978	0.407	3	0
lytras_fms_PMC12942207	0.229	3	0
mallorca_PMC8198819	0.0795	12	0.0795
mulligan_PMC13092435	0.203	3	0
phosphatidic_PMC4891923	0.0419	3	0
physiofeedback_PMC12821712	0.0347	26	0.0347

study_id	range_full	n_spec	range_fixed
spadi_PMC4880881	0.0975	3	0
tdcs_PMC13257960	1.08	9	1.03
tereco_PMC8318721	0.152	24	0.0543
tscs_PMC13085461	0.386	3	0

7 Table S6. Data integrity screen

p_carlisle_named: Stouffer-combined p over baseline variables named in the paper (NA where fewer than two). p_carlisle_all: name-based broad search, reported only.

study_id	n	n_baseline_named	p_carlisle_named	n_baseline_all	p_carlisle_all	frac_outcome_nonint	n_dup_rows	p_lastdigit	flag
physiofeedback_PMC12821712	258	2	0.308	2	0.308	1	0	0.918	pass
mulligan_PMC13092435	39	1	NA	2	0.51	0	0	NA	pass
lytras_fms_PMC12942207	407	1	NA	5	0.873	0	0	NA	pass
clusterset_PMC13140343	46	0	NA	8	0.333	0.194	0	NA	pass
tereco_PMC8318721	119	1	NA	7	0.672	0	0	NA	pass
spadi_PMC4880881	72	1	NA	5	0.859	0	0	NA	pass
tscs_PMC13085461	20	1	NA	10	0.145	0	0	NA	pass
tdcs_PMC13257960	20	1	NA	13	0.953	0.9	0	NA	pass
etip_PMC6886967	91	1	NA	43	0.324	0	0	NA	pass
phosphatidic_PMC4891923	182	1	NA	5	0.449	1	0	NA	pass
facial_PMC11164989	24	1	NA	2	0.911	0	0	NA	pass
gainingmore_PMC10809978	99	1	NA	9	0.573	0.974	0	0.491	pass
etre_PMC11945196	16	0	NA	0	NA	1	0	NA	pass
creatine_PMC119446864	64	1	NA	25	0.269	1	0	0.312	pass
free_PMC6733445	226	1	NA	21	0.892	0	0	NA	pass
mallorca_PMC8198819294	294	0	NA	16	0.263	0	0	NA	pass

8 Table S7. Effect of the first mapping (registry v1) on the results, computed with the final engine

study_id	v1_med	v1_range	v1_sign	v2_med	v2_range	v2_sign	sign_flip
physiofeedback_PMC12821712	0.0498	0.0173	1	0.108	0.0917	1	FALSE
mulligan_PMC13092435	-0.218	0.193	1	-0.22	0.203	1	FALSE
lytras_fms_PMC12942207	0.886	0.229	1	-0.884	0.229	1	TRUE
clusterset_PMC13140343	0.376	0.0114	1	0.0593	0.118	1	FALSE
tereco_PMC8318721	-0.851	0.105	1	0.843	0.121	1	TRUE
spadi_PMC4880881	-0.0437	0.169	0.667	-0.975	0.0975	1	FALSE
tscs_PMC13085461	-1	0.476	1	1.03	0.386	1	TRUE
tdcs_PMC13257960	-1.46	0.0693	1	1.42	0.0569	1	TRUE
etip_PMC6886967	0.191	0.0668	1	0.192	0.209	1	FALSE
phosphatidic_PMC4891923	-0.105	0.0419	1	0.105	0.0419	1	TRUE
facial_PMC11164989	-0.567	0.252	1	1.49	0.101	1	TRUE

study_id	v1_med	v1_range	v1_sign	v2_med	v2_range	v2_sign	sign_flip
gainingmore_PMC10809978	0.075	0.448	1	-0.0901	0.407	1	TRUE
etre_PMC11945196	-1.24	0	1	-0.903	0.366	1	FALSE
creatine_PMC11944689	0.00914	0.207	1	0.0446	0.212	1	FALSE
free_PMC6733445	0.0911	0.047	1	0.0911	0.0607	1	FALSE
mallorca_PMC8198819	-0.315	0	1	-0.315	0	1	FALSE

9 Table S8. Displacement of the published result per trial and grid

study_id	grid_type	n_spec	d_published	delta_median	delta_min	delta_max	abs_delta_max	share_within_0.1	share_within_0.2	share_same_sign_as_published	universal
creatine_PMC11944689	principled	9	0.0439	0.000689	-	0.212	0.212	0.667	0.667	1	FALSE
creatine_PMC11944689	defensible	24	0.0439	-	-0.0227	0.236	0.236	0.667	0.667	1	FALSE
etip_PMC6886967	principled	9	0.192	0.0000000000000000368	0.0647	0.062	0.147	0.667	1	1	FALSE
etip_PMC6886967	defensible	24	0.192	-0.00408	-0.147	0.062	0.147	0.875	1	1	FALSE
etre_PMC11945196	principled	9	-0.903	0.0000000000000000337	0.0295	0.0295	0.337	0.667	0.667	1	FALSE
etre_PMC11945196	defensible	9	-0.903	0.0000000000000000337	0.0295	0.337	0.667	0.667	0.667	1	FALSE
gainingmore_PMC10809978	principled	9	-0.0628	-0.0273	-0.405	0.00274	0.405	0.667	0.667	1	FALSE
gainingmore_PMC10809978	defensible	9	-0.0628	-0.0273	-0.405	0.00274	0.405	0.667	0.667	1	FALSE
lytras_fms_PMC12943207	principled	9	-0.785	-0.0982	-0.229	0.000000000000000007829	0.667	0.667	0.667	1	FALSE
lytras_fms_PMC12943207	defensible	9	-0.785	-0.0982	-0.229	0.000000000000000007829	0.667	0.667	0.667	1	FALSE
mallorca_PMC8198819	principled	3	-0.316	0.00116	0.00116	0.00116	0.00116	1	1	1	FALSE
mallorca_PMC8198819	defensible	5	-0.316	0.00116	0.00116	0.00966	0.00966	1	1	1	FALSE
physiofeedback_PMC13283172	principled	22	0.0526	0.0107	-0.072	0.0291	0.072	1	1	0.909	TRUE
spadi_PMC488088	principled	9	-0.913	-0.0619	-0.0882	0.00933	0.0882	1	1	1	FALSE
spadi_PMC488088	defensible	24	-0.913	-0.0391	-0.0882	0.0437	0.0882	1	1	1	FALSE
tdcs_PMC13257960	principled	9	1.41	0.0183	0.0000000000000000046569	0.0569	0.0569	1	1	1	FALSE
tdcs_PMC13257960	defensible	9	1.41	0.0183	0.0000000000000000046569	0.0569	0.0569	1	1	1	FALSE
tereco_PMC8318721	principled	18	0.838	0.00481	-0.0451	0.0754	0.0754	1	1	1	FALSE
tereco_PMC8318721	defensible	48	0.838	-0.0299	-0.152	0.0792	0.152	0.792	1	1	FALSE
tses_PMC13085461	principled	9	0.975	0.055	0.000000000000000006386	0.386	0.386	0.667	0.667	1	FALSE
tses_PMC13085461	defensible	9	0.975	0.055	0.000000000000000006386	0.386	0.386	0.667	0.667	1	FALSE
free_PMC6733445	principled	35	0.139	-0.048	-0.0829	-0.0222	0.0829	1	1	1	FALSE
free_PMC6733445	defensible	96	0.139	-0.0471	-0.2	-0.0017	0.2	0.938	1	0.948	TRUE

10 Table S9. Published models as fitted, with assumptions recorded

study_id	model_as_published	est	ci_lo	ci_hi	p	n	deviations
creatine_PMC11944689	Linear regression (ANCOVA): change in whole-body LBM (T1->T2, 7-Tage Wash-in) ~ group + baseline LBM (T1), complete-case (Sec. 2.3.5)	0.507	0.0569	0.958	0.0279	63	REPRODUKTION SEHR NAH AM PUBLIZIERTEN WERT (0.507 vs 0.51 kg, p=0.028 vs 0.03). Paper berichtet nur Punktschaetzer + p (0.51 kg, p=0.03), kein CI/SE fuer die Gruppendifferenz -> unser CI ist modellbasiert (t-Verteilung)
etip_PMC6886967	General linear model ANCOVA: PGWBI global score (spaeete Schwangerschaft) ~ Group + PGWBI-Baseline, verfuegbare ITT-Faelle (Statistical methods)	2.6	-3.77	8.97	0.417	54	REPRODUKTION SEHR NAH AM PUBLIZIERTEN WERT (Estimate 2.597 vs 2.60; 95% CI [-3.77, 8.97] vs [-3.77, 8.97] im Paper; p=0.417 vs 0.42). Paper deklariert PGWBI nicht als formal 'primaeres' Outcome (siehe registry_check), wi
etre_PMC11945196	LMM: Weight ~ Group*Time + (1/ID), REML; Haupt-Estimand = Time x Group Interaktion (Change-Score-Kontrast eTRE vs Control, lt. Override in eTRE-minus-Control-Ko	-2.13	-3.07	-1.18	0.000241	24	Interaktionskoeffizient (eTRE:post) wird direkt in unserer eTRE-minus-Control-Konvention berechnet und entspricht der Vorzeichenkonvention in con-fig/published_overrides.csv (publizierter Wert dort: -2.13 [-3.07,-1.18], p
gainingmore_PMC10809978	Bayes-Mehrebenenmodell (brms, gaussian family, weakly-informative brms-Default-Priors): RF50 ~ Group*Time + (1/CODE); Gruppendifferenz-in-Aenderung = Group x Ti	-0.515	-2.73	1.76	NA	39	Paper nennt 'univariate multilevel regression models' in einem vollstaendig bayesianischen Framework (vermutlich brms/Stan), spezifiziert aber weder Prior-Verteilungen noch die genaue Zufallseffekt-Struktur der 'multilev

study_id	model_as_published	est	ci_lo	ci_hi	p	n	deviations
lytras_fms_PMC12942207	Two-way mixed ANOVA (Group x Time) auf NPRS-Lumbar; primaerer Interaktionstest, danach Bonferroni-adjustierter Simple-Effect-t-Test (Gruppenvergleich bei Woche	-1.2	-2.18	-0.222	0.0175	40	Unadjustierter Simple-Effect-t-Test bei Woche 3 (Bonferroni-Familie im Paper nicht definiert); Interaktion Group x Time aus der gemischten ANOVA in der Konsole. tiert, da SPSS-Verfahren fuer 'Bonferroni-adjusted pairwise
mallorca_PMC8198819	ANOVA/unadjustierter Gruppenvergleich (EPDS-Gesamtscore, 1 Monat postpartum) mit Multiple Imputation (mice, PMM, m=20) fuer fehlende EPDS-Werte, gepoolt nach Ru	-0.694	-1.23	-0.161	0.0109	294	SPSS-MI-Modell und exakte Anzahl/Auswahl der Hilfsvariablen des Original-Papers sind nicht dokumentiert (nur 'Multiple imputation . . . with chained equation' genannt, ohne m oder Praediktorenliste). Hier mice::mice mit PM
physiofeedback_PMC1282171	LMM (Original-Autoren-Code aus deposit/statistical code.R): log(AP_RMS) ~ Group*Time + Age+BMI+Gender+Race + (1/SubjectID)+(1/Site), REML, bobyqa-Optimierer, Ra	0.021	-0.0782	0.12	0.678	373	Der deponierte Original-Code schreibt 'Group * Time' ohne explizites factor(Time); da Time im Datensatz numerisch (1-4) codiert ist, wuerde eine rein lineare Behandlung nur EINEN Interaktionsterm liefern, waehrend Tabell Paper implementiert die 'repeated measures ANCOVA' vermutlich als SPSS-GLM
spadi_PMC4880881	Repeated-measures ANCOVA als GLM-Aequivalent: ANCOVA auf dem Mittel der Wochen 4 und 8 ~ Group + SPADI-Baseline, listenweiser Ausschluss; entspricht dem Zwische	-20.8	-28.9	-12.7	0.00000255	70	(multivariater Ansatz mit fixem Messwiederholungsfaktor, kein explizites Random-Effects-Modell); hier stattdessen mit einem linear gemischten Mod

study_id	model_as_published	est	ci_lo	ci_hi	p	n	deviations
tdcs_PMC13257960	Unabhaengiger t-Test (gleiche Varianzen): CAR post-Intervention, aktive a-tDCS vs Sham a-tDCS (Statistical analyses)	6.85	2.27	11.4	0.00563	20	Paper nennt Shapiro-Wilk/Levene-Vortests zur Wahl zwischen t-Test (gleiche Varianzen) und Mann-Whitney-U, spezifiziert aber nicht, welcher Test fuer CAR konkret verwendet wurde; hier direkt der Student-t-Test mit gleiche
tereco_PMC8318721	Constrained longitudinal data analysis (LMM mit Gleichheitsrestriktion der Baseline-Mittelwerte): 6MWD ~ Time + Treatment(nur post/follow-up) + Zentrum(fix) + (	65.4	43.8	87.1	0.00000000913	119	Paper beschreibt cLDA typischerweise als GLS/Mixed-Model mit UNSTRUKTURIERTER Kovarianzmatrix ueber die 3 Zeitpunkte; hier stattdessen ein Random-Intercept-Modell (Compound-Symmetry-Annahme) verwendet, was fuer die Punkt
tscs_PMC13085461	ANCOVA: BBS post-Intervention ~ Group + BBS-Baseline; Kontrast RAGT+tSCS vs CPT+tSCS (Statistical analysis {20a})	7.67	5.14	10.2	0.00000641	20	Starke Gruppenungleichheit (n=13 vs n=7) laut Protokoll so vorgesehen, aber ungewoehnlich fuer 1:1-Randomisierung. Numerische Group-Codierung im .sav-Datensatz enthielt bereits Text-Labels ('RAGT+tSCS'/'CPT+tSCS'), die d
free_PMC6733445	LMM: RMDQ ~ Baseline-RMDQ + week*Tment + praespezifizierte Kovariaten + (1+week/GP), REML; Kontrast FREE vs Control bei week=26 (Statistical analysis, p.7)	0.58	-0.7	1.86	0.367	221	Kovariatenansatz aus den im Deposit verfuegbaren, bereits mittelwert-imputierten Basisvariablen zusammengestellt (age_w0, gender_w0, NZDep_Decile, d_length_back_pain_weeks, back_pain_consistency_3f, previous_backpain_w0_imp

11 Table S10. Test statistics recomputed for the four papers without a point estimate

study_id	statistic	published	recomputed	note
mulligan_PMC13092435	Group x Time F, p (RM-ANOVA, 3 arms, n = 43)	F = 0.983, p = 0.383	F(2,40) = 0.983, p = 0.383	SPSS RM-ANOVA; Change 1 Zeitpunkt = univariate Loesung
mulligan_PMC13092435	Group main effect F, p	not reported as number	F(2,40) = 0.290, p = 0.750	
mulligan_PMC13092435	within-group means pre -> post	Mulligan 4.79 -> 2.36; Maitland 5.07 -> 2.14; Control ?	Mulligan 4.79 -> 2.36 (n=14); Maitland 5.07 -> 2.14 (n=14); Control 5.07 -> 2.80 (n=15)	
facial_PMC11164989	Mann-Whitney U p (SFGS composite change, day 20 - baseline)	p = 0.002	p = 0.0020 (W = 114)	exakter Test; asymptotisch mit Korrektur ergaube p = 0.0033
facial_PMC11164989	median (IQR) change per group	Exp 59.0 (42.5-63.0); Conv 24.0 (9.0-32.0)	Experimental 59.0 (42.5-63.0), n=12; Conventional 24.0 (9.0-32.0), n=11	
clusterset_PMC13140343	Group x Time interaction p (LMM, Type III, Satterthwaite)	p = 0.352	F(1,34.0) = 0.890, p = 0.352	wie Methods 2.4.2
clusterset_PMC13140343	Time main effect F, p	F(1,34) = 80.67, p < 0.001	F(1,34.0) = 80.67, p = 1.7e-10	
clusterset_PMC13140343	Sex main effect F, p	F(1,33) = 95.13, p < 0.001	F(1,33.0) = 95.13, p = 3e-11	
phosphatidic_PMC4891923	Group x Time interaction F, p (2x2 mixed ANOVA, n = 18)	F(1,16) = 33.30, p = 0.041 (Results); 'main effect F(1,16) = 33.30, p < 0.001' (Abstract)	F(1,16) = 4.95, p = 0.0408	Paper intern widerspruechlich: F = 33.30 bei df (1,16) impliziert p < 0.001, p = 0.041 impliziert F = 4.9
phosphatidic_PMC4891923	Time main effect F, p	not separately reported	F(1,16) = 30.89, p = 4.3e-05	
phosphatidic_PMC4891923	means pre/post per group	MT 60.8+/-9.5 -> 62.7+/-10.2; PLA 61.2+/-9.7 -> 62.0+/-9.7	MT 60.8+/-9.6 -> 62.7+/-10.2 (n=8); PLA 61.2+/-9.6 -> 62.0+/-9.7 (n=10)	


12 Table S11. Trial registrations retrieved

study_id	registration_id	retrieved	registered_after_start	registered_primary_outcome	matches_our_outcome_var
physiofeedback_PMC12821712	NCT05778604	yes	no	Change from Baseline in Fall Risk Reduction; Change from Baseline in Dynamic Balance as Measured By Timed-Up and Go (TUG) test; Change from	no
mulligan_PMC13092435	NCT06858124	yes	unclear	Changes in neck pain intensity mit NPRS (erstgenannt); Changes in Pressure Pain Threshold (PPT); Changes in cervical ROM; Changes in Neck Di	yes
lytras_fms_PMC12942207	NCT07234071	yes	yes	Changes in pain intensity mit NPRS (erstgenannt); Straight Leg Raise (SLR) Angle - Goniometry/SROM; Change in Functional Disability (RMDQ);	yes
clusterset_PMC13140343		no			


study_id	registration_id	retrieved	registered_after_start	registered_primary_outcome	matches_our_outcome_var
tereco_PMC8318721	ChiCTR2000031834	yes	no	Total distances of 6 minutes walk test (Primary indicator; einziges primaeres Outcome)	yes
spadi_PMC4880881	NCT01570985	yes	yes	Shoulder pain and disability index (SPADI) (einziges primaeres Outcome)	yes
tscs_PMC13085461	ChiCTR2300074090	yes	no	Balance (Berg Balance Scale / Timed Up and Go) - erstgenannt; Mobility (Walking Index for Spinal Cord Injury WISCI II / 10-Meter Walk Test)	yes
tdcs_PMC13257960	IRCT20231113060048N1	yes	no	Quadriceps muscle strength (Biodex Isokinetic Dynamometer) - EINZIGES registriertes primaeres Outcome. 'Central activation ratio' (CAR) ist	no
etip_PMC6886967	NCT01243554	yes	unclear	Weight gain during pregnancy (kg), gemessen von 14 Schwangerschaftswochen bis Geburt (einziges primaeres Outcome, seit Version 1 unveraender	no
phosphatidic_PMC4891923	CTRI/2020/02/023240	no	no	Sunny Brook Facial Grading System (SFGS) - erstgenannt; House Brackmann Scale; Facial Disability Index (3 gemeinsam registrierte primaere Ou	yes
facial_PMC11164989		yes			
gainingmore_PMC10809978	OSF preregistration https://osf.io/bztka	yes	no	Kein separates 'primary outcome'-Feld in dieser OSF-Praereg-Vorlage (offene Van't Veer/Giner-Sorolla-Vorlage ohne Primary/Secondary-Untersch	partial
etre_PMC11945196	ACTRN12622000040763	no	no	[1] Whole-body lean mass measured by dual x-ray absorptiometry (DXA) - erstgenannt; [2] Faith's phylogenetic diversity of the gut microbiota	yes
creatine_PMC11944689		yes			
free_PMC6733445	ACTRN12616000888460	yes	no	Patient back pain related impairment measured with the Roland Morris Disability Questionnaire (einziges primaeres Outcome)	yes

study_id	registration_id	retrieved	registered_after_start	registered_primary_outcome	matches_our_outcome_var
mallorca_PMC8198819	ISRCTN14097513	yes	yes	The incidence of epidural analgesia use during labour is determined through review of the clinical history at one month after birth (einzig	no


13 Figure S1. Median and range of d per trial, both grids




14 Figure S2. Share of interval-width variance per node




15 Figure S3. Specification curves, clusterset_PMC13140343




16 Figure S4. Specification curves, creatine_PMC11944689




17 Figure S5. Specification curves, etip_PMC6886967





18 Figure S6. Specification curves, etre_PMC11945196



19 Figure S7. Specification curves, facial_PMC11164989




20 Figure S8. Specification curves, free_PMC6733445




Band: 95% interval per specification. Dashed line: published estimate where reported.


21 Figure S9. Specification curves, gainingmore_PMC10809978




22 Figure S10. Specification curves, lytras_fms_PMC12942207




23 Figure S11. Specification curves, mallorca_PMC8198819




24 Figure S12. Specification curves, mulligan_PMC13092435




25 Figure S13. Specification curves, phosphatidic_PMC4891923




26 **Figure S14. Specification curves, physiofeedback_PMC12821712**




27 **Figure S15. Specification curves, spadi_PMC4880881**




28 Figure S16. Specification curves, `tdcs_PMC13257960`



29 Figure S17. Specification curves, tereco_PMC8318721



30 **Figure S18. Specification curves, tscs_PMC13085461**



31 Text S2. Novelty search protocol, 15 September 2026

31.1 Neuheitsprüfung, 2026-09-15

Geprüfte Aussage (Manuskript, `body.tex` Zeile 5 bzw. `paper.md`):

“I am not aware of a study in physiotherapy, rehabilitation or exercise science that retrieved individual participant data from public repositories and recomputed the published primary analysis.”

Kriterium für ein Gegenbeispiel: Individualdaten aus einem öffentlichen Repositorium oder Supplement geholt **UND** die publizierte Primäranalyse nachgerechnet, im Feld Physiotherapie, Rehabilitation oder Sport- und Bewegungswissenschaft.

Diese Prüfung ergänzt die frühere Neuheitsprüfung vom 2026-08-28 (dokumentiert in `README.md`, Abschnitt “Neuheitsprüfung”). Die dort ausgeschlossenen Nachbarn (Jabouille 2025, Elghzali 2025, Murphy 2025, Dhanani 2022) werden hier nicht erneut im Volltext geprüft, sondern als bekannt vorausgesetzt.

Urteil vorab: Kein Gegenbeispiel gefunden. Die Aussage bleibt haltbar. Der nächste Nachbar ist eine seit Januar 2026 laufende, noch nicht abgeschlossene Registered-Report- Studie aus der Sportwissenschaft, die die publizierte Primäranalyse zwar nachrechnen will, aber ausdrücklich mit **privaten**, von Autoren vertraulich geteilten Rohdaten arbeitet statt mit Daten aus einem öffentlichen Repositorium. Details unten.

31.2 Methodik und Abweichungen vom Suchplan

Alle Anfragen liefen über curl mit `-A "Mozilla/5.0"` und 1,5 Sekunden Pause zwischen Aufrufen. Zwei Abweichungen von der Suchvorgabe, beide dokumentiert:

1. **medRxiv/bioRxiv**: Die direkte HTML-Suche auf [www.medrxiv.org/search/...](http://www.medrxiv.org/search/) liefert nur eine Cloudflare-Challenge-Seite (“Just a moment...”) zurück, kein Suchergebnis. Wie im Suchplan selbst vorgesehen, wurde stattdessen OpenAlex mit `filter=type:preprint` verwendet.
2. **OSF Registrations**: <https://api.osf.io/v2/registrations/> lieferte während der gesamten Sitzung durchgehend HTTP 502 oder Verbindungs-Timeouts (<https://api.osf.io/v2/> selbst antwortete mit 200, nur der Registrations-Endpunkt war betroffen; mehrere Wiederholungen über rund zwei Minuten, kein Erfolg). Als Ersatz wurde die SHARE-Such-API (https://share.osf.io/api/v2/search/creativeworks/_search) verwendet, die auch OSF-Registrierungen indiziert und zum Suchzeitpunkt erreichbar war (HTTP 200). Das ist ein dokumentierter Kompromiss, kein vollständiger Ersatz für `filter[title]`, weil SHARE eine andere Relevanzgewichtung nutzt und weitere Quellen (CrossRef, DataCite, PubMed Central) mit indiziert.

31.3 Abfragen wörtlich, mit Quelle und Trefferzahl

31.4 Europe PMC (<https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search,resultType=lite,pageSize=100>)

#	Abfrage	Trefferzahl
Q1	("computational reproducibility" OR "analytic reproducibility" OR "analytical reproducibility" OR "reanalysis" OR "re-analysis" OR "reproduction") AND ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation" OR "exercise science" OR "sports science" OR "sport science") AND ("individual participant data" OR "individual patient data" OR "raw data" OR "open data" OR "shared data" OR "repository")	5002
Q2	("multiverse") AND (Feldbegriffe wie Q1) AND (Datenbegriffe wie Q1)	28
Q3	("specification curve") AND (Feldbegriffe) AND (Datenbegriffe)	5

#	Abfrage	Trefferzahl
Q4	("vibration of effects") AND (Feldbegriffe) AND (Datenbegriffe)	5
Q5	("many analysts") AND (Feldbegriffe) AND (Datenbegriffe)	5
Q6	("robustness reanalysis") AND (Feldbegriffe) AND (Datenbegriffe)	0
Q7	"reproducibility" AND "physical therapy" AND "data" AND (PUB_TYPE:"Meta-Analysis" OR "meta-research" OR "metaresearch")	256
Q8	"many analysts" AND ("sport" OR "sports science" OR "exercise science")	10
Q9	("reanalysis" OR "re-analysis") AND ("open data") AND ("sports science" OR "exercise science" OR "sport science" OR "Journal of Sports Sciences" OR "Medicine and Science in Sports and Exercise")	24
Q10	"prevalence" AND "reproducible" AND ("sport science" OR "sports science" OR "exercise science")	928
Q11	("individual patient data" OR "individual participant data") AND ("reanalysis" OR "re-analysis" OR "recomputed" OR "recompute") AND ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") AND ("repository" OR "Zenodo" OR "Dryad" OR "OSF" OR "figshare")	49
Q12	("reproduced the published" OR "recomputed the published" OR "recompute the published" OR "reanalyzed the original data" OR "reanalysed the original data") AND ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation" OR "exercise" OR "sports")	120
Q13	"computational reproducibility" AND ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation" OR "exercise science" OR "sports science" OR "sport science")	29
Q14	"analytic reproducibility" AND ("physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation" OR "exercise" OR "sports" OR "sport")	14
Q15	("downloaded" OR "retrieved") AND ("individual participant data" OR "individual patient data" OR "raw data") AND ("recomputed" OR "recompute" OR "reran the analysis" OR "re-ran the analysis") AND ("physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "exercise" OR "sports" OR "physical therapy")	51
Q16	("Zenodo" OR "Dryad" OR "figshare" OR "Open Science Framework") AND ("reanalysis" OR "re-analysis" OR "recomputed") AND ("physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "physical therapy" OR "exercise science" OR "sports science")	250

#	Abfrage	Trefferzahl
Q17	"prevalence" AND "computational reproducibility"	40
Q18	AND ("sport" OR "exercise" OR "physiotherapy" OR "physical therapy" OR "rehabilitation") "Cochrane" AND ("individual patient data" OR "individual participant data") AND ("repository" OR "Zenodo" OR "Dryad" OR "Open Science Framework" OR "figshare") AND ("physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "physical therapy")	256
Q19	TITLE:("Reanalysis of" OR "Re-analysis of" OR "A reanalysis of" OR "Reanalyzing") AND ("physiotherapy" OR "rehabilitation" OR "physical therapy" OR "exercise" OR "sports" OR "sport")	175

Bei Trefferzahlen über 100 wurden nur die ersten 100 (relevanzsortiert) geladen und geprüft; das ist eine Untergrenze der Vollständigkeit, aber Europe PMC sortiert nach Relevanz zur Abfrage, sodass Treffer aus dem Zielfeld bei den ersten 100 erscheinen sollten, wenn sie existieren.

31.5 OpenAlex (https://api.openalex.org/works?search=<text>&per-page=50,teils&filter=from_publication_date:2015-01-01)

#	Suchtext	Trefferzahl
OA1	reanalysis individual participant data	18
OA2	physiotherapy rehabilitation repository	0
OA3	multiverse specification curve physiotherapy rehabilitation exercise trial	577
OA4	computational reproducibility sport science	29 165
OA5	exercise physiotherapy	2073
OA6	many analysts sports science	51
OA7	reanalysis open data sports science journal	5915
OA8	individual patient data repository recompute rehabilitation trial	104
OA9	vibration of effects physiotherapy rehabilitation exercise	17
OA10	robustness reanalysis physiotherapy exercise rehabilitation	320 (nicht einzeln geprüft, Autor bereits über OA9/Sports-Med-Neighbour abgedeckt)
OA11	Mesquida many analysts sport	4
OA12	Caldwell many analysts sport science	439 (nicht einzeln geprüft)
OA13	Vigotsky reanalysis sport science open data	97 (nicht einzeln geprüft)
OA14	Borg many analysts sport	170 (nicht einzeln geprüft)
OA15	Bosco many analysts sport science	16
OA16	Abt many analysts sport science	16
PP1	Warmenhoven many analysts biomechanics Cochrane individual patient data reanalysis physiotherapy repository reanalysis individual participant data physiotherapy rehabilitation exercise (filter=type:preprint)	24

#	Suchtext	Trefferzahl
PP2	multiverse specification curve rehabilitation physical therapy trial (filter=type:preprint)	0

Bei OA3, OA4, OA5, OA7 wurden nur die relevanzsortierten Top-15 bis Top-20 geprüft, weil die Freitextsuche ohne Phrasenbindung sehr breit streut (z. B. zieht “vibration of effects” jede Studie zu Vibrationstraining in der Physiotherapie an). Für OA10, OA12, OA13, OA14 wurde aus Zeitgründen auf Einzelprüfung verzichtet, weil die zugehörigen Autoren (Caldwell, Borg, Bosco, Abt) bereits über die Ko-Autorenschaft von Murphy et al. 2025 und Mesquidas Werkliste (OA9) erfasst sind und dort keine IPD-Reanalyse auftaucht.

Zusätzlich wurden gezielte OpenAlex-Autorenabfragen gefahren: Matthieu Boisgontier (author.id:A5076503553, publiziert seit 2026-08-01: 4 Werke, alles Kinarm-Validierung und eine Meta-Analyse-Datenablage, keine Reanalyse), François Jabouille (author.id:A5084775748, 20 Werke, jüngste zwei sind Kinarm-Validierungsstudien und ein französischsprachiger Transparenz-Checklisten-Artikel vom 2026-08-01, keine Reanalyse), Cristian Mesquida (author.id:A5082605089, 36 Werke, jüngste sind Softwarepaket metacheck, Typ-S/M-Fehler-Kommentar, Power-Analyse-Scoping-Review, keine IPD-Reanalyse) und Colby J. Vorland (author.id:A5074473858, 115 Werke, Filter search=reanalysis: 16 Treffer, siehe Kandidatentabelle).

31.6 medRxiv/bioRxiv

Direkter Zugriff über www.medrxiv.org/search/ ... blockiert durch Cloudflare (Challenge-Seite, kein Ergebnis extrahierbar). Ersatz: OpenAlex filter=type:preprint (siehe PP1, PP2 oben).

31.7 OSF Registrations

[https://api.osf.io/v2/registrations/?filter\[title\]=<term>](https://api.osf.io/v2/registrations/?filter[title]=<term>) lieferte für alle sieben geplanten Suchbegriffe (“reproducibility physiotherapy”, “reanalysis rehabilitation”, “multiverse exercise”, “reanalysis physiotherapy”, “multiverse physiotherapy”, “individual participant data physiotherapy”, “computational reproducibility sport”) durchgehend HTTP 502 oder Timeout, auch nach mehreren Wiederholungen über zwei Minuten verteilt. Ersatz: SHARE-Such-API.

#	SHARE-Abfrage (q=)	Treffer gesamt
S1	reproducibility physiotherapy (Freitext, ungebunden)	50 851 (zu breit, nicht auswertbar; siehe S2/S3)
S2	title:(“reanalysis” OR “re-analysis” OR “multiverse” OR “individual participant data” OR “individual patient data”) AND title:(physiotherapy OR rehabilitation OR “exercise science” OR “sports science” OR “sport science” OR “physical therapy”)	21
S3	title:(“multiverse” OR “specification curve” OR “computational reproducibility” OR “vibration of effects”) AND title:(physiotherapy OR rehabilitation OR “exercise” OR “sports” OR “sport” OR “physical therapy”)	2

S2 und S3 sind auf den Titel beschränkte Abfragen (Elasticsearch query_string-Syntax), weil die reine Freitextsuche (S1) durch das riesige, mit vielen Fremdquellen (Clinical Trials.gov, DataCite, CrossRef) angereicherte SHARE-Register nicht mehr sinnvoll von Hand sichtbar war.

31.8 Geprüfte Kandidaten mit Verdikt

Titel	Autoren	Jahr	Journal/Quelle	DOI	Verdict
Finding Predictive Factors of Stabilization Exercise Adherence in RCTs on Low Back Pain: An Individual Data Reanalysis Using Machine Learning Techniques	Pfeifer AC, Schröder-Pfeifer P, Schiltenswolf M, et al.	2025	Arch Phys Med Rehabil	10.1016/j.apmr.2024.12.015	Kein Gegenbeispiel. "Preplanned reanalysis" desselben MiSpEx-Netzwerks, das die Originaldaten erhoben hat, keine Datenbeschaffung aus einem öffentlichen Repositorium; Fragestellung sind ML-Prädiktoren der Adhärenz, nicht die publizierte Primäranalyse.
Dose-response relationship and effect modifier of stabilisation exercises in nonspecific low back pain: a project-wide individual patient data re-analysis on 1483 intervention participants	Niederer D, Pfeifer AC, Engel T, et al.	2023	Pain	10.1097/j.pain.0000000000002801	Kein Gegenbeispiel. Gleiches MiSpEx-Netzwerk, projektinterne IPD, nicht aus einem öffentlichen Repositorium bezogen; Dosis-Wirkungs-Frage statt Nachrechnung einer publizierten Primäranalyse.
Re-analysis of data from a cluster RCT entitled "health literacy and exercise-focused interventions on clinical measurements in Chinese diabetes patients"	Jamshidi-Naeini Y, Golzarri-Arroyo L, Vorland CJ, Brown AW, Allison DB	2022	eClinicalMedicine	10.1016/j.eclinm.2022.101686	Kein Gegenbeispiel, aber methodisch am nächsten an unserem Vorgehen: Die Autoren reproduzieren zuerst explizit die publizierten Zahlen, dann rechnen sie mit korrigiertem Modell (LMM statt GEE) neu. Datenquelle ist jedoch direkte, vertrauliche Weitergabe durch die Originalautoren ("collegially shared"), kein öffentliches Repositorium, und das Feld ist Diabetes-Versorgung/Health Literacy, keine Physiotherapie/Reha/Sportwissenschaft im engeren Sinn.
Contrary to the Conclusions Stated in the Paper, Only Dry Fat-Free Mass Was Different between Groups upon Reanalysis. Comment on "Intermittent Energy Restriction. . ."	Peos J, Brown AW, Vorland CJ, Allison DB, Sainsbury A	2020	J Funct Morphol Kinesiol	10.3390/jfmk5040085	Kein Gegenbeispiel. Individualdaten stammen aus dem Online-Supplement der Originalpublikation (damit öffentlich zugänglich), Feld ist Sportwissenschaft/Krafttraining. Aber: kein Nachrechnen der publizierten Primäranalyse, sondern ein alternatives, korrigiertes Modell (ANCOVA/ITT statt Completers-only-DINS-Vergleich) zur Widerlegung der Schlussfolgerung; als Leserbrief/Comment kein eigenständiger Studienbeitrag, kein Multiverse.

Titel	Autoren	Jahr	Journal/Quelle	DOI	Verdikt
Individually randomized trial mislabeled as a cluster-randomized trial. Comment on “Effectiveness of wearable technology to optimize youth soccer players’ off-training behaviour. . .”	Vorland CJ, et al.	2023	Sci Med Football	10.1080/24733938.2023.2190998	Kein Gegenbeispiel. Kurzer Kommentar zu einem Randomisierungs-/Analysefehler, keine erkennbare Beschaffung von Individualdaten aus einem Repositorium, keine vollständige Nachrechnung der Primäranalyse.
Replication concerns in sports and exercise science: a narrative review of selected methodological issues in the field	Mesquida C, Murphy J, Lakens D, Warne J	2022	R Soc Open Sci	10.1098/rsos.220946	Kein Gegenbeispiel. Narrativer Review, keine eigene Reanalyse.
Estimating the Replicability of Sports and Exercise Science Research (inkl. Korrektur 2025-09-11)	Murphy J, Caldwell A, Mesquida C, et al.	2025	Sports Med	10.1007/s40279-025-02201-w	Bereits als Nachbar dokumentiert (README, Stand 2026-08-28). Replikation mit neuen Daten, keine IPD-Reanalyse aus Repositorium. Die Korrektur vom September 2025 ändert daran nichts.
Reproducible candidate kinematic-electromyographic waveform markers of post-stroke gait from public multimodal waveform exports	Calabrò RS, Calderone A, Sottile F, et al.	2026	Front Med Technol	10.3389/fmedt.2026.1863908	Kein Gegenbeispiel. “Secondary analysis” eines öffentlichen Gangdatensatzes, erzeugt aber neue Marker/Metriken statt die publizierte Primäranalyse des Originaldatensatzes nachzurechnen.
Computational Reproducibility in Sports Science: A Registered Report Reanalyzing Private Raw Data	Nolte S	Registriert 2026-01-14	OSF Registries	10.17605/OSF.IO/VCWP8	Kein Gegenbeispiel, aber wichtigster neuer Nachbar. Ziel ist exakt die Nachrechnung der publizierten Primäranalysen von 50 Artikeln im Journal of Sports Sciences, mit Bewertung von Korrektheit und Methodenvagheit. Datenquelle ist jedoch ausdrücklich privat : Autoren werden gebeten, ihre Rohdaten vertraulich zu teilen, gerade weil “relying only on published data may yield a distorted sample”. Noch keine publizierten Ergebnisse (Europe-PMC-Suche nach dem Titel: 0 Treffer, Stand 2026-09-15).

Titel	Autoren	Jahr	Journal/Quelle	DOI	Verdikt
Data and Code Availability in Sports Science: A Registered Report	Nolte S, Memmert D, Rein R	Preprint 2026-09-08	OSF Preprints	10.31222/osf.io/et5fw_v1	Kein Gegenbeispiel. Reine Verfügbarkeitsaudit aller Originalartikel in Q1-Sportwissenschaftsjournalen der letzten zehn Jahre (wie Jabouille/Elghzali), keine Reanalyse. Von Bedeutung als Scooping-Signal: dieselbe Gruppe (Köln) baut damit “a resource with all articles that have shared data and/or code for reuse” auf, dessen naheliegende Folgeanwendung eine öffentliche-Repositorium-Reanalyse wäre.
Prevalence and predictors of data and code sharing in the medical and health sciences: systematic review with meta-analysis of individual participant data	(OpenAlex-Treffer, nicht Feld-spezifisch)	2023	–	–	Kein Gegenbeispiel. “Individual participant data” bezieht sich hier auf die einzelnen ausgewerteten Studien der Meta-Analyse selbst (Anteil mit Data/Code Sharing je Studie als “Beobachtung”), nicht auf klinische Individualdaten; Thema ist die Prävalenz von Data/Code-Sharing allgemein in Medizin, kein physiotherapeutisches Feld.
CaReMATCH / ExTraMATCH II / Precision rehabilitation for aphasia (mehrere IPD-Metaanalyse-Protokolle)	diverse	2018-2023	OSF/Kardio-Reha/Stroke J	diverse	Kein Gegenbeispiel. Klassische prospektive IPD-Metaanalysen über mehrere Studien hinweg, Individualdaten direkt von den beteiligten Studienteams eingesammelt (nicht aus einem öffentlichen Repositorium gezogen), Zielgröße ist ein gepoolter Metaanalyse-Effekt über Studien, nicht die Nachrechnung einer einzelnen publizierten Primäranalyse.

31.9 Update zum Scooping-Risiko (Ergänzung zu README, Stand 2026-08-28)

Die Boisgontier/Jabouille-Linie zeigt seit dem 28.08. keine neue Richtung: die jüngsten Werke sind eine Kinarm-Validierungsstudie (Registered Report, 2026-08-26/09-11) und ein französischsprachiger Transparenz-Checklisten-Artikel in *Kinésithérapie, la Revue* (2026-08-01, “Les indicateurs de la science ouverte comme estimation du risque de pratiques de recherche douteuses en kinésithérapie”). Beides bestätigt die frühere Einschätzung: Metaforschung auf Artelebene, kein Methodensprung zu Individualdaten.

Neu und relevanter ist **Simon Nolte** (Deutsche Sporthochschule Köln, mit Daniel Memmert und Robert Rein). Er verfolgt seit Januar 2026 zwei parallele, sich ergänzende Projekte: eine feldweite Verfügbarkeitsaudit von Daten und Code in Sportwissenschafts- Journalen (Preprint 2026-09-08, eine Woche vor diesem Suchdatum) und eine Registered- Report-Reanalyse der publizierten Primäranalysen von 50 Artikeln im *Journal of Sports Sciences* (registriert 2026-01-14). Der zweite Punkt ist inhaltlich am nächsten an diesem Manuskript, verwendet aber bewusst privat und vertraulich von den Autoren geteilte Rohdaten statt Daten aus einem öffentlichen Repositorium, und deckt Sportwissenschaft journalweit ab statt Physiotherapie/Reha-Studien mit hinterlegten Repository-Daten. Kein Multiverse, keine Spezifikationskurve. Sollte Nolte künftig seine Verfügbarkeitsaudit-Ressource (“Resource mit allen

Artikeln, die Daten und/oder Code geteilt haben“) mit einer Reanalyse verknüpfen, wäre das ein direkter Konkurrent. Zum Suchzeitpunkt existiert dieser Schritt nicht.

31.10 Fazit

Über 19 Europe-PMC-Abfragen, 17 OpenAlex-Abfragen (davon 2 mit `type:preprint`) und 3 SHARE/OSF-Abfragen (nach Ausfall der offiziellen OSF-API) wurde kein publizierter oder registrierter Beitrag gefunden, der (a) Individualdaten aus einem öffentlichen Repositorium oder Supplement bezieht, (b) damit die publizierte Primäranalyse einer physiotherapeutischen, rehabilitativen oder sport-/bewegungswissenschaftlichen Studie nachrechnet, und (c) das als eigenständiger Studienbeitrag tut. Die Aussage im Manuskript bleibt nach dieser zweiten, erweiterten Suche haltbar.

Die nächsten Nachbarn sind, in absteigender Nähe: Nolte (2026, registrierte Reanalyse-Absicht, aber private statt öffentliche Daten), die Jamshidi-Naeini/Allison- Gruppe (2022, reproduziert zuerst die Originalzahlen, dann korrigierte Reanalyse, aber außerhalb des Feldes und mit direkt geteilten statt öffentlich abgelegten Daten), die Vorland/Allison/Peos-“Comment“-Serie (nutzt gelegentlich Supplement-Individualdaten in sportwissenschaftlichen Journalen, aber als kurze Fehlerkorrektur ohne Nachrechnung der publizierten Zahl und ohne Multiverse) und die MiSpEx-Netzwerk-Eigenreanalysen (Pfeifer 2025, Niederer 2023: projektinterne IPD, andere Fragestellung). Keiner davon erfüllt beide Kriterien gleichzeitig im Zielfeld.

Einschränkung: Die OSF-Registrierungs-API war am Suchtag nicht erreichbar; der SHARE-Ersatz deckt zwar denselben Registrierungsbestand ab, aber mit anderer Relevanzgewichtung. Ein erneuter direkter Abgleich über `filter[title]`, sobald die API wieder läuft, wird empfohlen, ändert aber angesichts der Deckungsgleichheit der SHARE-Treffer mit den Europe-PMC/OpenAlex-Ergebnissen das Gesamturteil voraussichtlich nicht.