# 101 年微積分期末小考詳解

何震邦 <jdh8.org>



2014年12月1日

# 再怎麼忙,也要記得.....

# 期末小考何震邦

#### Theorem

I heorer

$$y' = \frac{dy}{dx} \implies \int y' dx = \int dy.$$

$$(uv)' = u'v + uv' \implies uv = \int v du + \int u dv$$

$$(\ln|y|)' = \frac{y'}{y} \implies \ln|y| = \int \frac{dy}{y}.$$

$$\int x^2 \sin(x) \, dx$$

第1顯

#### Solution

設  $u = x^2$  與  $v = \cos(x)$ ,則 u' = 2x 且  $v' = -\sin(x)$ 。

$$\int x^2 \sin(x) dx = -\int u dv = \int 2x \cos(x) dx - x^2 \cos(x).$$

設 u = x 與  $v = \sin(x)$ ,則 u' = 1 且  $v' = \cos(x)$ 。

$$\int x \cos(x) dx = \int u dv = x \cos(x) - \int \cos(x) dx.$$

所以

$$\int x^2 \sin(x) \, dx = 2x \sin(x) + (2 - x^2) \cos(x).$$

# 神奇的導函數與判別式

期末小考何震邦

第1是

第2題

377 J K

第 4 趋

第 5 是

第 6

第7:

第8票

#### **Theorem**

$$4a(ax^2 + bx + c) = (2ax + b)^2 + 4ac - b^2.$$

#### Proof.

$$(2ax + b)^{2} = 4a^{2}x^{2} + 4abx + b^{2}$$

$$(2ax + b)^{2} + 4ac - b^{2} = 4a^{2}x^{2} + 4abx + 4ac$$

$$4a (ax^{2} + bx + c) = 4a^{2}x^{2} + 4abx + 4ac$$

$$4a (ax^{2} + bx + c) = (2ax + b)^{2} + 4ac - b^{2}.$$

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx , \, \sharp \oplus 4ac > b^2$$

期末小考

何震邦

第1周

第2題

.. ..

. .

. .


21- 0 /-

第7是

設 
$$y = \arctan\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}\right)$$
 °

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{\sqrt{4ac - b^2} \left(\frac{(2ax + b)^2}{4ac - b^2} + 1\right)} = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2ax^2 + 2bx + 2c}.$$

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} dy = \frac{2 \arctan\left(\frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}}\right)}{\sqrt{4ac - b^2}}.$$



$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$$
,其中  $4ac < b^2$ 

期末小考

# <sup>何震邦</sup> Solution

$$ax^{2} + bx + c$$
 的兩根為 
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$$

$$\frac{1}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{1}{\beta - \alpha} \left( \frac{1}{x - \beta} - \frac{1}{x - \alpha} \right)$$

$$\int \frac{1}{(x - \alpha)(x - \beta)} dx = \frac{\ln\left|\frac{x - \beta}{x - \alpha}\right|}{\beta - \alpha} = \frac{\ln\left|\frac{2ax - 2a\beta}{2ax - 2a\alpha}\right|}{\beta - \alpha}$$

$$\int \frac{1}{ax^{2} + bx + c} dx = \frac{\ln\left|\frac{2ax + b - \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^{2} - 4ac}}\right|}{\sqrt{b^{2} - 4ac}}.$$

$$\int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} \, dx$$

$$\int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$= \frac{p}{2a} \int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx + \int \frac{q - \frac{bp}{2a}}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$= \frac{p \ln|ax^2 + bx + c|}{2a} + \int \frac{2aq - bp}{2a(ax^2 + bx + c)} dx.$$

$$\int \frac{x}{x^2 - 2x + 2} \, dx$$

第1題

第2題

Arte - EE

210 . 70

SH O R

**界 6** )

弗 *(* )

$$\int \frac{x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

$$= \int \frac{2x - 2}{2(x^2 - 2x + 2)} dx + \int \frac{1}{x^2 - 2x + 2} dx$$

$$= \frac{\ln|x^2 - 2x + 2|}{2} + \arctan\left(\frac{2x - 2}{2}\right)$$

$$= \frac{\ln|x^2 - 2x + 2|}{2} + \arctan(x - 1).$$

# 多項式除法

#### 期末小考

何震邦

第1題

第 3 題

第 4 題

第 5 題

百つ 暦

。 / C

對於任意兩個多項式 A, B, 其中  $B \neq 0$ , 我們都可以找到商 Q 和餘式 R 使得

$$A = BQ + R \tag{1}$$

其中  $\deg(R) < \deg(B)$   $\circ$ 

#### Definition

為了方便,對於 (1) 式,我們定義以下新符號:

$$\lceil B \rceil A = R.$$

# 擴展的餘式算子

#### 期末小考

#### 何震邦

第 1 題

第3題

date a Hi

**現 4** 角

第 5 是

data e E

ΔtΔr → E

#### Definition

設 B, D, N, R 皆為多項式, 其中 B 與 D 互質, 我們定義

$$\lceil B \rceil \frac{N}{D} = R$$

等價於

$$\lceil B \rceil N = \lceil B \rceil DR$$

其中  $\deg(R) < \deg(B)$   $\circ$ 

# 餘式算子的性質

#### 期末小考

#### 何震邦

第1題

第2題第3題

第 4 題

第 5 是

第 6 是

第7題

#### **Theorem**

設 B, D, N 為多項式,F 與 G 為有理函數且 B 與 D 互質。

$$\blacktriangleright \lceil B \rceil FG = \lceil B \rceil (\lceil B \rceil F \lceil B \rceil G)$$

# 部份分式分解算法

期末小考

#### 何震邦

第 1 阅

第 2 題

第3題

第 4 是

第5題

第6

第7日

第8是

#### **Theorem**

對於最簡真分式 A/D,其中

$$D = D_1 D_2 \cdots D_n$$

且  $D_k$  兩兩互質。則 A/D 可以表達為

$$\frac{A_1}{D_1} + \frac{A_2}{D_2} + \dots + \frac{A_n}{D_n}$$

其中對於所有 k,若  $1 \le k \le n$  則

$$A_k = \lceil D_k \rceil \frac{AD_k}{D}$$
.


$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx \ \angle -$$

$$x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1).$$

設 
$$D_1 = x^2 - \sqrt{2}x + 1$$
 與  $D_2 = x^2 + \sqrt{2}x + 1$  °

$$\lceil D_1 \rceil \frac{1}{D_2} = \lceil D_1 \rceil \frac{1}{2^{3/2} x} = \frac{x - \sqrt{2}}{-2^{3/2}}$$

$$\lceil D_2 \rceil \frac{1}{D_1} = \lceil D_2 \rceil \frac{1}{-2^{3/2}x} = \frac{x + \sqrt{2}}{2^{3/2}}.$$



$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx \ \angle \Box$$

$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx$$

$$= \int \frac{x + \sqrt{2}}{2^{3/2} (x^2 + \sqrt{2}x + 1)} dx - \int \frac{x - \sqrt{2}}{2^{3/2} (x^2 - \sqrt{2}x + 1)} dx$$

$$= \frac{\ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1)}{2^{5/2}} - \frac{\ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1)}{2^{5/2}} + \frac{\arctan(\sqrt{2}x + 1)}{2^{3/2}}$$

$$+ \frac{\arctan(\sqrt{2}x - 1)}{2^{3/2}}.$$

#### Hermite reduction

期末小考 何震邦

第4期

假設 m > 2 否則 D 已經 squarefree 了。首先設  $V = D_m$  與  $U = D/V^m$ 。因為 UV' 與 V 互質,我們能以擴展的輾轉相 除法求兩多項式 B. C 使得

$$\frac{A}{1-m} = BUV' + CV$$

其中  $\deg(B) < \deg(V)$ 。兩端同乘  $(1-m)/(UV^m)$  得

$$\frac{A}{UV^{m}} = \frac{(1-m)BV'}{V^{m}} + \frac{(1-m)C}{UV^{m-1}}$$

$$= \frac{B'}{V^{m-1}} - \frac{(m-1)BV'}{V^{m}} - \frac{B'U + (m-1)C}{UV^{m-1}}$$

$$\int \frac{A}{UV^{m}} = \frac{B}{V^{m-1}} - \int \frac{B'U + (m-1)C}{UV^{m-1}}.$$

$$\int \frac{6x^2 - 15x + 22}{(x+3)(x^2+2)^2} dx$$
,  $\exists I$ 

設 
$$A = 6x^2 - 15x + 22$$
,又設  $U = x + 3$  及  $V = x^2 + 2$ 。

$$UV' = 2V + 6x - 4$$

$$18V = (3x + 2)(6x - 4) + 44$$

$$= (3x + 2)(UV' - 2V) + 44$$

$$44 = (3x + 2)UV' + (14x - 6)V$$

$$-A = -6V + 15x - 10$$

$$= -6V + \frac{5(6x - 4)}{2}$$

$$= \frac{5UV'}{2} - 11V.$$

$$\int \frac{A}{2} = \frac{5}{2} + \int \frac{11}{2} dx$$

$$\int \frac{A}{UV^2} = \frac{5}{2V} + \int \frac{11}{UV}.$$

$$\int \frac{6x^2 - 15x + 22}{(x+3)(x^2+2)^2} dx$$
,  $\exists$  II

期末小考

分解部份分式:

$$\frac{11}{(x+3)(x^2+2)} = \frac{1}{x+3} + \frac{3-x}{x^2+2}.$$

$$\int \frac{6x^2 - 15x + 22}{(x+3)(x^2+2)^2} \, dx$$

$$= \frac{5}{2x^2 + 4} + \ln|x - 3| - \frac{\ln(x^2 + 2)}{2} + \frac{3\arctan(\frac{x}{\sqrt{2}})}{\sqrt{2}}.$$

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx$$

第1是

第 2 厢

44° A 116

第5顯

77 O K

44° o 88°

$$\int e^{3x} \sin(2x) \, dx = \frac{e^{3x} \sin(2x)}{3} - \int \frac{2e^{3x} \cos(2x)}{3} \, dx$$
$$\int e^{3x} \cos(2x) \, dx = \frac{e^{3x} \cos(2x)}{3} + \int \frac{2e^{3x} \sin(2x)}{3} \, dx.$$

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx$$

$$= \frac{e^{3x} (3\sin(2x) - 2\cos(2x))}{9} - \int \frac{4e^{3x} \sin(2x)}{9} dx$$

$$= \frac{e^{3x} (3\sin(2x) - 2\cos(2x))}{12}.$$

$$\int_{1}^{5} \frac{1}{x} dx \, , \, \text{分別取左、右黎曼和,} \, n = 4$$

第6顯


#### Solution

左黎曼和為

$$\int_1^5 \frac{1}{x} \, dx \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}.$$

右黎曼和為

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{7}{60}.$$



$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx , 梯形法則, n = 8$$

第1是

第 2 題

第 3 題


第4是

第 5 是

第6月

第7題

$$\int_0^{\pi} \sin(x) \, dx \approx \frac{\pi}{16} \left( \sin(0) + 2 \sum_{k=1}^{7} \sin\left(\frac{k\pi}{8}\right) + \sin(\pi) \right)$$
$$= \frac{\pi}{8} \left( 2 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + 2 \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \sqrt{2} + 1 \right)$$
$$\approx 1.974231601945551.$$



# 累積分布函數 (CDF)

# 期末小考何震邦

第1題

知 1 四

第 3 題

第4題

第5 展

笠ょ馬


44r = 11r

第8顯

#### **Definition**

實值隨機變數 X 的累積分布函數 為

$$F_X(x) = P(X \le x).$$



# 機率密度函數 (PDF)

#### 期末小考

何震邦

第1題

第3題

笛 4 馬

第5題


来 b 第

第7題第8題

#### Definition

隨機變數 X 的**機率密度函數**是 f,其中 f 是非負可積函數,若

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$



# CDF 與 PDF 的關係

# 期末小考何震邦

第8顯

#### 

若 F 是 X 的累積分布函數,則

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) dt.$$

### Theorem

若 
$$F'(c)$$
 存在,則

$$F'(c) = f(c)$$
.

# 期望值

### 期末小考

何震邦

第1是

第2屛

第3題

第4 歷

第5 展

tata FF

Arrive \_\_\_ DTS

第8顯

#### Definition

若隨機變數 X 的機率密度函數為 f,則 X 的期望值為

$$E(X) = \int X dP = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

#### **Theorem**

若隨機變數 X 的機率密度函數為 f,則函數 g(X) 的期望值為

$$E(g(X)) = \int g(X) dP = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx.$$

### 應用題

期末小考

何震邦

第1題

第 3 題

第 4 是

おりだ

第 7 歷

第8顯

In reliability theory, the random variable is often the lifetime of some item, such as a laptop computer battery. The PDF can be used to find probabilities and expectations about the lifetime. Suppose then that the lifetime in hours of a battery is a continuous random variable  $\boldsymbol{x}$  with PDF

$$f(x) = \begin{cases} \frac{12x^2(5-x)}{625} & \text{if } 0 \le x \le 5\\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- 1. Find the probability that the battery lasts at least three hours.
- 2. Find the expected value of the lifetime.

第1題

第 2 題

第3題

第 4 題

第5題

第 6 題

第7題

第8題

#### Solution

$$\int_{3}^{5} \frac{12x^{2} (5 - x)}{625} dx = \left[ \frac{20x^{3} - 3x^{4}}{625} \right]_{3}^{5} = \frac{328}{625}.$$

$$\int_0^5 \frac{12x^3 (5-x)}{625} dx = \left[ \frac{3 (25x^4 - 4x^5)}{3125} \right]_0^5 = 3.$$

# 機率密度函數的圖

#### 期末小考 何震邦

第2題

第 3 題

第 4 題


第 5 題

第6程

第7題第8題

▶ 期望值:3

▶ 中位數: 3.071362159338052



# 謝謝聆聽!

#### 期末小考

#### 何震邦

弗 1 潍

第 2 題

第 4 題

Auto reve

- - - -

果り 第

第7是

第8題



- ▶ 部落格
- ▶ 討論版
- ▶ 系列教材