

PLAN DE EGRESO

AISLAMIENTO POR CONTACTO



1. ¿QUÉ ES EL AISLAMIENTO POR CONTACTO?

Se aplica para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan por contacto DIRECTO (manos, heridas, secreciones) o INDIRECTO (objetos, ropa, picaportes, superficies) con el paciente o su entorno.

- ✓ Puede indicarse por infecciones gastrointestinales (diarrea por *C. difficile*, rotavirus, salmonela), bacterias multirresistentes (SARM/MRSA, BLEE, KPC), heridas o abscesos con secreción, impétigo, escabiosis (piojos), herpes, hepatitis A y E, entre otras.
- ✓ Es una medida de PROTECCIÓN, no un castigo ni señal de peligro: protege a usted, a su familia y a otros pacientes. Su compromiso y cumplimiento protegen la salud de todos.

2. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LAS MEDIDAS?

Depende de su diagnóstico. Estos son los tiempos generales; su médico y epidemiología le confirman el suyo:

GRUPO	ALGUNAS PATOLOGÍAS	TIEMPO DE LAS MEDIDAS
Gastrointestinal (diarrea)	Clostridioides difficile, rotavirus, norovirus, salmonela/shigela	48-72 horas después de que desaparezca la diarrea
Bacterias multirresistentes	SARM/MRSA, BLEE, KPC/CRE	Toda la hospitalización y en casa mientras el médico o epidemiología lo indique
Piel y tejidos blandos	Impétigo, celulitis con secreción, abscesos abiertos, heridas infectadas	Hasta controlar la secreción o que la lesión esté seca; en impétigo, 24 h después de iniciado el antibiótico
Parasitarias	Escabiosis (ácaros), pediculosis (piojos), tungiasis	24 horas después del tratamiento; lave ropa y ropa de cama
Virales de la piel	Herpes simple, herpes zóster localizado	Hasta que las lesiones estén secas y cubiertas
Hepatitis	Hepatitis A y E	7 días después de desaparecer la ictericia (ojos amarillos)
Otras	Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Cándida	Hasta terminar el tratamiento antibiótico

3. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASA

- ✓ LAVADO DE MANOS: el paciente y quien lo cuide deben lavarse las manos ANTES y DESPUÉS de atenderlo, tocar sus heridas o sus secreciones, y siempre antes de comer y después de ir al baño. Use gel antibacterial si no hay agua.
- ✓ GUANTES: quien realice curaciones o manipule secreciones, sondas o drenes debe usar guantes y lavarse las manos después de quitárselos.
- ✓ BATA: si va a tener contacto prolongado y muy cercano con secreciones o heridas, use una bata o delantal que lave después por separado.

4. CUIDADO DE HERIDAS Y SECRECIONES

- ✓ Mantenga las heridas siempre cubiertas con apósito limpio y seco; cámbielo según indicación.
- ✓ Bote los apósitos y pañuelos con secreciones en una bolsa cerrada antes de ponerla en la basura.
- ✓ No toque, rasque ni manipule la herida; no revuelva la ropa usada con la de otras personas.
- ✓ Si egresa con sonda o dren, mantenga la zona limpia y seca según la indicación recibida.

5. LIMPIEZA Y ROPA EN CASA

- ✓ No comparta toallas, ropa de cama, ropa interior, elementos de aseo (jabón, cepillo de dientes, peine, cortauñas) ni utensilios mientras el médico lo indique.
- ✓ Lave su ropa y ropa de cama por separado, con agua caliente y jabón, y séquelas bien, preferiblemente al sol.
- ✓ Limpie y desinfecte a diario las superficies que más toca: picaportes, grifos, mesas, baño y celular.
- ✓ Use baño y toalla individual, si es posible.

6. CONVIVENCIA Y SALIDAS

- ✓ Mantenga las medidas aunque se sienta bien, hasta que el médico o epidemiología confirmen que finalizaron.
- ✓ Evite piscinas y jacuzzis mientras tenga herida abierta, lesiones en la piel o diarrea.
- ✓ Protéjase y proteja a otros: evite contacto prolongado con personas recién operadas, bebés y personas con las defensas bajas (quimioterapia, VIH).
- ✓ No necesita alejarse de su familia: con lavado de manos, heridas cubiertas y limpieza del hogar, la convivencia es segura.

7. SIGNOS DE ALARMA: acuda de inmediato a urgencias o a su EPS si presenta

- ✓ Herida enrojecida, caliente, hinchada o con pus
- ✓ Fiebre igual o mayor a 38 °C
- ✓ La secreción aumenta o tiene mal olor
- ✓ Diarrea intensa o con sangre, o dolor abdominal fuerte
- ✓ Fiebre, escalofríos o cansancio que no cede
- ✓ Confusión, mareo o desmayo
- ✓ Dolor intenso en la herida que no cede
- ✓ Vómito persistente

8. RECUERDE QUE

- ✓ El aislamiento por contacto es temporal y es una medida de protección, no de rechazo.
- ✓ El lavado de manos antes y después de atenderlo es la medida que más protege a usted y a su familia.
- ✓ No suspenda las medidas por sentirse mejor: espere la confirmación del médico o de epidemiología en su cita de control.
- ✓ En su egreso deben entregarle: incapacidad médica, fórmula de medicamentos, órdenes de control y cultivos si están pendientes, y cita de control.
- ✓ Su compromiso y cumplimiento protegen la salud de todos. ¡Gracias por su colaboración!