

PLAN DE EGRESO

PACIENTE CON TUBERCULOSIS (TBC)



1. ¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS Y CÓMO SE TRANSMITE?

La tuberculosis (TBC) es una infección causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis* que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede comprometer garganta, ganglios, huesos y riñones.

- ✓ Se transmite por el AIRE, cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o canta. NO se contagia por abrazos, besos, utensilios, ropa ni por compartir la comida.
- ✓ Síntomas: tos de más de 2 semanas, flema o sangre al toser, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y cansancio.
- ✓ Es CURABLE: entre el 85% y 95% de los pacientes se curan completando el tratamiento. Suspenderlo produce recaídas y bacterias resistentes (TBC resistente), mucho más difícil y costosa de tratar.

2. MI TRATAMIENTO: CUIDADOS CON LA MEDICACIÓN

Su tratamiento tiene dos fases: fase intensiva (2 meses, 4 medicamentos) y fase de continuación (4 a 7 meses, 2 medicamentos). Dura tanto porque la bacteria muere lentamente y solo la eliminación completa evita que vuelva.

- ✓ Tome los medicamentos TODOS los días, a la misma hora y durante TODO el tiempo ordenado (6 a 9 meses), aunque ya se sienta bien. NUNCA los suspenda por su cuenta.
- ✓ Acuda a la toma supervisada (DOT) y a la entrega de medicamentos de su EPS; lleve su documento y este plan.
- ✓ Tómalos 30 minutos ANTES del desayuno con un vaso de agua para mejor absorción. Si le irritan el estómago, tómelos con un alimento ligero y AVISE a su médico.
- ✓ Si olvida una dosis, tómela al recordar; nunca tome doble dosis. No comparta sus medicamentos.

EFFECTOS NORMALES (no se alarme, no suspenda):

- Orina, lágrimas y sudor naranja o rojizo (rifampicina): es normal, no daña; puede manchar lentes de contacto.
- Náuseas leves o poco apetito las primeras 2-4 semanas.
- Dolor leve de articulaciones que cede con reposo.

EFFECTOS DE ALERTA: consulte DE INMEDIATO:

- Ojos o piel AMARILLOS (ictericia) o orina muy oscura.
- Náuseas o vómito que no ceden, dolor abdominal fuerte.
- Visión borrosa o dificultad para distinguir colores (etambutol).
- Salpullido, fiebre o dolor intenso en articulaciones.
- No suspenda por su cuenta: acuda a su EPS o a urgencias.

3. ALIMENTACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO

- ✓ Coma COMPLETO y abundante: la TBC quema muchas calorías. Priorice proteínas (huevo, leche, yogur, carnes, pescado, queso, frijoles, lentejas, garbanzos) para recuperar peso, músculo y defensas.
- ✓ Frutas y verduras todos los días (naranjas, mandarinas, banano, papaya, zanahoria, espinaca): sus vitaminas ayudan a cicatrizar el tejido pulmonar.
- ✓ Tome 1,5 a 2 litros de agua al día; también jugos naturales sin azúcar o sancocho de agua.
- ✓ Si las náuseas le quitan el apetito: porciones pequeñas y frecuentes (5-6 veces al día), alimentos fríos o a temperatura ambiente, y el líquido entre comidas, no durante.
- ✓ Seguridad de los alimentos: leche pasteurizada, carnes y huevos bien cocidos, frutas y verduras crudas bien lavadas.
- ✓ PROHIBIDO el alcohol durante todo el tratamiento (daña el hígado con estos medicamentos) y evite el cigarrillo: retrasa la curación pulmonar.

4. MIS CONTROLES Y CITAS

- ✓ Baciloscopia (examen de esputo): al mes 2, al mes 5 y al finalizar el tratamiento; confirma que los gérmenes desaparecen. Entregue la muestra en el laboratorio con la orden.
- ✓ Valoración médica en cada control del programa de TB; lleve siempre los exámenes, la fórmula y este documento.
- ✓ Saque su cita de control o asista a la asignada, y reclame el resultado de sus exámenes.

5. CÓMO CUIDAR A MI FAMILIA

- ✓ Ventile bien su casa todos los días: abra puertas y ventanas y aproveche el sol de la mañana; la bacteria se concentra en espacios cerrados y oscuros.
- ✓ Use tapabocas las primeras 2-3 semanas (o el tiempo que indique su médico), especialmente cerca de niños, adultos mayores, embarazadas y personas con VIH o diabetes.
- ✓ Etiqueta respiratoria: tosa o estornude en el antebrazo o un pañuelo desechable, bótelo y luego lávese las manos.
- ✓ Las primeras semanas duerma en cuarto ventilado y, si es posible, separado de los demás; lave y seque al sol su ropa de cama.
- ✓ Sus contactos deben valorarse en la EPS aunque se sientan bien; los niños menores de 5 años son prioritarios y también reciben un plan de egreso.

6. CUIDADOS GENERALES Y BIENESTAR

- ✓ Duerma mínimo 8 horas y camine 20-30 minutos diarios según su tolerancia: recupera peso y fortalece los pulmones.
- ✓ Cuide su salud emocional: es normal sentir tristeza o preocupación; hable con su familia y no aíslese. La TBC no es una vergüenza: es común y curable (Ley 2020 de 2020).
- ✓ Tenga a la mano su cédula, la fórmula y las órdenes de control.

7. SIGNOS DE ALARMA: acuda de inmediato a la EPS o a urgencias

- ✓ Tos de más de 2 semanas o con sangre
- ✓ Ojos o piel amarillos (ictericia)
- ✓ Fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso
- ✓ Náuseas o vómito que no ceden
- ✓ Falta de aire o dolor en el pecho
- ✓ Dolor abdominal intenso

✓ Mareo, confusión o desmayo

✓ Visión borrosa o artralgias intensas

8. RECUERDE QUE

- ✓ Completar el tratamiento es la única forma de curarse y de no contagiar a su familia: cada dosis cuenta.
- ✓ Si presenta signos de alarma, acuda de inmediato a un centro hospitalario; no espere la cita de control.
- ✓ En su egreso deben entregarle: incapacidad médica, fórmula de antituberculosos, órdenes de baciloscopia y de control, y cita de toma supervisada (DOT).