Release note for iSanté 18.2

Bugfix

1. Fixed a bug in the HealthQual report. The numerator of the viral load indicator now displays the correct number.

New calculation methods for exposed children

(Condition A or Condition B or Condition C or Condition D) and Condition E

Condition A

The latest PCR in date must be negative. Figure 1 or 2

TESTS VIROLOGIQUES	
Âge	Résultat (Ind=Indeterminé)
PCR Oui ONon	_
en jours en mois	Olég ○Positif ○Ind
○en jours ○en mois	○Nég ○Positif ○Ind
○en jours ○en mois	○Nég ○Positif ○Ind

Figure 1

Analyses de l	aborat	oire										
Date de visite:	04/	04/18 📴 JJ/MM/AA	Sau	vegarder	Tou	tes les fic	iches/Retourner					
TYPE DE VISITE Clinique externe Visite initiale Visite de suivi Consultation PATIENTS , jodely carlens Date de naissance : 08/11/1912 Sexe : H Prénom de la mère : IDENTIFICATEURS Code national : JX1112X Code PC : 346339 No. d'ordre : 11221-610942 Signature du médecin, Prénom : Nom : beaujourt Imprimer l'ordre												
Tests demandés												
Groupe	upe Type Nom du test				ntillon	Supprimer?						
Biologie moleculaire	. 1	PCR		Negatif		×						
Choisir panel/test E	intrez la ch	naîne de recherche :			Recherch	ner						
Hematologie Bi	iochimie	Cytobacteriologie	Bacteriologie	ECBU	Parasitologie	Immur	no-Virologie	Mycobacteriologie	Endocrinologie			
		de resistance TB de resistance VIH										

Figure 2

• Condition B

Exposed child must be checked. Figure 3

STATUT VIH ACTUEL	
Exposé au VIH, statut VIH non confirmé (< 18 mois, pas de	Diagnostic probable d'infection sévère à VIH (< 18 mois en absence de test virologique) préciser critères:
test virologique)	
VIH positif, confirmé par test virologique	Pathologie indicatrice du SIDA (Pneumonie à Pneumocystis Cariini, Candidose oesophagienne, Méningite cryptococcique, Toxoplasmose cérébrale, Syndrome
	cachectique, Sarcome de Kaposi)
VIH positif, confirmé par test sérologique > 18 mois	Présence de deux des pathologies suivantes (Muguet buccal, Candidose buccale, Pneumonie sévère, Septicémie sévère)
Préciser les détails sur tout diagnostic dans la section Antécédents Médicau.	x et Diagnostics.

Figure 3

• Condition C

A Discontinuation form with the mention seroreversion. Figure 4

Cessation, préciser	Coché
ARVs non-disponibles	
Patient a déménagé	
Adhérence inadéquate	
Préférence du patient o	u de la personne responsable
Séroréversion	
Autre raison, <i>préciser</i>	

Figure 4

• Condition D

ARVs prescribed for prophylaxis. Figure 5

(-) NRTIs Coché en Prophylaxie							
Abacavir (ABC)	ORX Prophy	0	300mg comprimé				
	- 1	0	20mg/ml sirop				
Combivir (AZT+3TC)	○Rx Prophy		300mg/150mg				
Didanosine (ddI)	OR) OProphy	0	400mg tablette				
		0	10mg/ml sirop				
Emtricitabine (FTC)	○R: ○Prophy		200mg				
Lamivudine (3TC)	○R: ○Prophy	0	150mg comprimé				
		0	10mg/ml sirop				
Stavudine (d4T)	○R::○Prophy		40mg capsule				
			1mg/ml sirop				
Trizivir (ABC+AZT+3TC)	○R (○ Prophy	0	300mg/300mg/150mg				
Zidovudine (AZT)	○R <mark>(○ P</mark> rophy		300mg capsule				
			10mg/ml sirop				
Tenofovir (TNF)	○R C Prophy	0	300mg				
(-) NNRTIs							
Efavirenz (EFV)	○R (○ Prophy	0	600mg comprimé				
	- -	0	30mg/ml sirop				
Nevirapine (NVP)	○R <mark>t</mark> :○Prophy		200mg comprimé				
			10mg/ml				
Etravirine(ETV)	○R::○Prophy	0					
(-) PIs							
Lopinavir+BostRTV (Kaletra)	OR OProphy	0	40mg/10mg capsule				
		0	80mg/20mg/ml sirop				
Nelfinavir (NFV)	○Rx ○Prophy		250mg comprimé				
		0	200mg/5ml sirop				
Saquinavir (SQV)	ORX Prophy	0	200mg				
Ritonavir (RTV)	Rx Prophy		100mg comprimé				

Condition E No positive PCR during the analysis period.

Adherence to these criteria above will eliminate exposed children from the following reports: Active List of ARV and Pre ARV patients, lost to follow up.


New reports

Children eligible for a PCR

The report runs to date and produce the number and a list of children who deserve a PCR Figure 6 and 7.

Selection Criteria: Condition A or Condition B

- Condition A
 Age (4 weeks 1 month) and exposed child checked. Figure.3
- Condition B
 Age (12 18 months) and positive serological test



Rapports	
Type de rapport	Nom de rapport
Rapports par établissement	Rapport des Catégories de Risque d'Échec Thérapeutique
	Rapport mensuel PEPFAR/OMS par établissement
	Rapport HEALTHQUAL
	Régimes utilisés pour les femmes enceintes
	Rapport mensuel des indicateurs de qualité des soins
	Rapport de surveillance hebdomadaire
	HSIS (rapport du système d'information sanitaire Haïtien)
	Evaluation OE
	Frequentation de l'institution Classé par Utilisateur
	Frequentation de l'institution
	Consultation par jours
	Alerte charge virale
	<u>Liste des patients ayant démarré un régime ARV</u>
	La liste des patients dont la date de renflouement des ARV est prévue dans les 30 prochains jours
	La liste des patients dont la date de renflouement des ARV est arrivée à terme
	Nombre de patients ayant reçu des ARV par période
	Distribution des ARVs en communauté (DAC)
	Charge virale en fonction du nombre de copies/ml (selon la date de demande)
	Charge virale en fonction du nombre de copies/ml (selon la date du resultat)
	Enfants éligibles pour un PCR
	Liste des patients eligibles pour la charge virale mais n'en ayant pas
	Liste des patients eligibles pour une charge virale de controle

Figure 7

HealthQual Report

The following indicators are available again:

INH prophylaxis:

<u>Numerator:</u> Number of enrolled HIV + patients who received INH prophylaxis during the analysis period.

<u>Denominator:</u> Number of HIV + patients enlisted during the review period, excluding patients with active TB, those who died and were transferred, and children who had a negative PCR result.

Screening for TB:

<u>Numerator:</u> Number of HIV + patients assessed for TB enrollment during the analysis period.

<u>Denominator:</u> Number of HIV + patients enrolled in care during the analysis period, excluding deaths, transfers, and children with a negative PCR result.

New Drugs

Raltegravir

- Elvitegravir
- Dolutegravir

ORDONNANCE	Posol		logie journalière	Posologie journalière alternative, préciser	Nombre de jours	DISPENS/ Médicament dispensé		Posologie alternative dispensée, <i>préciser</i>	Nombre de jours alternatifs dispensés, préciser	Nombre de pillules distribuées
(-) Regime ARV les plus courant	₩									
(-) INTIs										
Abacavir (ABC)	○Rx○Prophy		300mg BID			□Oui	[3]			
Combivir (AZT+3TC)	○ Rx ○ Prophy		300mg/ 150mg BID			Oui	-			
Didanosine (ddI)	ORx OProphy		EC 400mg qd			□Oui	3			
Emtricitabine (FTC)	○ Rx ○ Prophy		200mg qd			Oui	-			
Lamivudine (3TC)	ORx Prophy		150mg BID			□ Oui	-			
Stavudine (d4T)	○ Rx ○ Prophy		40mg BID			Oui	-			
Tenofovir (TNF)	O _{Rx} O _{Prophy}		300mg qd			□Oui	-			
Trizivir (ABC+AZT+3TC)	○ Rx ○ Prophy		300mg/ 300mg/ 150mg BID			Oui				
Zidovudine (AZT)	O _{Rx} O _{Prophy}		300mg BID			□0ui	3			
(-) INNTIS										
Efavirenz (EFV)	ORx OProphy		600mg qd			□ Oui	3			
Nevirapine (NVP)	○ Rx ○ Prophy		200mg BID			Oui				
Etravirine(ETV)	ORx Prophy		200mg BID			□ Oui	3			
(-) IPs										
Atazanavir (ATZN)	O Rx O Prophy		400mg qd			Oui	-			
Atazanavir+BostRTV	○ Rx ○ Prophy		300mg/ 100mg qd			Oui	-			
Indinavir (IDV)	○Rx○Prophy		800mg TID			Oui	-			
Indinavir+BostRTV	○ Rx ○ Prophy		800mg/ 200mg BID			Oui	-			
Lopinavir+BostRTV (Kaletra)	ORx OProphy		400mg/ 100mg BID			□Oui	3			
Danunavir(DRV)	○ Ry ○ Prophy	П	300ma 2co RID			□0ui	R			
(-) II										
Raltegravir(RAL)	ORx OProphy		400 mg 1Co BID			□Oui	•			
Dolutegravir(DTG)	○ Rx ○ Prophy		50mg qd			Oui				
Elviltegravir(EVG)	O Rx O Prophy		150mg qd			□Oui				

Figure 8