## Note de mise à jour pour la version 16. 2 d'iSanté

1. Ajout de la fonctionnalité des alertes pour la charge virale (Figure.1).

Critères de sélection	Message d'alerte
<ul> <li>Patient sous ARV</li> <li>6 mois après le début du TAR sans charge virale effectuée (résultat non enregistré)</li> <li>Patient enceinte*</li> <li>Patient sous ARV</li> <li>Pas de charge virale effectuée quatre mois après l'initiation des ARV</li> <li>Patient et VIH positif</li> <li>La dernière charge virale</li> </ul>	<ul> <li>« Le patient est sous ARV depuis 6 mois sans un résultat de charge virale »</li> <li>« La patiente est enceinte, sous ARV depuis 4 mois sans un résultat de charge virale »</li> <li>« La dernière charge virale de ce patient</li> </ul>
enregistrée à au moins 12 mois de plus que la date de visite actuelle	remonte à au moins 12 mois. »
<ul> <li>Patient VIH positif</li> <li>Résultat du test de charge virale:         <ul> <li>&gt; 1000</li> <li>copies/cc ET</li> </ul> </li> <li>Date du résultat de la charge viral à au moins 3 mois de plus que la date actuelle (Date de visite)</li> </ul>	<ul> <li>« La dernière charge virale de ce patient remonte à au moins 3 mois et le résultat était &gt; 1000 copies/ml »</li> </ul>

<sup>\*</sup> Nous utilisons un algorithme prédéfinie dans iSanté pour déterminer le statut de grossesse



Figure 1

2. Ajout de rapport pour la charge virale. "Rapports → Gestion de programme → Rapports par établissement"

Indicateurs	Critères de sélection
Nombre de patient sous ARV depuis 6 mois sans un résultat de charge virale  Nombre de femmes enceintes, sous ARV depuis 4 mois sans un résultat de charge virale	<ul> <li>Patient sous ARV</li> <li>6 mois après le début du TAR sans charge virale effectuée (résultat non enregistré)</li> <li>Patient enceinte*</li> <li>Patient sous ARV</li> <li>Pas de charge virale effectuée quatre mois après l'initiation des ARV</li> </ul>
Nombre de patients ayant leur dernière charge virale remontant à au moins 12 mois	<ul> <li>Patient et VIH positif</li> <li>La dernière charge virale enregistrée à au moins 12 mois de plus que la date de visite actuelle</li> </ul>
Nombre de patients ayant leur dernière charge virale remontant à au moins 3 mois et dont le résultat était > 1000 copies/ml	<ul> <li>Patient VIH positif</li> <li>Résultat du test de charge virale:         <ul> <li>&gt; 1000</li> <li>copies/cc ET</li> <li>Date du résultat de la charge viral à au moins 3 mois de plus que la date</li> </ul> </li> </ul>

## actuelle (Date de visite)

\* Nous utilisons un algorithme prédéfinie dans iSanté pour déterminer le statut de grossesse




Figure 2






Figure 4

- 3. Nouvelle définition pour les actifs et inactifs sous ARV.
  - a. Actif
    - i. Un patient actif sous ARV est un patient qui a eu une visite clinique dans les 90 derniers jours ou qui a encore des ARV en main pendant la période d'analyse (date de prochaine prescription dans le futur)
  - b. Inactif
    - i. Un patient inactif sous ARV est un patient dont la dernière visite clinique remonte à plus de 90 jours ou qui n'a plus d'ARV en main pendant la période d'analyse (date de dernière prescription dans le passe)