

數思期末報告

數學歸納法

第一組：
李泰樂
黃楷恩
吳杰翰
李承源

由來：

數學歸納法的思想可以遠推至歐幾里得（BC330－BC275）。較嚴格的數學歸納法是在16世紀後期才引入的。

最早使用數學歸納法的是十六世紀的數學家弗朗西斯科·馬若利科（1494 - 1575）。在古典數學作品上寫了大量的文章，並且對幾何學和光學做出了許多貢獻。

在《Arithmeicorum Libri Duo》這本書中，馬若利科提出了整數的一系列屬性，並對這些屬性進行了證明。

為了證明其中一些屬性，他設計了數學歸納法的策略。

他在這本書中第一次使用數學歸納法是為了證明前 n 個奇數正整數之和等於 n^2 。

數學歸納法〔Mathematical Induction〕是用來證明某些與自然數 n 有關的數學命題的一種方法。它的步驟是：

驗證 $n=1$ 時命題成立〔這叫歸納的基礎，或遞推的基礎〕；

假設 $n=k$ 時命題成立〔這叫歸納假設，或叫遞推的根據〕，在這假設下證明 $n=k+1$ 時命題成立。

根據1、2可以斷定命題對一切自然數都成立。

法國著名數學家布萊茲·帕斯卡（1623 - 1662）承認馬若利科引用


了這方法，並在他的著作《三角陣算術》中運用了這一方法。因此，一般認為帕斯卡是數學歸納法的主要發明人。由於帕斯卡還沒有表示任意自然數的符號，因此組合公式及證明只能用敘述的方法，1686年丹尼爾·白努利首先採用了表示任意自然數的符號，在他的名著《猜度術》（1713）中包含運用數學歸納法證題的出色例子。

馬若利科的證明是非正式的，並且他從未使用過 "歸納" 一詞。歸納這個字是由英國數學家約翰·沃利斯（1616－1703）使用的。

朱塞佩·皮亞諾（1858 - 1932）的皮亞諾公理中包含了歸納原理。

奧古斯塔斯·德摩根（1806 - 1871）被認為是在1838年使用數學歸納法進行正式證明的主要代表，並且引入了 "數學歸納法" 這一術語。明確陳述了德·摩根定律，將數學歸納法的概念嚴格化。

前n個奇數正整數之和等於 n^2



以此類推。因此，當把它們加起來時，除了最後一個正方形外，所有的東西都被抵消了。

$$1 + 3 + 5 + 7 = (1^2 - 0^2) + (2^2 - 1^2) + (3^2 - 2^2) + (4^2 - 3^2) = 4^2$$

現在讓我們對任何數量的奇數相加進行正式書寫。對於任何k

$$2k + 1 = (k + 1)^2 - k^2$$

因此，前n個奇數的總和，也就是

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2k + 1$$

等於

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k + 1)^2 - k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = n^2$$

皮亞諾公理：

皮亞諾公理（英語：Peano axioms；義大利語：Assiomi di Peano），也稱皮亞諾公設，是義大利數學家朱塞佩·皮亞諾提出的關於自然數的五條公理系統。根據這五條公理可以建立起一階算術系統，也稱皮亞諾算術系統。

其中，一個數的後繼數指緊接在這個數後面的數，例如，0的後繼數是1，1的後繼數是2等等；公理5保證了數學歸納法的正確性，從而被稱為歸納法原理。

皮亞諾的這五條公理用非形式化的方法敘述如下：

1. 0是自然數；
2. 每一個確定的自然數 a ，都有一個確定的後繼數 a' ， a' 也是自然數；
3. 對於每個自然數 b 、 c ， $b=c$ 若且唯若 b 的後繼數= c 的後繼數；
4. 0不是任何自然數的後繼數；
5. 任意關於自然數的命題，如果證明：它對自然數0是真的，且假定它對自然數 a 為真時，可以證明對 a' 也真。那麼，命題對所有自然數都真。

原理及流程：

1. 定義 $P(n)$
 2. $P(0)$ 、 $P(1)$ 成立
 3. $P(m+1)$ 在 $P(m)$ 、 $P(m-1)$ 成立時成立
- 得證 $P(n)$ 對任意自然數 n 成立

延伸變體

當命題 $P(n)$ 只針對大於等於 b 的自然數

1. 證明 $n=b$ 時成立
 2. 證明 $n=m$ ($m \geq n$)成立時 $n=m+1$ 會成立
- 得證 $P(n)$ 對任意自然數 $n \geq b$ 成立

延伸變體

當命題 $P(n)$ 只針對奇數或偶數

- 1.證明 $n=1$ (奇數) $n=0$ 、 2 (偶數)時成立
 - 2.證明 $n=m$ 成立時 $n=m+2$ 會成立
- 得證 $P(n)$ 對任意奇數或偶數成立

遞迴歸納法

當命題 $P(n)$ 只針對 $n=0$ 、 1 、 2 m

- 1.證明 $n=m$ 時成立
 - 2.證明 $n=k$ 成立時 $n=k-1$ 會成立
- 得證 $P(n)$ 對任意 $n=0$ 、 1 、 2 m 成立

完整歸納法

在證明 $n=m$ 成立時，改為證明 $n \leq m$ 成立
再證明 $n \leq m$ 成立時， $n=m+1$ 成立

超限歸納法

把證明 $n \leq m$ 成立時， $n=m+1$ 成立
變成證明 $n < m$ 皆成立時， $n=m$ 成立

例題

試證 $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ 對任意正整數 n 都成立。

pf:

1° $n=1$ 時, 左式 $=1^2=\frac{1}{6}(1)(1+1)(2\cdot 1+1)$, 即原等式成立。

2° 若 $n=k$ 時, 原式成立, 即 $1^2+2^2+\dots+k^2=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)$

則 $k+1$ 時, 左式 $=1^2+2^2+\dots+k^2+(k+1)^2$

$$=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)+(k+1)^2$$

$$=(k+1)((2k^2+k+6k+6)/6)$$

$$=(k+1)((2k^2+7k+6)/6)$$

$$=\frac{1}{6}(k+1)(k+2)(2k+3)=\text{右式}$$

3° 由數學歸納法可知, $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

例題

試證 $1^2+3^2+5^2+\dots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n(2n-1)(2n+1)$ 對任意正整數 n 都成立。

pf:

1° $n=1$ 時, 左式 $=1^2=\frac{1}{3}(1)(1)(2\cdot 1+1)=\text{右式}$, 即原等式成立。

2° 若 $n=k$ 時, 原式成立, 即 $1^2+3^2+\dots+(2k-1)^2=\frac{1}{3}k(2k-1)(2k+1)$

則 $k+1$ 時, 左式 $=1^2+3^2+\dots+(2k-1)^2+(2k+1)^2$

$$=\frac{1}{3}k(2k-1)(2k+1)+(2k+1)^2$$

$$=\frac{1}{3}(2k+1)(k(2k-1)+3(2k+1))$$

$$=\frac{1}{3}(2k+1)(2k^2+5k+3)$$

$$=\frac{1}{3}(k+1)(2k+1)(2k+3)=\text{右式}$$

3° 由數學歸納法可知, $1^2+3^2+5^2+\dots+n^2=\frac{1}{3}n(2n-1)(2n+1)$

例題

設 n 為正整數，試證 $1+2+3+\dots+(n-1)+n+(n-1)+\dots+3+2+1=n^2$

pf:

1° 當 $n=1$ 時,左式=1,右式= 1^2 ,左式=右式,即原等式成立。

2° 若 $n=k$ 時,原式成立,即 $1+2+3+\dots+(k-1)+k+(k-1)+\dots+3+2+1=k^2$

則 $n=k+1$ 時,左式= $1+2+3+\dots+(k-1)+k+(k+1)+k+(k-1)+\dots+3+2+1$

$$=k^2+(k+1)+k$$

$$=k^2+2k+1$$

$$=(k+1)^2$$

$$=右式$$

3°由數學歸納法可知, $1+2+3+\dots+(n-1)+n+(n-1)+\dots+3+2+1=n^2$

例題

試證 $(1+1/1)(1+1/3)(1+1/5)\dots(1+1/2n-1)>\sqrt{2n+1}$ ($n\geq 2, n\in\mathbb{N}$)

pf:

1° 當 $n=2$ 時,左式= $(1+1/1)(1+1/3)=8/3$,右式= $\sqrt{5}$,因為 $8/3>\sqrt{5}$,故不等式成立。

2° 若 $n=k$ 時,不等式成立,即 $(1+1/1)(1+1/3)(1+1/5)\dots(1+1/2k-1)>\sqrt{2k+1}$

則 $n=k+1$ 時,左式= $(1+1/1)(1+1/3)(1+1/5)\dots(1+1/2k-1)(1+1/2k+1)$

$$>\sqrt{2k+1}(1+1/2k+1)=\frac{2k+2}{\sqrt{2k+1}}$$

$$右式=\sqrt{2k+3}, 證 \frac{2k+2}{\sqrt{2k+1}}>\sqrt{2k+3}, 只需證 2k+2>\sqrt{(2k+1)(2k+3)}, 即證$$

$4k^2+8k+4>4k^2+8k+3$,即證 $4>3$,顯然成立,故當 $n=k+1$ 時,不等式成立。

由1° 2°可知,原不等式對任意 $n\geq 2, n\in\mathbb{N}$ 恆成立。

資料來源：

歷史與由來：

<https://zhidao.baidu.com/question/10747961>

前 n 個奇數正整數之和等於 n^2 ：<https://www.quora.com/Why-is-the-sum-of-the-first-n-odd-integers-n-2>

皮亞諾公理：

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9A%AE%E4%BA%9A%E8%AF%BA%E5%85%AC%E7%90%86>

原理及流程：

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%BD%92%E7%BA%B3%E6%B3%95>

例題一：

[:https://youtu.be/hyvTl036PmA](https://youtu.be/hyvTl036PmA)

例題二：

<https://youtu.be/Dgy91ZafMY0>

例題三：

<http://www.pat-soi.org/wp-content/uploads/2017/08/%E6%95%B8%E5%AD%B8%E6%AD%B8%E7%B4%8D%E6%B3%95%E7%B7%B4%E7%BF%92%E9%A1%8C%E7%AD%94%E6%A1%88.pdf>

例題四：

<https://kknews.cc/education/6o5l2xp.html>