
¿Deja huella vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18
Canal	Estrés temprano: miedo, ingresos, vivienda, salud mental de la madre

¿Importa la edad a la que llega el shock?



Teoría

$\theta_{t+1} = f_t(\theta_t, I_t, s_t)$

Si $\partial f_t / \partial s_t$ cambia con t, el mismo shock deja una huella distinta según la edad.

Estimación


$\beta_a = \tau(a) - \tau(2)$

Edad a frente a 2 años, comunas afectadas frente a no afectadas, con efectos fijos de comuna y de cohorte.

Identifica la forma de τ, no su nivel.


θ: capital humano; I: inversión; s: shock. Cunha y Heckman 2007; Knudsen 2004; Lupien et al. 2009.

Salud mental: mejor si lo vivieron con 2 años




Frente a quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %. PHQ-4: lo responde el adolescente. CBCL: lo llena el cuidador, de 6 a 18 años.

Resto de resultados: pocas diferencias por edad



Estadístico t de cada edad frente a 2 años; estrellas al 10, 5 y 1 %. 10 de 138 diferencias con p < 0,05; el azar daría 7.

Lactancia: el destete no explica la brecha



Niños que mamaban el 27-F; zona afectada frente a no afectada, IC al 95 %. Placebo: destete en los 4 meses anteriores. Efecto indirecto: primera etapa por efecto del destete, bebés de 6–11 meses.