¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18

Dos mecanismos posibles

	Cómo opera	A quién afecta	Cómo lo medimos
El hogar	El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto entre los padres	A todos los hijos, sea cual sea su edad	Índices de 2012 y 2017
Transmisión del estrés de la madre	El bebé regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite por el contacto físico y por el cortisol, la hormona del estrés, que pasa a la leche materna	A los bebés, que aún dependen fisiológicamente de la madre	Estrés de la madre tras el terremoto y si el bebé seguía siendo amamantado

Hogar, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Transmisión del estrés, Persson y Rossin-Slater 2018 en el embarazo; Waters, West y Mendes 2014, Hostinar, Sullivan y Gunnar 2014 y Nolvi et al. 2018 después del parto.


Cómo lo medimos

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

El hogar cambió igual a toda edad y no explica la brecha




Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

El estrés materno predice síntomas en hijas amamantadas



Seguir siendo amamantado el 27-F indica que el bebé aún dependía fisiológicamente de la madre; no distinguimos si opera por el contacto o por el cortisol de la leche. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo



Es habitual que los padres no detecten la ansiedad y la depresión de sus hijos adolescentes; en la muestra, PHQ-4 y CBCL correlacionan 0,30; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambos indicios con $p < 0{,}10$.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Sugieren

- Frente a las expuestas con 2 años, más síntomas en las expuestas de bebés, +0,30 DE, al año, +0,17, y a los 3–4 años, +0,18
- El hogar medido cambió igual a toda edad y no explica esas diferencias
- El estrés de la madre fue igual a toda edad, pero solo predice síntomas en las hijas que aún eran amamantadas, el 62 % de las expuestas de bebés y el 4 % de las de 3–4 años

Queda abierto

- El estrés de la madre se mide con una pregunta de sí o no, dos años después, y no distinguimos si opera por el contacto con la madre o por el cortisol que pasa a la leche
- Qué explica el efecto en las expuestas a los 3–4 años. No pasa por el hogar ni por la madre, y un recuerdo de esa edad rara vez llega a la adolescencia; Bauer y Larkina 2014

En varones, sin efecto en síntomas; indicios débiles en conducta y consumo.