¿Deja huella vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18
Canal	Estrés temprano: miedo, ingresos, vivienda, salud mental de la madre


¿Importa la edad a la que llega el shock?

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

Resto de resultados: pocas diferencias por edad



Estadístico t de cada edad frente a 2 años; estrellas al 10, 5 y 1 %. 10 de 138 diferencias con p < 0,05; el azar daría 7.

Lactancia: dejar el pecho no explica la brecha



Bebés que tomaban pecho el 27-F. La comparación mide lo mismo antes del terremoto: si ya había diferencia, no la causó el terremoto.