¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18

Mecanismos de transmisión y ventanas de sensibilidad

	Cómo opera	Grupo vulnerable	En ELPI
Entorno socioeconómico y familiar	Deterioro patrimonial, caída de ingresos y conflicto parental	Transversal a todas las edades	Sí, 2012 y 2017
Regulación diádica y programación lactacional	Alteración del cuidado sensible y transferencia de glucocorticoides vía lactancia materna	Lactantes en dependencia regulatoria	Sí, estrés y lactancia
Procesamiento cognitivo directo	Codificación de memoria episódica del trauma tras la amnesia infantil	Primera infancia tardía	No

Entorno, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Regulación diádica, Gunnar y Quevedo 2007; Hinde et al. 2015. Memoria episódica, Bauer 2015.


Cómo lo medimos

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

En mujeres, el efecto por edad tiene forma de U




PHQ-4, mujeres, n = 4.961. Diferencia con quienes tenían 24–35 meses, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %. En varones, nada a ninguna edad.

El hogar cambió igual a toda edad y no explica la brecha




Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas. Tramos agrupados para ganar potencia al cruzar con índices y submuestras.

Asociación concentrada en díadas con lactancia activa



Estrés agudo que la madre reporta en 2012. Lactancia activa como proxy de exposición bioquímica y de contacto diádico intensivo; no aísla el canal lácteo. Se mantiene al dejar variar el efecto con la educación y el empleo de la madre y con la edad. Al centro, mujeres, EF y controles; IC al 95 %.

En varones, sin sustitución hacia conducta o consumo



Divergencia informante-paciente típica en sintomatología internalizante adolescente; en la muestra, r = 0,30 entre PHQ-4 y CBCL; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. Varones, solo un indicio externalizante, p = 0,05.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Sugieren

- Heterogeneidad marcada por la edad de exposición. El efecto aparece en las expuestas como lactantes y desde los 42 meses
- El entorno familiar medido cambió igual a toda edad y no explica esas diferencias
- El estrés materno se asocia a síntomas solo en díadas con lactancia activa, en línea con una vulnerabilidad neuroendocrina temprana

Queda abierto

- La medida de estrés es retrospectiva y binaria, sujeta a error de medición y atenuación; explica una parte pequeña de la brecha
- La lactancia activa no separa el cortisol lácteo del contacto diádico
- Por qué no hay efecto entre 18 y 41 meses, y si el efecto desde los 42 meses refleja codificación de memoria episódica, que no medimos

Solo en mujeres; en varones, nada en síntomas, conducta ni consumo.