¿Deja huella vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18
Canal	Estrés temprano: miedo, ingresos, vivienda, salud mental de la madre

Dos patrones. Ninguno se sostiene como efecto duradero.

ELPI: los mismos niños de 2010 a 2024




10.003
adolescentes nacidos en 2006–2009

77 %
en la zona afectada

2024
única ola con PHQ-4, solo para esta cohorte

PHQ-4: dos preguntas de ansiedad y dos de depresión, respondidas por el adolescente. No hay una cohorte nacida después del terremoto con PHQ-4.


Dos patrones a los 15–18 años en la zona afectada



Coeficientes en DE con intervalos al 95 %; efectos fijos de comuna y cohorte, controles, errores agrupados por comuna. (a) Chicas, N = 4.961; chicos, N = 5.035. (b) Tomaba pecho el 27-F × zona afectada, bebés de 6–11 meses, N = 1.267; inferencia por aleatorización, p = 0,009.


Los diseños en niveles no pasan sus propias pruebas

El diseño del paper compara edades dentro de la comuna: no dice si el daño dura.



(a) Variables previas al terremoto, comunas más y menos sacudidas de una región. (b) 2017 salvo vocabulario, 2024. Placebo: nacidos en 2011–12 frente a 2013 o después, ninguno vivió el terremoto.

La lactancia no pasa la prueba médica



Predicción fijada antes	Resultado	
Igual con lactancia de 2010	+0,18, p = 0,11	✗
Crece con angustia materna	+0,06, p = 0,87	✗
Señal temprana, al año	−0,34, p = 0,007	✗
Mayor en niñas	dif. p = 0,40	≈
Ansiedad más que conducta	+0,27 y +0,18	≈
Mayor a los 6–8 meses	dif. p = 0,77	≈

✗ falla ≈ no distingue

Sin niveles y sin mecanismo, no hay efecto duradero que defender.

Bebés de 6–11 meses el 27-F. La medicina predice más miedo y afecto negativo en el primer año por el cortisol de la leche: Glynn et al. 2007, Grey et al. 2013, Nolvi et al. 2018.