¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18

Mecanismos de transmisión y ventanas de sensibilidad

	Cómo opera	Quién está expuesto	Medida en ELPI
El hogar	Caída de ingresos, daño a la vivienda y conflicto entre los padres	Todos los hijos, sea cual sea su edad	Índices de 2012 y 2017
El estrés de la madre	El bebé reproduce la activación fisiológica de la madre y pierde el amortiguamiento que ella da a su respuesta al estrés	Bebés, cuya respuesta al estrés aún depende de la madre	Estrés tras el terremoto y lactancia, como medida de cercanía

Hogar, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Estrés de la madre, Waters, West y Mendes 2014; Hostinar, Sullivan y Gunnar 2014; Essex et al. 2013.


Cómo lo medimos

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

El hogar cambió igual a toda edad y no explica la brecha




Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

El estrés materno solo se asocia a síntomas con lactancia



La lactancia activa mide cercanía física y fisiológica con la madre, por contacto y por el cortisol de la leche; Waters, West y Mendes 2014; Nolvi et al. 2018. Al centro, mujeres de todas las edades, con EF y controles; se mantiene con la educación y el empleo de la madre y con la edad. IC al 95 %.

En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo



Divergencia informante-paciente típica en síntomas internalizantes en la adolescencia; en la muestra, r = 0,30 entre PHQ-4 y CBCL; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambos indicios con p < 0,10.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Sugieren

- Frente a las expuestas con 2 años, más síntomas en las expuestas de bebés, +0,30 DE, al año, +0,17, y a los 3–4 años, +0,18
- El hogar medido cambió igual a toda edad y no explica esas diferencias
- El estrés materno, igual a toda edad, solo se asocia a síntomas con lactancia activa, que baja del 62 % en bebés al 4 % a los 3–4 años

Queda abierto

- La medida de estrés es retrospectiva y binaria, sujeta a error de medición y atenuación, y la lactancia no separa contacto de leche
- Las expuestas a los 3–4 años: no pasa por el hogar ni por la madre, y un recuerdo de esa edad rara vez llega a la adolescencia; Bauer y Larkina 2014

En varones, sin efecto en síntomas; indicios débiles en conducta y consumo.