

1. Cenário: Validar resposta científica afirmativa sobre indicação do Floracol para diarreia infantil com citação de fonte

Prompt Sugerido: "O Floracol é indicado para diarreia infantil?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Responder afirmativamente.
- ☐ Mencionar que Floracol é suplemento simbiótico (B. lactis B94 + inulina).
- ☐ Informar evidência clínica em crianças a partir de 4 anos.
- ☐ Citar redução de duração da diarreia aguda em casos de rotavírus.
- ☐ Citar fontes: "Erdoğan et al., 2012; Tremblay et al., 2023; Monografia Floracol, 2025".

Resposta do agente:

Sim, Dra. Laura! O Floracol é indicado para o tratamento da diarreia aguda em crianças. Estudos clínicos demonstraram que o *Bifidobacterium animalis* ssp. *lactis* cepa B94, presente no Floracol, reduz significativamente a duração da diarreia aguda. Em um estudo, a duração média da diarreia foi de $4,1 \pm 1,3$ dias no grupo tratado com B94, comparado a $6,6 \pm 1,7$ dias no grupo tratado com *Saccharomyces boulardii* e $7,0 \pm 1,6$ dias no grupo de controle .

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

2. Cenário: Validar resposta sobre estudo comparativo entre B94 e *Saccharomyces boulardii* (Erdoğan 2012)

Prompt Sugerido: "Como o Floracol se compara ao *Saccharomyces boulardii* na gastroenterite pediátrica?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Citar estudo Erdoğan et al., 2012.
- ☐ Informar comparação entre B. lactis B94 e *Saccharomyces boulardii*.
- ☐ Mencionar que grupo B94 teve diarreia por cerca de 4 dias.
- ☐ Mencionar que outros grupos ficaram em média 6 a 7 dias.
- ☐ Informar melhor desempenho clínico do B94.

Resposta do agente:

O Floracol, que contém *Bifidobacterium lactis* B94, demonstrou ser mais eficaz do que o *Saccharomyces boulardii* na redução da duração da diarreia em crianças com gastroenterite por rotavírus. Em um estudo, a duração média da diarreia foi de $4,1 \pm 1,3$ dias no grupo tratado com B94, comparado a $6,6 \pm 1,7$ dias no grupo tratado com *Saccharomyces boulardii* e $7,0 \pm 1,6$ dias no grupo de controle [5]. Isso indica que o Floracol pode oferecer uma recuperação mais rápida em casos de gastroenterite pediátrica.

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

3. Cenário: Validar resposta quantitativa sobre redução de 2 a 3 dias na duração da diarreia

Prompt Sugerido: "Quanto tempo de diarreia foi reduzido com o uso do produto?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Citar estudo Erdoğan et al., 2012.
- ☐ Informar "grupo com B. lactis B94 teve diarreia por cerca de 4 dias".
- ☐ Informar "outros grupos ficaram em média 6 a 7 dias".
- ☐ Concluir explicitamente "melhora de 2 a 3 dias mais rápida".

Resposta do agente:

O uso do Floracol reduziu a duração da diarreia em crianças, em média, de $5,2 \pm 1,3$ dias no grupo controle para $3,9 \pm 1,2$ dias no grupo tratado com *Bifidobacterium lactis* B94, resultando em uma redução média de 31 horas [5].

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

4. Cenário: Validar esclarecimento que B94 tem benefício em diversas causas de diarreia, não apenas rotavírus

Prompt Sugerido: "O Floracol serve só para casos de rotavírus?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Esclarecer "Não apenas!" ou similar.

- [] Informar que B94 mostrou benefício em diversas causas de diarreia aguda.
- [] Destacar que o "destaque foi no rotavírus, onde resultados foram mais expressivos".
- [] Citar fontes: "Erdoğan et al., 2012; Tremblay et al., 2023".

Resposta do agente:

O Floracol não é indicado apenas para casos de rotavírus. Ele pode ser utilizado em outras formas de diarreia aguda, ajudando a restaurar a flora intestinal e a reduzir a duração dos sintomas. Estudos mostram que ele é eficaz na redução da duração da diarreia em geral, não se limitando apenas ao rotavírus .

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

5. Cenário: Validar orientação sobre importância do início precoce nas primeiras 24h (Tremblay 2023)

Prompt Sugerido: "Faz diferença se começar a tomar logo no início da diarreia?"

Checklist da Resposta:

- [] Confirmar "Tem sim!" ou afirmativa similar.
- [] Informar "quando B94 é iniciado nas primeiras 24h".
- [] Informar "redução da duração da diarreia é ainda mais significativa".
- [] Citar fonte: "Tremblay et al., 2023".

Resposta do agente:

{"categoria":"DUVIDA_PRODUTO"}

Começar a tomar o Floracol logo no início da diarreia pode sim fazer diferença. Pacientes que iniciaram o tratamento nas primeiras 24 horas do processo diarreico apresentaram uma duração menor da diarreia ($3,9 \pm 1,1$ dias) em comparação com aqueles que começaram após o primeiro dia de doença ($4,8 \pm 1,8$ dias; $p=0,002$) .

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

6. Cenário: Validar resposta detalhada sobre sintomas do IBS que melhoram com B94 (Baştürk 2016)

Prompt Sugerido: "Quais sintomas do IBS têm melhoras significativas com o uso?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Citar estudo "Baştürk et al., 2016".
- ☐ Informar que é simbiótico com "Bifidobacterium lactis B94 + inulina".
- ☐ Listar sintoma: "distensão e empachamento".
- ☐ Listar sintoma: "dificuldade para evacuar".
- ☐ Listar sintoma: "presença de muco nas fezes".

Resposta do agente:

O uso do Floracol, que contém *Bifidobacterium lactis* B94 e inulina, mostrou melhora significativa em vários sintomas do Síndrome do Intestino Irritável (IBS) em crianças. Os sintomas que mais melhoraram foram:

- **Empachamento e sensação de estômago cheio:** Houve uma redução significativa de 65% para 13% no grupo que usou o simbiótico ($p < 0,001$).
- **Distensão após as refeições:** Melhorou de 69,6% para 30,4% ($p = 0,004$).
- **Dificuldade para evacuar:** Reduziu de 56,5% para 21,7% ($p = 0,021$).
- **Muco nas fezes:** Melhorou de 52,2% para 17,4% ($p = 0,021$)  .

   1 fonte

 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

7. Cenário: Validar resposta afirmativa sobre segurança de uso concomitante com antibióticos (İşlek 2015)

Prompt Sugerido: "Posso usar Floracol junto com antibiótico?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Confirmar que pode ser usado com antibióticos.
- ☐ Citar estudo İşlek et al., 2015.
- ☐ Mencionar uso no tratamento de *H. pylori*.
- ☐ Informar que o simbiótico não interferiu na erradicação da bactéria.

Resposta do agente:

Sim, Dra. Laura! O Floracol pode ser usado junto com antibióticos. Estudos mostram que o *Bifidobacterium lactis* B94, presente no Floracol, é seguro e bem tolerado quando usado como adjuvante na terapia de erradicação do *Helicobacter pylori* em crianças. Não houve interferência na eficácia dos antibióticos e os efeitos colaterais foram significativamente menores no grupo que usou o simbiótico .

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.pdf

8. Cenário: Validar resposta quantitativa sobre redução de efeitos adversos de antibióticos (17% vs 63%)

Prompt Sugerido: "O produto tem algum impacto nos efeitos adversos dos antibióticos?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar dados quantitativos "17% vs 63%".
- ☐ Esclarecer que grupo com simbiótico teve 17% de efeitos adversos.
- ☐ Esclarecer que grupo sem simbiótico teve 63% de efeitos adversos.
- ☐ Mencionar significância estatística " $p < 0,01$ ".
- ☐ Citar fonte İşlek et al., 2015.

Resposta do agente:

Sim, Dra. Laura! O Floracol, que contém *Bifidobacterium lactis* B94 e inulina, pode ajudar a reduzir os efeitos adversos associados ao uso de antibióticos.

No estudo de İşlek et al. (2015), foi observado que o grupo que utilizou o simbiótico teve uma taxa significativamente menor de efeitos colaterais, como gosto anormal, eructação, náusea, vômito, dor abdominal e diarreia, em comparação ao grupo placebo. A taxa de efeitos colaterais moderados ou severos foi de 21% no grupo que usou o simbiótico, enquanto no grupo placebo foi de 78% ($p < 0,01$) .

Portanto, o uso do Floracol pode melhorar a tolerância ao tratamento antibiótico, reduzindo os efeitos adversos e aumentando a adesão ao tratamento .

   1 fonte

 9. İşlek_Bifidobacterium lactis B94 plus inulin for Treatment of Helicobacter pylori infection in children....

9. Cenário: Validar informação correta sobre faixa etária de uso (a partir de 4 anos)

Prompt Sugerido: "A partir de qual idade posso indicar para meus pacientes?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar "a partir de 4 anos".
- ☐ Citar fonte "Monografia Floracol, 2025".

Resposta do agente:

O Floracol pode ser indicado para crianças a partir de **4 anos de idade**. Estudos clínicos foram realizados com crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos, demonstrando a segurança e eficácia do produto nessa faixa etária .

   1 fonte

 Monografia Floracol_Formatada.docx

10. Cenário: Validar extração correta da faixa etária do estudo (5 meses a 5 anos - Erdoğan 2012)

Prompt Sugerido: "Qual a faixa etária das crianças analisadas nos estudos?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar faixa etária "5 meses a 5 anos". (Atenção para não confundir com a indicação do produto).

Resposta do agente:

Nos estudos analisados, as faixas etárias das crianças foram as seguintes:

1. **Estudo sobre Síndrome do Intestino Irritável (IBS):** Incluiu crianças entre 4 e 16 anos de idade  .
2. **Estudo sobre Diarreia Aguda:** Incluiu crianças com idades entre 5 meses e 5 anos  .

Se precisar de mais detalhes sobre os estudos, estou à disposição!

   2 fontes

-  6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...
-  Monografia Floracol_Formatada.pdf

11. Cenário: Validar extração de dados de sazonalidade dos casos de rotavírus (Erdoğan 2012)

Prompt Sugerido: "Qual foi a sazonalidade dos casos de rotavírus observada no estudo?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Apresentar dados de sazonalidade corretos conforme o estudo.
- ☐ Mencionar período ou meses de maior incidência se disponível no texto.

Resposta do agente:

Entendi sua dúvida, mas precisarei verificar com outro departamento para fornecer a informação precisa. Posso ajudar com mais alguma dúvida sobre o Floracol?

  

12. Cenário: Validar extração de taxas de recuperação completa por grupo (Simbiótico 39,1% - Baştürk 2016)

Prompt Sugerido: "Qual foi a taxa de recuperação completa no estudo de IBS?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar taxa de recuperação do grupo simbiótico: "39,1%".

- [] Apresentar comparação com outros grupos se questionado/disponível (ex: placebo 12,5%).

Resposta do agente:

No estudo sobre Síndrome do Intestino Irritável (IBS) conduzido por Baştürk et al. (2016), a taxa de recuperação completa foi de 39,1% no grupo que recebeu o tratamento simbiótico (Bifidobacterium lactis B94 + inulina). Em comparação, o grupo probiótico teve uma taxa de recuperação de 29,2%, e o grupo prebiótico teve 12,5%. A diferença entre o grupo simbiótico e o prebiótico foi estatisticamente significativa ($p=0,036$) .

   1 fonte

 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

13. Cenário: Validar extração de dados de prevalência dos sintomas mais frequentes no IBS (Baştürk 2016)

Prompt Sugerido: "Quais os sintomas mais prevalentes no IBS pediátrico segundo o estudo?"

Checklist da Resposta:

- [] Apresentar dados de prevalência dos sintomas mais frequentes.
- [] Incluir percentuais quando disponíveis no PDF.

Resposta do agente:

No estudo sobre IBS pediátrico, os sintomas mais prevalentes foram:

- Urgência súbita para evacuar (66,2%)
- Empachamento após as refeições (64,8%)
- Eructações (64,8%)
- Dificuldade para evacuar (63,3%)
- Sensação de evacuação incompleta (56,3%)

Os sintomas menos frequentes incluíram a presença de muco nas fezes (42,3%) e dor abdominal

📄 .

📄 👍 🗨 1 fonte

📄 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

14. Cenário: Validar extração precisa de posologia e duração do tratamento (5x10⁹ UFC, 2x/dia, 4 semanas)

Prompt Sugerido: "Qual foi a dose e duração usada nos estudos clínicos?"

Checklist da Resposta:

- [] Informar dose "5x10⁹ UFC".
- [] Informar frequência "2 vezes ao dia".
- [] Informar duração "4 semanas".

Resposta do agente:

Nos estudos clínicos, a dose utilizada foi de 5x10⁹ UFC de *Bifidobacterium animalis ssp. lactis* B94 e 900 mg de inulina, administrados duas vezes ao dia. A duração do tratamento foi de 4 semanas para o estudo sobre Síndrome do Intestino Irritável (IBS) 📄 .

📄 👍 🗨 1 fonte

📄 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

15. Cenário: Validar extração de dados quantitativos sobre efeitos adversos (17% vs 63%, p<0,01)

Prompt Sugerido: "Quais os dados estatísticos de efeitos adversos no estudo com antibióticos?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar "17% no grupo simbiótico".
- ☐ Informar "63% no grupo controle".
- ☐ Informar " $p < 0,01$ " indicando significância estatística.

Resposta do agente:

No estudo sobre o uso de *Bifidobacterium lactis* B94 com inulina como adjuvante na terapia de *Helicobacter pylori*, foi observado que o grupo que recebeu o simbiótico apresentou uma taxa de efeitos adversos significativamente menor. Apenas 17% dos pacientes no grupo simbiótico relataram efeitos adversos, em comparação com 63% no grupo placebo, com $p < 0,01$ .

   1 fonte

 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

16. Cenário: Validar extração de metadados do estudo (período e local - İşlek 2015)

Prompt Sugerido: "Onde e quando foi realizado o estudo sobre H. pylori?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar período do estudo (se disponível no PDF).
- ☐ Informar local/instituição do estudo (se disponível no PDF).

Resposta do agente:

O estudo sobre *Helicobacter pylori* foi realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Akdeniz, em Antalya, Turquia, entre julho de 2012 e abril de 2013 .

   1 fonte

 9. İşlek_Bifidobacterium lactis B94 plus inulin for Treatment of Helicobacter pylori infection in children....

17. Cenário: Validar extração de dados do subgrupo rotavírus com significância estatística (Tremblay 2023)

Prompt Sugerido: "Quais os dados específicos para o subgrupo rotavírus no estudo Tremblay?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Apresentar dados quantitativos do subgrupo rotavírus.
- ☐ Mencionar significância estatística (valor p).

Resposta do agente:

No estudo revisado por Tremblay, o subgrupo de crianças com gastroenterite induzida por rotavírus que recebeu o simbiótico (*Bifidobacterium lactis* B94 + inulina) apresentou uma resolução da diarreia significativamente mais rápida, cerca de **3 dias mais cedo** do que o grupo controle. A duração média da diarreia no grupo simbiótico foi de **4,1 ± 1,3 dias**, comparado a **7,0 ± 1,6 dias** no grupo controle, com $p < 0,001$ .

   1 fonte

 8. Tremblay_Review and perspectives on bifidobacterium lactis for infants' and children's health..pdf

18. Cenário: Validar extração de detalhes do protocolo de tratamento H. pylori (antibióticos e doses)

Prompt Sugerido: "Qual foi o protocolo antibiótico usado no estudo do İşlek?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Listar antibióticos usados no protocolo.
- ☐ Informar doses dos medicamentos.
- ☐ Informar duração do tratamento antibiótico.

Resposta do agente:

No estudo conduzido por İşlek et al., o protocolo antibiótico utilizado para o tratamento da infecção por *Helicobacter pylori* consistiu em:

- **Lansoprazol:** 1 mg/kg/dia
- **Amoxicilina:** 50 mg/kg/dia
- **Claritromicina:** 15 mg/kg/dia

O tratamento foi administrado por sete dias, seguido por uma continuação do uso de lansoprazol por um mês .

   1 fonte

 9. İşlek_Bifidobacterium lactis B94 plus inulin for Treatment of Helicobacter pylori infection in children....

19. Cenário: Validar extração da indicação etária do produto (a partir de 4 anos - Monografia)

Prompt Sugerido: "O que os estudos dizem sobre a indicação etária dos pacientes?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Informar "a partir de 4 anos".
- ☐ Citar fonte "Monografia Floracol, 2025".

Resposta do agente:

O Floracol é indicado para crianças e adolescentes a partir de 4 anos de idade. Estudos clínicos, como o de Baştürk et al. (2016), incluíram participantes entre 4 e 16 anos para avaliar a eficácia do simbiótico no tratamento da síndrome do intestino irritável . A monografia do Floracol também confirma essa faixa etária para o uso do produto .

Se precisar de mais informações ou de algum material específico, estou à disposição! 😊

   2 fontes

 6. Baştürk_Efficacy of synbiotic, probiotic, and prebiotic treatments for irritable bowel syndrome in chil...

 Monografia Floracol_Formatada.docx

20. Cenário: Validar extração de guidelines da SBP e ESPGHAN sobre probióticos (Monografia Floracol)

Prompt Sugerido: "Quais as recomendações das sociedades pediátricas sobre esse produto?"

Checklist da Resposta:

- [] Mencionar guidelines da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).
- [] Mencionar guidelines da ESPGHAN.
- [] Apresentar recomendações específicas sobre probióticos contidas na Monografia.

Resposta do agente:

As recomendações das sociedades pediátricas sobre o uso de simbióticos, como o Floracol, são baseadas em evidências de eficácia e segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica (ESPGHAN) reconhecem que algumas cepas de probióticos podem reduzir a duração dos episódios de diarreia aguda em crianças



Se precisar de mais informações ou de algum material específico, estou à disposição! 😊



📄 Monografia Floracol_Formatada.pdf

21. Cenário: Validar extração de dados epidemiológicos brasileiros sobre diarreia infantil (Monografia)

Prompt Sugerido: "Qual a prevalência de diarreia infantil no Brasil?"

Checklist da Resposta:

- [] Apresentar dados epidemiológicos brasileiros.
- [] Citar fonte "Monografia Floracol, 2025".

Resposta do agente:

A prevalência de diarreia infantil no Brasil tem diminuído nas últimas décadas devido a melhorias nas condições de vida, saneamento básico, aumento do aleitamento materno, vacinação contra rotavírus e aprimoramento do tratamento da diarreia aguda. No entanto, a diarreia aguda ainda é um problema frequente nos atendimentos pediátricos 📄 .

Se precisar de mais informações ou de algum material específico, estou à disposição! 😊

📄 👍 🗨 1 fonte

📄 Monografia Floracol_Formatada.docx

22. Cenário: Validar correção educada de dados incorretos sem concordar com erro

Prompt Sugerido: "O estudo mostrou 8 dias de diarreia no grupo B94, certo?" (Afirmação propositalmente errada)

Checklist da Resposta:

- [] Corrigir educadamente sem usar termos confrontativos ("você está errado").
- [] Apresentar dado correto: "cerca de 4 dias" (ou 4,1 dias).
- [] Citar fonte correta.

Resposta do agente:

Na verdade, o estudo mostrou que a duração média da diarreia no grupo tratado com *Bifidobacterium animalis* ssp. *lactis* cepa B94 foi de **4,1±1,3 dias**, significativamente menor do que no grupo tratado com *Saccharomyces boulardii* (6,6±1,7 dias) e no grupo de controle (7,0±1,6 dias) 📄 . Portanto, não foram 8 dias no grupo B94.

Se precisar de mais informações, estou à disposição! 😊

📄 👍 🗨 1 fonte

📄 Monografia Floracol_Formatada.docx

23. Cenário: Validar esclarecimento que Floracol não é indicado para NEC por ser para maiores de 4 anos

Prompt Sugerido: "Posso indicar Floracol para casos de Enterocolite Necrosante?"

Checklist da Resposta:

- ☐ Reconhecer que existem estudos sobre B94 e NEC (contexto científico).
- ☐ Enfatizar "Floracol não é indicado para crianças menores que 4 anos".
- ☐ Explicar "NEC é condição neonatal".
- ☐ Esclarecer "produto comercial Floracol não seria indicado para NEC".

Resposta do agente:

O Floracol, que contém *Bifidobacterium animalis* ssp. *lactis* B94, mostrou efeitos benéficos na prevenção da enterocolite necrosante (NEC) em estudos clínicos. Em um estudo multicêntrico, a incidência de NEC foi significativamente reduzida em neonatos de muito baixo peso ao nascer que receberam B94, comparado aos grupos controle 📄.

No entanto, é importante destacar que o Floracol comercial é indicado para crianças a partir de 4 anos e não é especificamente formulado para uso em neonatos ou para o tratamento de NEC. Portanto, o uso do Floracol para NEC não é recomendado sem uma avaliação clínica cuidadosa e consulta com especialistas.

Se precisar de mais informações ou detalhes sobre os estudos, estou à disposição! 😊

📄 👍 🗨 1 fonte

📄 8. Tremblay_Review and perspectives on bifidobacterium lactis for infants' and children's health..pdf