

# Análisis Probabilístico y Quicksort

Conteo:

$$\begin{aligned} 1.1 \quad \text{Sets} &\longrightarrow \mathbb{Z}^+ \\ S &\longrightarrow |S| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet |\emptyset| &= 0 \\ \bullet |S| &\geq 0 \end{aligned}$$

$$A, B \text{ disjuntos} \longrightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$$

Espacio Muestral:  $\Omega$

$\Omega: \{w \mid w \text{ es un outcome (resultados)}\}$

Evento: (subconjunto de outcomes)

$$E \subseteq \Omega, \quad E \in 2^\Omega$$

Probabilidad:

$$\begin{aligned} P: 2^\Omega &\longrightarrow [0, 1] \\ E &\longrightarrow P(E) \end{aligned}$$

input: un evento

$$\begin{aligned} \bullet P(\emptyset) &= 0 & \bullet P(\Omega) &= 1 \\ \bullet 1 &\leq P(E) \leq 1 \\ \bullet A, B \text{ disjuntos} &\longrightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) \end{aligned}$$

Eventos discretos:


$$P(E) = P\left(\bigcup_{w \in E} \{w\}\right) = \sum_{w \in E} P\{w\}$$

• Si se sabe la probabilidad de cada evento  
Se puede saber la probabilidad de todos los eventos

Experimento: lanzar 3 dados

Prob.	$\Omega$
$1/8$	c c c
$\vdots$	c c s
$\vdots$	c s c
$\vdots$	c s s
$\vdots$	s c c
$\vdots$	s c s
$\vdots$	s s c
$1/8$	s s s

Población de datos numéricos



$$E_1 = \{\#c = 1\} \longrightarrow \{w \mid \#c(w) = 1\} = \{\#c = 1\}$$

$$E_2 = \{\#c = 2\}$$

$$E_3 = \{\#c = 3\}$$

$$E_4 = \{\#c = 4\} = \{\}$$

Random Variable (X)

$$\begin{aligned} X: \Omega &\longrightarrow \mathbb{Z}_0^+ \\ w &\longmapsto X(w) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow X = \# \text{ de caras al lanzar 3 monedas} \\ &= \left\{ \begin{aligned} &\rightarrow \{w \mid X(w) = c\} \\ &\rightarrow (X=c) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

- Es una asignación
- Es una función
- Definir un evento formalmente es crear una variable aleatoria

$$\rightarrow P(X=c)$$

$X \rightarrow$  función

$Y \rightarrow$  función

$X+Y \rightarrow$  función

## Expected Value

$$E[X] : \text{"media"} \text{ de } X(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{c=0}^{\infty} c \cdot P(X=c)$$

input: variable  
aleatoria

Prob.	$\Omega$	#c	Esperanza
$1/8$	c c c	3	$3 \cdot P(\{ccc\})$
$1/8$	c c s	2	$2 \cdot P(\{ccs\})$
$1/8$	c s c	2	
$1/8$	c s s	1	
$1/8$	s c c	2	
$1/8$	s c s	1	
$1/8$	s s c	1	
$1/8$	s s s	0	
			$X(\omega) \cdot P(\{\omega\})$
			$3 \cdot 1/8 + 2 \cdot 1/8 + \dots + 0 \cdot 1/8$

Se puede agrupar mediante el valor

$$0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3) + 4 \cdot P(X=4)$$

Linealidad del valor esperado