

Análisis Probabilístico y Quicksort

Conteo:

$$\begin{aligned} 1.1 \quad \text{Sets} &\longrightarrow \mathbb{Z}^+ \\ S &\longrightarrow |S| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet |\emptyset| &= 0 \\ \bullet |S| &\geq 0 \end{aligned}$$

$$A, B \text{ disjuntos} \longrightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$$

Espacio Muestral: Ω

$\Omega: \{w \mid w \text{ es un outcome (resultados)}\}$

Evento: (subconjunto de outcomes)

$$E \subseteq \Omega, E \in 2^\Omega$$

Probabilidad:

$$P: 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$$

$$E \longrightarrow P(E)$$

input: un evento

$$\bullet P(\emptyset) = 0$$

$$\bullet P(\Omega) = 1$$

$$\bullet 1 \leq P(E) \leq 1$$

$$\bullet A, B \text{ disjuntos} \longrightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Eventos discretos:

$$P(E) = P\left(\bigcup_{w \in E} \{w\}\right) = \sum_{w \in E} P\{w\}$$

• Si se sabe la probabilidad de cada evento
Se puede saber la probabilidad de todos los eventos

Experimento: lanzar 3 dados

Prob. Ω

$1/8$	c c c
$1/8$	c c s
$1/8$	c s c
$1/8$	c s s
$1/8$	s c c
$1/8$	s c s
$1/8$	s s c
$1/8$	s s s

$\#c$
variable aleatoria

populación de datos numéricos

3
2
2
1
2
1
1
0

$$E_1 = \{\#c = 1\} \longrightarrow \{w \mid \#c(w) = 1\} = (\#c = 1)$$

$$E_2 = \{\#c = 2\}$$

$$E_3 = \{\#c = 3\}$$

$$E_4 = \{\#c = 4\} = \{\}$$

Random Variable (X)

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{Z}_0^+$$

$$w \longmapsto X(w)$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow X = \# \text{ de caras al lanzar 3 monedas} \\ &= \left\{ \begin{aligned} &\rightarrow \{w \mid X(w) = c\} \\ &\rightarrow (X = c) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

- Es una asignación
- Es una función
- Definir un evento formalmente es crear una variable aleatoria

$$\rightarrow P(X=c)$$

$X \rightarrow$ función

$Y \rightarrow$ función

$X+Y \rightarrow$ función

Expected Value

$$E[X] : \text{"media"} \text{ de } X(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{c=0}^{\infty} c \cdot P(X=c)$$

input: variable
aleatoria

Prob.	Ω	#c	Esperanza
$1/8$	c c c	3	$3 \cdot P(\{ccc\})$
$:$	c c s	2	$2 \cdot P(\{ccs\})$
$:$	c s c	2	$:$
$:$	c s s	1	$:$
$:$	s c c	2	$:$
$:$	s c s	1	$:$
$:$	s s c	1	$X(\omega) \cdot P(\{\omega\})$
$1/8$	s s s	0	
			$3 \cdot 1/8 + 2 \cdot 1/8 + \dots + 0 \cdot 1/8$

Se puede agrupar mediante el valor

$$0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3) + 4 \cdot P(X=4)$$

Linealidad del valor esperado