

$A = \{\text{Eduardo nació en Lima}\}$
 $B = \{\text{Eduardo estudió estadística}\}$
 $C = \{\text{Eduardo nació en Trujillo}\}$

Independ.

Mut. exclup

$A \text{ y } B$
 Sí

No
 $A \cap B \neq \emptyset$

$A \text{ y } C$


Sí
 $A \cap C = \emptyset$

$B \text{ y } C$
 Sí

No
 $B \cap C \neq \emptyset$

* Independencia:

$$P(A|B) = P(A)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\odot P(A) = 1/3 = 0.33$$

$$P(C) = 0.10$$

$$P(A \cap C) = 0$$

$$\stackrel{?}{=} \underbrace{P(A \cap C)}_0 = \underbrace{P(A)}_{0.33} \underbrace{P(C)}_{0.10}?$$

$$0.033$$

$\Rightarrow A \text{ y } C$ no son independientes

$$\left. \begin{array}{l} P(A) = 0.7 \\ P(B) = 0 \end{array} \right\} 0$$

A y B son mut. excluy. $\Rightarrow P(A \cap B) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} A = \{\text{Aprobar Calculo de probabilidad}\} , P(A) = 0.60 \\ F = \{\text{comer pizza el día de su cumpleaños}\} , P(F) = 0.90 \\ M = \{\text{Al lanzar una moneda, sale cara.}\} , P(M) = 0.50 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{independ.} \\ \text{independ.} \end{array}$$

$$P(A \cap F \cap M) = 0.60 \times 0.90 \times 0.50$$

Ejemplo 8

Se lanzan dos monedas equilibradas de manera independiente. Se definen los eventos:

A : {la primera moneda sale cara}

B : {la segunda moneda sale cara}

Hallar $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

Hallar $P(A^c)$, $P(B^c)$ y $P(A^c \cap B^c)$

Experimento aleatorio: Lanzar dos monedas justas una luego de otra

Espacio muestral: $\Omega = \{(c,c), (c,s), (s,c), (s,s)\}$, $n(\Omega) = 4$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{4} = 0.5 \rightarrow P(A^c) = 0.5$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{2}{4} = 0.5 \rightarrow P(B^c) = 0.5$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{1}{4} = P(A)P(B) \quad A \text{ y } B \text{ son independientes } \checkmark$$

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c) = 0.25$$

Ejemplo 9

En un hospital se estudia la presencia de una enfermedad B y dos pruebas diagnósticas para su detección. Se definen los siguientes eventos:

A_1 : {la prueba 1 resulta positiva}

A_2 : {la prueba 2 resulta positiva}

B : {el paciente tiene la enfermedad}

(¿cuál sería el espacio muestral y su cardinalidad?)

Dado que el paciente sí tiene la enfermedad, los resultados de las dos pruebas son independientes, porque miden el mismo fenómeno biológico de manera separada.

$$P(A_1 \cap A_2 | B) = P(A_1 | B)P(A_2 | B)$$

0.99×0.98 0.99 0.98

$$* P(A_1 \cap A_2^c | B) = P(A_1 | B)P(A_2^c | B)$$

0.99×0.02

Experimento aleatorio: Observar si el paciente tiene o no la enfermedad mediante el uso de dos pruebas diagnósticas.

Espacio muestral: $\Omega = \left\{ (B, A_1, A_2), (B, A_1, A_2^c), (B, A_1^c, A_2), (B, A_1^c, A_2^c), \right. \\ \left. (B^c, A_1, A_2), (B^c, A_1, A_2^c), (B^c, A_1^c, A_2), (B^c, A_1^c, A_2^c) \right\}, \quad n(\Omega) = 8$

Teorema de la Probabilidad total


Sea (Ω, \mathcal{A}, P) un espacio de probabilidad en el cual los eventos A_1, \dots, A_k son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Luego, para cualquier otro evento B :

$$P(B) = \sum_{j=1}^k P(A_j \cap B) = \sum_{j=1}^k P(A_j)P(B|A_j)$$

particiones del Ω

A_1, A_2, \dots, A_k son mutuamente excluyentes: $A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j \quad i, j = 1, \dots, k$

A_1, A_2, \dots, A_k son colectivamente exhaustivos: $\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega$



$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4) + P(B \cap A_5)$$

$$= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A1 = \{1, 2\}$$

$$A2 = \{3, 4\}$$

$$A3 = \{5, 6\}$$


$$B = \{\text{Obtener un número primo}\}$$

Teorema de Bayes

Sea (Ω, \mathcal{A}, P) un espacio de probabilidad en el cual los eventos A_1, \dots, A_k son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Luego, para cualquier otro evento B tal que $P(B) > 0$:


$$P(A_h|B) = \frac{P(A_h \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_h)P(B|A_h)}{\sum_{j=1}^k P(A_j)P(B|A_j)} = P(A_h) \times \frac{P(B|A_h)}{\sum_{j=1}^k P(A_j)P(B|A_j)}$$

↖ Teorema de la multiplicación o probab. compuesta
↘ Probabilidad Total



Conocemos $P(A_1), P(A_2), \dots$: Probabilidades a priori

Buscamos conocer $P(A_1|B), P(A_2|B), \dots$: Probabilidades a posteriori



Ejemplo 10

Una empresa procesa solicitudes a través de tres servidores distintos. Cada solicitud es atendida exactamente por uno de los servidores, de modo que los eventos

A_1 : {la solicitud es procesada por el Servidor 1}

A_2 : {la solicitud es procesada por el Servidor 2}

A_3 : {la solicitud es procesada por el Servidor 3}

son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Las probabilidades de uso de cada servidor son:

$$P(A_1) = 0.20, \quad P(A_2) = 0.50, \quad P(A_3) = 0.30$$

Sea B el evento {la solicitud presenta un error de procesamiento}. Se sabe que:

$$P(B | A_1) = 0.05, \quad P(B | A_2) = 0.02, \quad P(B | A_3) = 0.10$$

- 1 ► Calcule la probabilidad de que una solicitud seleccionada al azar presente un error.
- Calcule la probabilidad de que una solicitud seleccionada al azar presente un error.
- 2 ► Compare la probabilidad a priori con la posteriori.

$$\bullet P(A_1) = 0.20$$


$$\bullet P(A_3) = 0.30$$

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.20 \times 0.05}{0.05} = 0.20$$

$$P(A_3 | B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.1}{0.05} = 0.60$$

$$\bullet P(A_2) = 0.50$$

$$P(A_2 | B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.50 \times 0.02}{0.05} = \frac{0.01}{0.05} = 0.20$$



$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) \\
 &= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3) \\
 &= 0.05 \times 0.20 + 0.02 \times 0.50 + 0.1 \times 0.3 \\
 &= 0.05 = P(\text{solicitud con error})
 \end{aligned}$$

Ejemplo 13

La función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ x, & \text{si } x \in [0, 1] \\ x^2, & \text{si } x \in (1, 4] \\ 5 - x, & \text{si } x \in (4, 5] \\ 0, & \text{si } x \in (5, \infty) \end{cases}$$

puede escribirse como:

$$f(x) = xI_{[0,1]}(x) + x^2I_{(1,4]}(x) + (5-x)I_{(4,5]}(x)$$

o

$$f(x) = x\mathbf{1}_{[0,1]}(x) + x^2\mathbf{1}_{(1,4]}(x) + (5-x)\mathbf{1}_{(4,5]}(x)$$

$$f(2) = \underbrace{2 \mathbf{1}_{[0,1]}(2)}_0 + 2^2 \mathbf{1}_{(1,4]}(2) + (5-2) \mathbf{1}_{(4,5]}(2) = 4 \times 1 = 4$$

