

Gamma

$$\frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{(k/2)-1} e^{-x/2}$$

Si $X \sim \chi^2_{(k)} \Rightarrow X \sim \text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Cauchy


$$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi\nu} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

\rightarrow centrado en 0
 $t_{(1)} \sim \text{Cauchy}$

$$\frac{\cancel{\Gamma(1)}^1}{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{1}{2})} \left(1 + x^2\right)^{-1}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2} I_{(-\infty, \infty)}(x)$$

Laplace



Estimación por máxima verosimilitud \rightarrow (likelihood)

\downarrow
 $\theta?$
 \downarrow
 $\hat{\theta}$

\downarrow
• creíble
posible
factible

4, 6.5, 5.1, 3.9, 5.3, 5.9, 4.8 \rightarrow ¿ $N(\mu=5, \sigma^2=1)$?
 \rightarrow ¿ $N(\mu=6, \sigma^2=1)$?

Prueba de bondad de ajuste

H_0 : Los datos se ajustan a una distribución ..


H_1 : Los datos no se ajustan a una distribución ...

INFERENCIA

- Si un estudiante contesta las 100 preguntas de un examen, las cuales son tipo verdadero o falso, lanzando una moneda balanceada (cara significa cierto y sello falso). Compare, de ser adecuado, la probabilidad de acertar más de 50 pero menos de 60 respuestas usando la distribución exacta y su aproximación a la Normal.

X = Número de aciertos

$$X \sim \text{Bin}(n=100, \pi=0.5)$$



$$P(50 < X < 60) = P(51 \leq X \leq 59) = P(X \leq 59) - P(X \leq 50) = 0.4318 \downarrow$$

```
> pbinom(59, size = 100, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.971556
```

```
> pbinom(50, size = 100, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.5397946
```

```
> pbinom(59, size = 100, prob = 0.5) - pbinom(50, size = 100, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.4317614
```

$$\bullet E(X) = 100 \times 0.5 = 50$$

$$n\pi = 100 \times 0.5 = 50 > 5 \quad \text{y} \quad n(1-\pi) = 50 > 5 \quad \Rightarrow \quad \text{Se puede usar la Aprox. Normal}$$

$$\bullet V(X) = 100 \times 0.5 \times 0.5 = 25$$

$$X \sim N(\mu = 50, \sigma^2 = 25) \Rightarrow P(51 \leq X \leq 59) = P(X \leq 59.5) - P(X \leq 50.5) = 0.4315 \downarrow$$

\downarrow \downarrow
 50.5 59.5

```
> pnorm(59.5, mean = 50, sd = 5) - pnorm(50.5, mean = 50, sd = 5)
```

```
[1] 0.4314556
```

2. En una caja hay 6 bolillas azules, 2 blancas y 7 rojas. Se seleccionan al azar 5 bolillas. Halle la función de probabilidad, la media y la variancia del número de bolillas azules en la muestra si la selección se hace sin reemplazo.

X = Número de bolillas azules en la muestra

$$X \sim \text{Hyper}(N=15, A=6, n=5)$$

$$f(x) = \frac{\binom{6}{x} \binom{9}{5-x}}{\binom{15}{5}} I_{\{0,1,2,3,4,5\}}(x)$$

$$\max(0, \underbrace{n+A-N}_{=4}) \dots \underbrace{\min(n, A)}_5$$

$$\mu_X = E(X) = n \frac{A}{N} = 5 \times \frac{6}{15} = 2$$

$$\sigma_X^2 = V(X) = n \frac{A}{N} \left(1 - \frac{A}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right) = 5 \times \frac{6}{15} \times \frac{9}{15} \times \frac{10}{14} = \dots$$

3. Los trabajadores de una fábrica tienen accidentes a razón de 2.7 accidentes por semana. Si la ocurrencia de accidentes sigue un proceso Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurran accidentes en dos semanas?

X = Número de accidentes cada 2 semanas

$$X \sim \text{Pois}(\lambda = 5.4)$$

$$P(X=0) = \frac{e^{-5.4} 5.4^0}{0!} = e^{-5.4}$$

```
> exp(-5.4)
[1] 0.004516581
> dpois(0, lambda = 5.4)
[1] 0.004516581
```