

Síntesis conceptual

Asignatura: Gestión de muestras biológicas
Unidad: 8. Exudados y muestras especiales

Resumen

En esta unidad aprenderemos cómo tomar y manejar muestras biológicas de exudados.

Comenzaremos la unidad dedicando un punto a los principales tipos de exudados que podemos encontrarnos en el ámbito sanitario. Este punto estará dividido en varias secciones dependiendo del lugar del cuerpo en el que se obtienen, indicando cómo se obtienen, se transportan y se conservan para no perder sus propiedades.

En el segundo punto trataremos específicamente las muestras procedentes de infecciones causadas por hongos, que son frecuentes y presentan ciertas particularidades.

Para concluir la unidad, dedicaremos un punto a tres tipos de muestras especiales, que son las de líquido amniótico, las de médula ósea y las tomadas por citología exfoliativa del aparato digestivo.

Conceptos fundamentales

- **Exudados:** Elementos extravasados en el proceso inflamatorio, que se depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo.
- **Muestras genitourinarias:** Muestras que proceden de los genitales, que son frecuentes cuando se producen infecciones de cierta magnitud.
- **Exudados óticos:** Exudados producidos en el oído medio o externo.
- **Micosis (infecciones fúngicas o infecciones micóticas):** Infecciones causadas por hongos en el cuerpo humano. Son especialmente frecuentes en la superficie del cuerpo.
- **Amniocentesis:** Toma de líquido amniótico por punción a través del vientre y las paredes del útero.
- **Biopsia ósea:** Punción del hueso con una aguja especial, a través de la cual se aspira una parte de la médula ósea para su estudio.
- **Cepillado con visión directa:** Toma de muestras por raspado mediante un cepillo especial asistido por la observación por endoscopia.

Procesos fundamentales

Toma de muestras de uñas y tejido periungueal:

1. Decidir si la muestra se tomará de la base de la uña, el surco periungueal o el borde (diferentes patógenos pueden aparecer en diferentes zonas).
2. Utilizando un bisturí, levantar la uña o apartar los tejidos que puedan dificultar el acceso a la zona que deseamos muestrear. Si es necesario, se cortarán fragmentos de uña o de epidermis mediante tijeras.
3. Tomar fragmentos de uña afectada mediante cortes con tijeras.
4. Colocar los fragmentos tomados en placas de Petri o frascos estériles.

Toma de muestras de cabello:

1. Identificar los pelos infectados (suele aparecer rotos o contorneados).
2. Arrancar los pelos identificados de raíz (incluyendo el folículo piloso), siempre utilizando guantes para evitar contagios.
3. Colocar los pelos arrancados en una placa de Petri estéril.

Toma de muestra de escamas dérmicas por raspado:

1. Utilizar una lanceta o un bisturí para raspar la periferia de la región infectada.
2. Recoger las escamas en una placa de Petri con el medio de cultivo adecuado.
3. Dejar incubar la placa el tiempo necesario en condiciones óptimas.

Toma de muestra de escamas dérmicas por adhesión:

1. Localizar la zona de la infección.
2. Adherir un tira de celofán transparente con una cara adhesiva a la zona afectada.
3. Despegar la tira de celofán
4. Pegar la tira en un soporte físico (normalmente portaobjetos) para su observación.