용법용량

(경구)

성인 : 디클로페낙나트륨으로서 초회량은 1일 100-150mg이며 완화한 경우나 장기 투여의 경우에는 1일 75-100mg을 2-3회 분할 경구투여한다.

어린이 : 1일 체중 kg당 0.5-3mg을 2-3회 분할 경구투여한다.
연령, 질환, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사)

성인 : 디클로페낙나트륨으로서 1일 1회 75mg(1앰플)을 둔부의 상부 한쪽편에 깊숙히 근육주사한다. 중증의 경우에는 1회 75mg(1앰플)씩 1일 2회 투여할 수 있으며 이 때에는 둔부 양쪽에 번갈아 한번씩 주사한다. 치료초기 이후에는 정제 또는 좌제로 바꾸어 투여해야 한다

연령, 질환, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(서방성 제제)

성인 : 디클로페낙나트륨으로서 1일 1회 100mg을 경구투여한다. 증상이 야간이나 아침에 심한 경우에는 저녁에 복용하는 것이 바람직하다. 이 약은 나누어 복용하거나 씹어서 복용하지 않는다.

이 약의 심혈관계 이상반응을 최소화하기위해 최단기간동안 최소유효용량을 사용하여야 한다.