용법용량

(정제)

○ 보통 성인 시프로플록사신으로서 1회 250 ~ 500 mg, 1일 2회 식간에 경구 투여한다. 중증 복합감염인 경우에는 이 약으로서 1회 750 mg, 1일 2회로 증량할 수 있다.

급성감염인 경우에는 보통 5 ~ 10일간 치료하며, 증세가 사라진 후에도 최소한 3일간 더 투여한다.

○ 신장애 환자

1) 크레아티닌 청소율 〉 50 mL/min : 상용량으로 투여

2) 30 ~ 50 mL/mn : 1회 250 ~ 500 mg, 1일 2회 투여

3) 5 ~ 29 mL/min : 18시간마다 250 ~ 500 mg 투여

4) 혈액투석 중이거나 복막투석중인 환자 : 1회 250 ~ 500 mg, 1일 1회 투석 후 투여

5) 혈청크레아티닌만 알고 있을 경우에는 다음 계산식으로 크레아티닌 청소율을 구할 수 있다.

남자 : {체중(kg) × (140-나이)}/ {72 × 혈청크레아티닌(mg/dL)}

여자 : 0.85 × 남자에 대해 구해진 값

6) 중증 감염인 경우에는 중증신장애가 있더라도 1회 용량을 750 mg까지 증량할 수 있으나, 투여 후 환자의 상태를 주의 깊게 관찰해야 한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.