# 사용상의주의사항

1. 다음 경우에는 투여하지 말 것

1) 이 약 또는 염산치아민에 과민증의 가왕력이 있는 환자

2) 본제제는 벤질알코올을 함유하고 있으므로 신생아, 미숙아에는 투여하지 말 것

2. 부작용

1) 쇽: 드물게 쇽 증상이 나타날 수 있으므로 혈압강화, 흉내고민, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우에 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 할 것

2) 과민증: 발진, 가려움 등의 과민반응이 나타나는 경우 투여를 중지할 것

3) 소화기: 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 기타: 드물게 열감, 오한, 발열, 항문주위 등의 가려움증, 따끔거림이 나타날 수 있다. 이러한 증상의 방지를 위해서 전해질의 용량을 늘려 주사속도를 서서히 한다.(점적주사가 좋다.)

3. 상호작용

레보도파의 작용을 감약시킬 수 있다.

4. 임상검사치의 영향

뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

5. 적용상의 주의

정맥주사 시에 혈관통을 일으킬 수 있으므로 주사속도를 될 수 있는 대로 서서히 할 것

## 2002. 6. 25 (의안65615-7522)

## 변경지시 대상품목 : 앰플주사제 전품목

## 변경지시내용

◎ 허가(신고)사항중 “사용상의 주의사항” 경고항에 다음사항을 추가.

“앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 흔입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 흔입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것“