# 용법용량

이 약의 용량은 환자의 연령, 체중 및 신장 기능과 감염의 중등도에 따라 고려한다.

잠재적인 위장관의 불내성을 최소화하기 위해 식사 초기에 투여한다.

아목시실린/클라불란산의 흡수는 식사초기에 투여할 때 최적화된다.

○ 성인 및 12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아 : 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250 mg /125 mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여하며 중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500 mg/125 mg으로 증량할 수 있다.

○ 신장애가 있는 경우 크레아티닌 청소율에 따라 적절히 증감한다.

- 성인 :투여량 조절은 아목시실린의 최대 권장 투여량을 기반으로 한다.

크레아티닌 청소율(creatinine clearance; CrCl)이 30 mL/분 이상인 환자의 경우 투여량 조절은 필요하지 않다.

| 크레아티닌 청소율 | 용법.용량 |
|---|---|
| 10 ~ 30 mL /min | 12시간마다 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg<br>또는 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500mg/125mg 투여한다. |
| 10 mL/min 이하 | 24시간마다 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg<br>또는 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500mg/125mg 투여한다. |
| 혈액투석 | 24시간마다 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 250mg/125mg 또는 아목시실린/클라불란산칼륨으로서 1회 500mg/125mg을 24시간 마다 투여하고, 투석 중 추가로 투여하며 투석 종료시점에 반복투여 한다. (아목시실린과 클라불란산 혈청농도가 모두 감소하기 때문) |

- 소아 : 같은 방법으로 감량한다.