용법용량

○ 성인 : 세파졸린으로서 1일 1g(역가)을 2회 분할 정맥 또는 근육주사한다.

○ 소아 : 1일 체중 Kg당 20～40mg(역가)을 2회 분할 정맥 또는 근육주사한다.

○ 증상 및 감염균의 감수성에서 효과가 불충분하다고 판단되는 경우에는 1일 성인은 1.5～3g(역가), 소아는 체중 Kg당 50mg(역가)을 3회 분할 주사한다. 증상이 특히 중증의 경우에는 1일 성인은 5g(역가), 소아는 체중 Kg당 100mg(역가)까지 투여할 수 있다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

〈주사액의 조제〉

정맥주사 시는 주사용수, 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액에 녹여 주사한다. 점적 정맥주사 시 녹일 때 주사용수는 사용하지 않는다(등장액이 아님.).

근육주사 시 0.5% 리도카인주사액 2～3mL에 녹여 주사한다. 또한 온도에 의한 용해도 차에 의하여 가끔 백탁하는 경우가 있으나 이 경우는 온탕으로 따뜻하게 하여 투명한 용액으로 만든 후 사용한다.

용해 후 신속히 사용하고 보존할 필요가 있는 경우에는 차광하여 실온에서 48시간이내에 사용한다.

〈성인 및 소아 신장애 환자 권장 용량〉

크레아티닌 청소율 55mL/min 미만인 성인 환자

크레아티닌 청소율	권장 용량
35~54mL/min	일일 용량을 8시간마다 나누어 투여
11~34mL/min	일일 용량의 절반을 12시간마다 나누어 투여
10mL/min 이하	일일 용량의 절반을 18~24시간마다 나누어 투여

크레아티닌 청소율 70mL/min 미만인 소아 환자

크레아티닌 청소율	권장 용량
40~70mL/min	일일 용량의 60%를 12시간마다 나누어 투여
20~40mL/min	일일 용량의 25%를 12시간마다 나누어 투여
5~20mL/min	일일 용량의 10%를 24시간마다 나누어 투여