용법용량

1. 정맥주사

성인 : 세포티암으로서 1일 0.5~2g(역가)을 2~4회 분할 정맥주사 한다.

소아 : 1일 체중 kg당 40~80mg(역가)을 3~4회 분할 정맥주사 한다.

성인의 패혈증에는 1일 4g(역가)까지, 어린이의 패혈증, 수막염 등의 중증 및 난치성 감 염증에는 1일 체중 kg당 160mg(역가)까지 증량할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

〈주사액의 조제법〉

정맥주사 시는 주사용수, 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액에 녹여 사용한다.

점적 정맥주사 시는 1회량 0.25~2g(역가)을 당액, 전해질액 또는 아미노산 제제 등의 보액에 녹여 30분~2시간에 걸쳐 점적 정맥주사하고, 어린이의 경우에는 위의 투여량 을 고려하여 30분~1시간에 걸쳐 투여하되 녹일 때 주사용수는 사용하지 않는다.(등장 액이 아님)

2. 근육주사

성인 : 염산세포티암으로서 1일 0.5~2g(역가)을 2~4회 분할 근육주사 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

주사액은 1바이알 당 0.5% 염산리도카인 주사액 3mL에 녹여 사용한다.