용법용량

(경구 : 정제, 캅셀제)

성인 : 염산암브록솔로서 1회 30mg 1일 3회 경구투여한다. 계속 치료시 1회 30mg

1일 2회 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(경구 : 시럽제)

o 성인 : 염산암브록솔로서 치료초기에 1회 30mg(10ml) 1일 3회 경구투여하고 계속 치료시 1회 15mg (5ml) 1일 3회 투여한다.

o 소아

5세 이상 : 1회 15mg(5ml) 1일 2-3회 투여한다.

2-4세 : 1회 7.5mg(2.5ml) 1일 3회 투여한다.

2세 미만 : 1회 7.5mg(2.5ml) 1일 2회 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(경구 : 서방형 캅셀제)

성인 : 염산암브록솔로서 1일 1회 75mg을 아침 또는 저녁 식후에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사제)

o 성인 : 염산암브록솔로서 1회 15mg 1일 2-3회 피하, 근육 또는 천천히 정맥주사한다. 심한 경우 1회 30mg까지 증량할 수 있으며 포도당주사액, 링겔주사액 또는 생리식염주사액과 함께 점적 정맥주사할 수 있다.

o 소아 : 1일 체중 Kg당 1.2-1.6mg을 정맥 또는 근육주사한다.

<연령에 따른 투여량>

5세 이상 : 1회 15mg 1일 2-3회

2-4세 : 1회 7.5mg 1일 3회

2세 미만 : 1회 7.5mg 1일 2회

조산아 및 신생아의 호흡곤란치료는 1일 체중 Kg당 10mg을 4회로 분할하여 천천히 정맥주사한다. 단독투여시 체중 kg당 20mg까지 증량할 수 있다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.