

2026년 오조리탐조대회

2026’ Ojori Bird-watching Competition

미니도감


새



저어새 *Platalea minor* Black-faced Spoonbill


73.5cm / 멸종위기1급, 천연기념물, 보호대상해양생물, IUCN Red-List 위기(EN)종

한반도 서해안이 주된 번식지이며 중국, 러시아 등지에서도 소수 개체가 번식한다. 겨울에는 대만, 홍콩, 일본 등지에서 월동하는데, 제주도 성산포에서 매년 40여 개체가 겨울을 난다. 넓적한 부리를 얕은 습지에 집어 넣고 휘휘 저어서 먹이를 잡는다고 해서 저어새라는 이름이 붙었다. 전 세계 생존 개체가 6,600여 마리에 불과한 국제적 멸종위기종이다. 세계적으로 서식하는 6종의 저어새 중에서 우리나라에서는 저어새와 노랑부리저어새가 관찰된다. 학명 minor는 '작다'는 뜻으로 6종의 저어새 중에서 가장 작은 종이다.
영명처럼 얼굴이 검은 색이라 북한에서는 '검은낯저어새'라고 부르기도 한다.



국가, 정부 기관 및 NGO의 연합체로 세계 최대의 환경 단체인 세계자연보전연맹은 세계의 자원과 자연을 관리하고 멸종위기의 동식물을 보호하기 위해 각 생물종의 보전상태를 기록한 목록(적색목록 Red List)를 발표하고 있다.

노랑부리저어새 *Platalea leucorodia* Eurasian Spoonbill




86cm / 멸종위기2급, 천연기념물, IUCN Red-List 관심대상(LC)종

유라시아대륙, 인도, 아프리카 북부에서 번식하고, 중국 동남부, 한국, 일본, 아프리카 북부 등지에서 월동한다. 저어새가 우리나라에서 번식하는 여름철새라면, 노랑부리저어새는 우리나라에서 겨울을 나는 겨울철새이다.

부리 끝이 노란색이라 노랑부리저어새라는 이름이 붙여졌지만, 저어새도 부리 끝이 닳아 노랗게 보이는 경우가 있어 저어새와 구별하는 동정키로 미흡하다. 노랑부리저어새는 멱 아래에 노란색 피부가 드러나 있고, 무엇보다 눈 주위가 검은 저어새와 달리 눈 주위가 흰색 깃털로 덮여 있다. 먼 거리에서 관찰할 때 저어새는 눈이 잘 보이지 않지만, 노랑부리저어새는 콩알 같은 눈알이 뚜렷하게 보인다. 노랑부리저어새도 번식기가 되면 댕기깃과 목 주위의 노란 반점이 생기지만, 우리나라에서는 관찰하기 어렵다.





얼굴이 검은 저어새는 붉은색 눈이 잘 보이지 않지만(왼쪽), 노랑부리저어새는 또렷하게 보인다.




물수리

Pandion haliaetus
Western Osprey

암컷 64cm, 수컷 54cm / 멸종위기2급, IUCN Red-List 관심대상(LC)종

봄, 가을에 해안가나 하구, 하천 습지를 통과하는 나그네새이며, 제주도와 남해안 일대에서 월동하는 겨울철새이다. 남부지방이나 제주도 등지에서는 번식하는 개체가 생기고 있다.
수면 위를 천천히 날다가 물고기를 발견하면 정지비행 후 재빠르게 물속으로 돌입해 먹이를 잡아챈다.
수리류들은 종마다 특정한 무늬가 있는데, 물수리는 배와 다리가 흰색이다. 이는 물고기를 사냥할 때, (물고기 입장에서 하늘을 볼 때 하늘색과 비슷한) 밝은색 배면이 사냥감에 접근하기 쉽게 진화한 것으로 보인다.

일본에는 물수리와 관련한 재미있는 이야기가 전해진다. 물수리는 바닷물이 드나드는 바위틈에 물고기를 감춰두는데, 바닷물에 자연상태로 절여져 발효된 것을 '물수리초밥'이라고 해 사람들이 훔쳐 먹었다고 한다. 물론 실제 물수리의 생태와는 거리가 멀지만, 일본사람들은 이것이 초밥의 기원이라 믿고 있으며 물수리초밥이라는 이름의 초밥집이 있을 정도이다.





매 *Falco peregrinus* Peregrine Falcon

암컷 49cm, 수컷 40cm /
멸종위기1급, 천연기념물, IUCN Red-List 관심대상(LC)종

남극을 제외하고 전 세계에 분포한다. 일반의 오해와 달리 숲이 아니라 해안이나 섬의 절벽 등지에서 번식하는 드문 텃새이다. 가끔 제주도의 아파트 베란다에서 번식하는 경우가 있다. 3월 하순부터 5월 사이에 번식하며, 한배에 3~4개의 알을 낳아 28~29일 만에 부화한다. 천연기념물이자 멸종위기야생동물 2급으로 지정된 법정 보호종으로 제주도 여러 곳의 바위 절벽에서 번식한다.
장애물이 없이 탁 트인 곳에서 사냥하며 매우 빠른 속도로 급강하해서 작은 새를 공중에서 낚아챈다. 지금까지 관측된 최고 낙하속도는 시속 389km이다.





꿩 *Phasianus colchicus* Common Pheasant

암컷 56~60cm, 수컷 85~95cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

국내에 흔한 텃새로, 육지에서 멀리 떨어진 도서를 제외하고 우리나라 전역에 서식한다. 제주도와 울릉도에서는 수렵을 목적으로 방사되었다.
숲 가장자리의 덤불숲을 선호하는데, 빠른 날갯짓으로 날아올랐다가 미끄러지듯이 내려앉는다.
암수 모두 꼬리가 길지만, 수컷이 훨씬 화려하다. 4~6월에 야산의 덤불숲, 숲속의 땅 위에 8~12개의 알을 낳아 23~25일간 품는다. 수컷의 발목 뒤에는 날카로운 며느리발톱이 있어 번식기에 수컷끼리 경쟁할 때 사용한다.
예로부터 수컷은 장끼, 암컷은 까투리, 새끼는 꺼병이라 불렀다.




2022년 비양봉에서 태어난 꺼병이

민물가마우지

Phalacrocorax carbo
Great Cormorant

89~102cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

전 세계에 32종의 가마우지류가 분포한다. 우리나라에는 가마우지, 민물가마우지, 쇠가마우지 3종이 관찰되는데 그중 민물가마우지가 가장 흔하고 크다. 물속에서 오랫동안 잠수하여 먹이를 찾으며, 잠수한 후에는 바위 위에 올라와 날개를 펼쳐 말리는 행동을 한다. 주로 해안이나 하구 주변에서 생활하지만, 내륙에서는 하천이나 호수 등에서도 서식한다. 과거에는 제주도 등지에서만 관찰되던 새였지만, 기후변화의 영향으로 텃새화하여 전국에 분포하며 급격하게 증가하고 있다.



가마우지와 쇠가마우지는 육지에서 멀리 떨어진 도서지방에서 주로 관찰된다. 제주도에서는 가마우지보다 드물게 관찰된다.

가마우지 류들은 잠수 후에 젖은 날개를 말리기 위해 날개를 펴는 행동을 자주 한다.



가마우지


Phalacrocorax capillatus
Temminck's Cormorant

80~92cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

러시아 극동, 사할린에서 일본 규슈, 한국, 중국 황해 지역에 국지적으로 번식한다. 우리나라에서는 거제도 인근 무인도, 거문도, 백령도, 소청도. 제주도 등 서남해안의 무인도의 바위 절벽에서 번식하는 드문 텃새이다. 민물가마우지와 달리 내륙의 호수나 민물에 서식하지 않고 바닷가 암벽에서 서식한다. 민물가마우지의 몸이 어두운 갈색인데 비해 가마우지는 녹색 광택을 띤다. 부리 기부에 노란색 피부가 드러나는데, 민 물가마우지가 완만하고 둥근 형태인데 비해 가마우지는 뾰족하게 각진 형태이다.



펭귄이나 가마우지와 같은 잠수성 조류들은 물 속에서 추진력을 얻기 위해 발이 배 뒷부분에 위치해 있는 경우가 많다. 그렇기 때문에 서 있을 때는 대체로 직립 형태로 우뚝 서 있는 자세를 취한다.




쇠가마우지 *Phalacrocorax pelagicus* Pelagic Cormorant

72~80cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

한국, 일본, 캄차카, 사할린, 북아메리카의 태평양 연안까지 넓게 분포한다. 우리나라에서는 소청도, 백령도 등 극히 일부 지역에서 집단번식하고 겨울철에는 해안가 암벽에서 드물게 관찰된다.
우리나라에서 관찰되는 가마우지 중에서 가장 작은 종이다. 몸 전체가 녹색 광택이 도는 검은 색인데, 번식기에는 허리 양쪽에 흰색 반점이 생긴다. 부리는 다른 가마우지와 달리 무척 가늘고, 번식기에는 얼굴과 부리 주위에 붉은색 피부가 드러나고, 정수리와 뒷머리 깃털이 돌출된다. 비번식기에는 붉은색 피부가 거의 보이지 않을 정도로 줄어들고, 돌출된 깃털도 사라진다.


번식깃



비번식깃



때까치 *Lanius bucephalus* bull-headed shrike

18.5~21cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

머리는 엷은 적갈색이고, 몸 윗면은 회색, 눈선은 검은색인데 첫째 날갯깃 기부에 흰색 반점이 있다. 몸 옆구리는 연한 갈색이지만, 겨울에는 물결무늬(비늘무늬)가 선명해진다. 흔히 번식하는 텃새이며, 일부는 봄 가을에 이동하는 나그네새다. 개방된 곳을 선호하며 나무 꼭대기나 전깃줄 등에 앉아 꼬리를 빙글빙글 돌리거나 위아래로 흔들며 시끄럽게 울어댄다. 메뚜기, 잠자리, 도마뱀, 개구리 등을 먹는데, 종종 나뭇가지나 철조망에 꽂아놓고 먹기도 한다.



때까치가 나뭇가지에 꽂아놓은 개구리





대백로 *Ardea alba alba* Western Great Egret

중대백로 *Ardea alba modesta* Great Egret

대백로 94~104cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종
중대백로 83~89cm

우리나라에는 7종의 백로류가 관찰된다. 크기 순으로는 대백로-중대백로-중백로-노랑부리백로-흑로-쇠백로-황로 순이다.
대백로는 왜가리보다 더 큰 새로 대표적인 겨울철새이다. 구각이 눈 뒷부분까지 찢이지고, 번식기에 검은색이던 부리가 비번식기에 노랗게 변하는 점 등 중대백로와 비슷한 점이 많다. 반면 크기 차이가 나고, 특히 다리 윗부분(경부)의 색깔이 차이가 있다. 번식기에는 핑크색(중대백로), 연한 노란색, 분홍색(대백로)이던 경부의 색깔이 비번식기에는 중대백로(검은색)와 대백로(연한 노란색)가 달라진다.
대백로와 중대백로의 구각이 눈 뒷부분까지 확장되는데 비해, 중백로의 구각은 눈까지만 이어진다.




쇠백로 *Egretta garzetta* Little Egret


노랑부리백로 *Egretta eulophotes* Chinese Egret


쇠백로 72~80cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종
노랑부리백로 68cm / 멸종위기1급, 천연기념물, 보호대상해양생물, IUCN Red-List 취약(VU)종

쇠백로는 중대백로의 절반 크기로 번식기에는 머리에 두 가닥의 긴 장식깃이 생기고 부리는 검은색이다. 노랑부리백로는 쇠백로보다 크고 중백로보다 작다. 번식기에는 여러 가닥의 댕기깃이 발달하며 부리도 노란색으로 변한다. 쇠백로와 달리 논에는 잘 들어가지 않으며 주로 갯벌에서 먹이활동을 한다.
두 종 모두 발가락이 노란색인데, 노랑부리백로는 발가락만 노란데 비해, 쇠백로는 노란색이 발목 위까지 확장되는 경우가 많다.
노랑부리백로는 중국, 홍콩, 한국 등지에서 번식하던 드물지 않은 새였으나, 개발과 오염으로 눈에 띄게 줄어 지금은 전 세계 생존개체가 2,600~3,400마리로 추산된다.









쇠백로 vs 노랑부리백로







왜가리 *Ardea cinerea* gray heron

94~97cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

전체적으로 회색이고 뒷머리에 검은색 댕기가 있으며, 목 앞부분에 검은색 세로 줄무늬가 있다. 중대백로보다 약간 크고, 대백로보다 작다.
한국에는 흔한 여름철새이며, 번식이 끝난 일부 무리는 중남부 지역에서 겨울을 나는 텃새이기도 하다. 전국의 습지 주변에서 흔히 볼 수 있다.
소나무, 참나무 등의 가지에 다른 백로류와 함께 집단 번식하며, 매년 같은 장소를 이용한다. 3~4개의 알을 낳아 25~28일간 품어, 50~55일 동안 암수가 함께 먹여 기른다. 번식지에 천적이 들어오면 일제히 날아올라 경계하며, 가가이 접근하면 반쯤 소화된 먹이를 게워내어 악취를 풍기는 퇴치법을 사용한다.



해오라기

Nycticorax nycticorax
Black-crowned Night Heron

50~56cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

목은 짧고 굵은데, 머리에서 등까지 검은 녹색이다. 날개는 폭 넓은 회색이며 뒷 목에 2~3개의 흰색 깃이 길게 늘어져 있다. 몸 아랫면은 흰색이고 홍채는 붉은색이다. 야행성으로 주로 아침 저녁에 활동하지만, 낮에 먹이활동을 하는 경우도 있다. 다른 백로류와 섞여 집단 번식한다.



흰날개해오라기



검은댕기해오라기



흑로

Egretta sacra
Pacific Reef Egret

62.5cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

동아시아, 동남아시아, 오스트레일리아, 미크로네시아, 일본, 한국 등지에서 서식한다.
우리나라에서는 제주도와 드물게 남부 연안의 무인도에서 서식하는 텃새이다.
검은 백로라 할 수 있는데, 온대지역에 서식하는 흑색형과 열대, 아열대에 서식하는 백색형 등 2아종이 있다. 주로 검은색 바위지대에 서식하는 흑색형은 보호색 때문에 검은색으로 진화한 것으로 추정된다.
사람의 접근이 어려운 무인도의 암초나 해안가 절벽 위에 둥지를 튼다.



쇠백로와 흑로. 둘 다 발가락이 노란색이다.



청다리도요

Numenius madagascariensis
Far-eastern curlew

35cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

유라시아 북부에서 번식하고, 아프리카, 인도, 동남아시아, 호주 등지에서 월동한다. 봄 가을에 흔하게 통과하는 나그네새이자 적은 수가 월동한다. 우리나라에서는 봄철에 4월 중순~5월 하순에 관찰되고, 가을철에는 8월 중순~10월 하순까지 관찰된다.
물 고인 논, 하천, 갯벌 등에서 생활하는데, 곤충류, 갑각류 등을 잡아 먹는다. 부리는 쇠청다리도요보다 길고 굵으며 약간 위로 들려 있다. 멸종위기동물 1급인 쇠청다리도요는 부리 기부가 굵고 경부(다리 윗 부분)가 짧다.



도요류 부리 끝에는 압력을 감지하는 기관인 헤름스트 소체(Herbst's corpuscles)가 분포하여 부리에서 2cm 정도 떨어진 지점의 먹잇감의 움직임을 감지한다.



민물도요 *Calidris alpina* Dunlin

17~21cm / IUCN Red-List 준위협(NT)종

우리나라에서 흔한 나그네새이며 일부는 월동한다. 남쪽 지방에서는 겨울에도 어렵지 않게 찾을 수 있다. 북상 시기인 4~5월, 남하 시기인 9~10월에 다수가 무리를 이루어 지나간다. 갯벌이나 염전에 큰 무리를 이루어 활동하며 빠른 걸음으로 조개, 갑각류, 갯지렁이 등을 잡아 먹는다. 번식기에는 몸 윗면이 적갈색과 흑갈색 반점이 흩어져 있고 배 아래에 검은색 반점이 나타난다. 비번식기에는 전체적으로 회갈색이며 배의 검은색 반점도 사라진다. 비행할 때 날개 윗면에 흰색 줄무늬가 선명하다.





비번식깃



깝작도요 *Actitis hypoleucos* common sandpiper

20cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

유라시아대륙 북부와 중부에서 번식하고, 아프리카, 중동, 인도, 동남아시아에서 월동한다. 국내에서는 흔하게 통과하는 나그네새이며, 일부가 번식하고 월동한다.
해안가 습지, 하구, 개울 등에 서식한다. 하천의 자갈밭 또는 강가의 풀숲 사이에 둥지를 튼다. 4개의 알을 낳아 20~23일간 포란한다.
꽁지를 위 아래로 흔들며 깝작댄다고 붙여진 이름이다. 몸 윗면은 녹갈색이며 깃 가장자리에 흑갈색 무늬가 있다. 겨울이 되면 몸 윗면은 균일한 색으로 바뀌며, 가슴옆은 갈색이고 여름깃에 보이는 흑갈색 줄무늬가 거의 없다. 배와 가슴의 흰색이 어깨까지 이어진다.







비번식깃

좀도요 *Calidris ruficollis* red-necked stint

15cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

생물이름에 '좀' '쇠' 자가 붙으면 작다는 뜻이다. 체형이 작고 통통한 느낌이 난다.
4월중순~5월하순, 8월초순~10월하순에 우리나라에서 관찰된다. 갯벌, 해안 모래톱, 하구에서 민물도요 등과 함께 무리지어 활동한다.
비슷한 크기의 흰꼬리좀도요는 주로 민물습지에 서식하고 다리가 녹색이다. 몸집이 조금 더 작은 작은도요는 부리가 약간 가늘고 길다.



흰꼬리좀도요



작은도요



멧도요 *Scolopax rusticola* Eurasian Woodcock

32~36cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

다리는 짧고 부리는 곧고 긴데 윗부리 옆면에 길게 홈이 패여 있다. 뒷발가락이 발달해 있으나 발톱은 작다. 눈은 크며 보통 새보다 머리 위쪽에 있다. 몸집이 육중한 편이고 날개는 둥글다. 깃털은 얼룩지고 가로무늬가 있는 갈색이다. 몸의 윗면은 검정색·갈색·회색 등의 작고 복잡한 무늬로 덮여 있으며, 아랫면은 연한 갈색 바탕에 어두운 갈색 물결무늬가 있다. 턱밑은 흰색이다.
한국에서는 봄·가을에 지나가는 나그네새이자 중부 이남과 제주도에서 겨울을 나는 드물지 않은 겨울새이다. 숲이나 물가에서 사람이 접근하면 꿩처럼 푸드덕 하는 날갯짓 소리를 내면서 숲속으로 날아간다. 빛이 잘 들지 않는 숲에서 지렁이 따위를 찾아먹는데 부리를 땅속 깊이 넣고 윗부리 끝을 앞뒤로 움직여서 지렁이를 찾아낸다.



흰물떼새 *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover

17.5cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

이마 위에 검은 무늬가 있고 머리는 적갈색이다. 가슴 옆에 검은 줄무늬가 앞가슴까지 연결되지 않고 끊어져 있다. 꼬마물떼새나 흰목물떼새는 줄무늬가 앞가슴까지 연결되어 있다. 겨울깃은 이마의 검은무늬가 사라지고, 가슴의 검은 줄무늬도 갈색으로 변한다. 흔한 나그네새이며 일부 지역에서는 번식하고 소수가 월동한다.







개꿩 *Pluvialis squatarola* Grey Plover

29.5cm / IUCN Red-List 취약(VU)종

수컷의 여름깃 윗면은 흰색과 검정색으로 얼룩지고 목 옆과 목 뒤는 흰색을 띤다. 꼬리는 흰색이며 꼬리깃에 검은색 가로띠가 있다. 얼굴과 아랫면은 검고 부리와 다리는 짙은 잿빛이다. 겨울깃은 아랫면이 희고 윗면은 잿빛이 도는 갈색을 띤다.
검은가슴물떼새는 윗면에 황갈색과 검은무늬가 섞여 있다.

개꿩(번식깃)



검은가슴물떼새(번식깃)



개꿩은 겨드랑이가 검은색이다.
검은가슴물떼새는 연한 회갈색이다.





검은머리물떼새 *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher

45cm / 멸종위기2급, 천연기념물, IUCN Red-List 준위협(NT)종

몸 윗면을 비롯하여 이마와 목, 가슴까지 검정색이고, 부리와 다리는 붉은색이다. 아랫면은 흰색이다. 길고 두툼한 주황색 부리를 이용하여 조개나 굴 따위의 껍질 속으로 집어넣어 속살을 파먹는다. 산란기는 4월 중순~5월이며 한배에 2~3개를 낳아 21~24일 동안 품는다. 서남해안에 드물게 관찰되었으나, 1971년 인천 강화도 인근 무인도에서 번식이 확인된 후 지금은 서해안 여러 무인도에서 번식하고 있다, 서천 유부도 갯벌에서 2,000~5,000여 마리가 월동한다.



유부도 갯벌의 검은머리물떼새



큰부리까마귀 *Corvus macrorhynchos* Large-billed Crow

56.5cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

전국적으로 흔하게 서식하는 텃새로 몸 전체가 광택이 있는 검은색이다. 윗부리가 매우 크고 윗부분이 볼록하다. 단독 또는 작은 무리를 이뤄 높은 산, 숲 가장자리, 사찰 주변, 농경지 등 다양한 환경에서 서식한다. 잡식성으로 낟알, 과실, 동물의 사체, 곤충류, 조류의 알과 새끼 등을 잡아 먹는다.
머리깃을 세울 경우 이마와 부리의 경사가 거의 직각이 되기도 한다.


큰부리까마귀



까마귀. 이마의 경사가 완만하다.



떼까마귀 *Corvus frugilegus* Rook

44~47cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

암수 같은 빛깔이며 암컷이 조금 작다. 겨울깃은 보랏빛 광택이 많이 나는 검은색인 데 비해 여름깃은 광택이 약하다. 콧구멍과 부리 주위에는 깃털이 없고 잿빛 또는 흰색 피부가 드러나며 전체적으로 부리가 밝게 보인다. 꽁지는 끝이 살짝 패인 둥근 모양이다. 까마귀와 구별하기 곤란하나 부리가 더 가늘고 뾰족하다. 보통 갈까마귀떼에 섞여 살지만 따로 몇 쌍 또는 작은 무리를 이루어 살기도 한다. 겨울에는 온대지방으로 내려가 겨울을 난다.
한국에서는 봄과 가을에 작은 무리에서 수백 마리에 이르는 큰 무리를 볼 수 있는데, 주로 남부와 섬 지방에서 겨울을 나는 흔한 겨울새이다.



물총새

Alcedo atthis
Common Kingfisher

16.5~18cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

흔한 여름철새로, 제주도를 비롯한 몇몇 지역에서 적은 수가 번식한다. 저수지나 하천의 일정한 장소에서 단독으로 생활한다. 몸에 비해 부리가 크고 길며 다리가 짧다.
물 위의 말뚝이나 나뭇가지 위에 앉아 있다가 물고기를 발견하면 재빠르게 뛰어들어가 잡는다. 잡은 먹이를 바위 등에 부딪혀 기절시킨 후 먹는다. 하천가 절개지 등 흙으로 된 벼랑에 긴 구멍을 파고 둥지를 만드는데, 번식 초기에 수컷이 춤을 추면서 암컷에게 물고기를 잡아서 주는 구애행동을 한다.



물총새가 먹이를 물고 둥지에 들어가고 있다.



섬휘파람새

Horornis diphone
Japanese bush warbler

13~16.5cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

서남해안 도서지방과 이에 인접한 내륙, 지리산, 소백산 등 고지대 산능성이의 관목림에서 서식하는 여름철새이며 제주도를 비롯한 남해안에 서식하는 일부 개체는 텃새이다.
항상 지면 가까지 기듯이 이동하며 민감하고 겁이 많아 개방된 곳에 나오는 경우가 많지 않아 관찰하기가 어렵다. 제주휘파람새라고도 하는데, 정확한 국명은 섬휘파람새이다.
맑은 울음소리가 휘파람 소리를 닮았다고 붙여진 이름인데, 시간을 알리는 시보로도 많이 사용되어 왔다.

QR코드를 찍으면 섬휘파람새의 소리를 다운받을 수 있습니다.



딱새

Phoenicurus auroreus
Daurian Redstart

14~15.5cm

바이칼호부터 러시아 극동까지, 중국, 한국, 사할린 등지에서 번식하고, 인도차이나, 중국남부, 대만, 일본 등지에서 월동이다. 우리나라에서는 흔한 텃새이자 나그네새이다.
꼬리를 위아래로 끊임없이 흔드며 딱~딱~ 하는 소리를 내기도 한다. 수컷은 아랫면이 짙은 주황색이고 얼굴은 검은색인데 비해 암컷은 전체적으로 황갈색을 띤다. 암수 모두 날개에 흰색 반점이 있다.
주로 단독생활을 하며, 민가 주변이나 공원 등에서 서식한다. 보통 연 2회 번식하며 한번에 5~7개의 알을 낳아 12~13일 동안 품고 약 13일 동안 먹여 키운다.



딱새 암컷



동박새 *Zosterops japonicus* Warbling White-eye

12~13cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

우리나라 서남해안 도서지방, 해안지대에서 흔히 번식하는 텃새로, 최근 경기도에서도 번식이 확인되었다. 동백나무와 같은 상록수가 풍부한 산림에 무리 지어 서식한다.
작은 곤충류와 머루, 다래, 버찌와 같은 나무 열매를 먹는데, 겨울에는 동백꽃의 꿀을 빨아 먹는다. 몸 윗면은 녹황색이며 선명한 흰색 눈테가 있어 귀여운 모습이다. 비슷한 종으로 한국동박새가 있는데, 한국동박새는 동박새보다 약간 작고 옆구리에 뚜렷한 밤색 무늬가 있다.



한국동박새. 동박새보다 약간 작고 울음소리가 동박새와 다르다.



바다직박구리

Monticola solitarius
Blue Rock Thrush

23cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

유라시아대륙 전역에 서식하고 겨울에는 아프리카, 인도, 동남아 등에서 월동한다. 국내에서는 바다와 인접한 곳에 흔하게 서식하는 여름철새이자, 드물게 월동하는 겨울철새이다. 갯강구나 곤충류를 주로 먹고, 5~6월에 5~6개의 알을 낳아 12~15일간 품는다.
전국 어디서나 흔하게 관찰되는 직박구리(직박구리과)와 이름이 비슷하지만, 솔딱새과인 바다직박구리와는 전혀 다른 종이다. 암컷은 전체적으로 회갈색을 띠지만, 수컷은 파란색과 적갈색을 띠고 있어 쉽게 구별된다.



수컷은 암컷보다 훨씬 화려하다. 겨울깃은 깃 끝에 검은색과 흰색 반점이 흩어져 있다.



직박구리

Hypsipetes amaurotis
Brown-eared Bulbul

27~30cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

몸 전체가 잿빛을 띤 어두운 갈색이고 귀 근처의 밤색 얼룩무늬가 두드러진다. 가슴과 배는 회색이며 흰 반점이 흩어져 있다. 무리를 지어 시끄럽게 지저귀는데, 울음소리가 음악적이고 특히 우리나라에서는 겨울에 울음소리를 들을 수 있는 몇 안 되는 새이다. 1980년대까지는 대부분 남부지방에서 번식했고, 적은 수가 경기 일대 산림에서 번식했지만, 지금은 서울을 비롯해 전국의 도시에서도 흔하게 번식한다. 일부는 번식 후 큰 무리를 이루어 남쪽으로 이동한다.



검은이마직박구리 *Pycnonotus sinensis* Light-vented Bulbul

19cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

머리꼭대기와 턱선은 검은색이다. 눈뒤부터 뒷목 윗부분까지 흰색의 큰 무늬가 있다. 귀깃은 짙은 색이며 뒷부분에 흰색 둥근 무늬가 있다. 멱은 흰색이고 윗면은 회갈색이다. 어깨 사이는 어두운 올리브색을 띤다. 날개와 꼬리는 어두운 회갈색이며, 밝은 올리브색을 띤다. 암수 색깔이 같으며 다른 종과 혼동하기 어렵다.
2002년 어청도에서 처음 관찰된 이후 매년 개체수가 증가하고 있다. 전국적으로 적은 수가 통과하는 나그네새 또는 겨울철새이며, 일부 지역에서는 번식하는 여름철새이기도 하다.



방울새

Carduelis sinica
Grey-capped Greenfinch

13.5~14.5cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

머리에서 뒷목까지 회색, 얼굴과 멱에 녹황색 기운이 있다. 몸 윗면은 갈색, 첫째날개깃 기부와 둘째날개깃 기부가 노란색이고 몸 아래는 황갈색이다. 암컷은 전체적으로 색이 엷고 머리에 갈색 기운이 강하다. 뾰로로롱~ 하는 울음소기가 방울소리 같다고 붙여진 이름이다.



QR코드를 찍으면
방울새의 소리를
다운받을 수 있습니다.



박새

Parus major
great tit

13.5~15cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

머리와 목은 푸른빛이 도는 검정색이고 뺨은 흰색이다. 아랫면은 흰색을 띠며 목에서 배 가운데까지 넥타이 모양의 굵은 검정색 세로띠가 있어 다른 박새류와 쉽게 구분된다. 수컷은 이 선이 더 굵고 다리 위까지 이어진다. 암컷은 가슴의 검은 선의 폭이 좁고 짧다.



쇠박새는 머리가 검고 멱에 짧고 좁은 검은 반점이 있다.



진박새는 멱이 폭 넓은 검은색이며 뒷머리에 돌출된 깃이 있다.



노랑배진박새는 몸 아랫면이 노란색이다.



참새 *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow

14~14.5cm / IUCN Red-List 취약(VU)종

머리와 뒷목은 다갈색이고 눈밑과 귀깃 뒤쪽, 턱밑, 멱은 검정색이다. 뺨은 흰색이고 검은색 반점이 있다. 등과 어깨깃은 다갈색이며 각 깃털에 검정색 얼룩이 있다. 암수 같은 색이다.





머리가 회색인 집참새는 우리나라에서 관찰기록이 몇 차례밖에 없다. 뺨에 검은색 반점이 없는 섬참새는 울릉도에서 번식하는 여름철새로 주로 경북 지역 해안에서 관찰된다.



노랑턱멧새 *Emberiza elegans* yellow-throated bunting

14.5~16cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

정수리가 검은색이고 뒷머리는 노란색이다. 눈앞과 귀깃은 검은색, 멱은 노란색이다. 가슴에 크고 검은 역삼각형 반점이 있다. 암컷은 수컷의 검은 부분이 대체로 갈색이며 가슴의 반점도 희미하다. 머리깃을 높이 세우는 경우가 많다.



노랑턱멧새 암컷



흰배지빠귀 *Turdus pallidus* pale thrush

23.5~25cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

수컷은 머리와 멱이 회색이고 등은 올리브색을 띤 갈색, 배 쪽은 얼룩진 흰색이다. 암컷의 등은 전체적으로 균일한 연한 갈색이고 멱은 대개 흰색이다. 노란색 눈테가 뚜렷하다. 날 때에는 암수 모두 2개의 바깥 꽁지깃 끝에 흰색 얼룩점이 눈에 띄며 날개를 빠르게 퍼덕여서 직선으로 날아간다.



종에 따라 직선으로 나는 새, 물결무늬처럼 날아가는 새 등 새들의 비행방식이 모두 다르다.
출처: 국립생물자원관



찌르레기 *Spodiopsar cineraceus* White-cheeked Starling

24cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

전체적으로 회갈색이고, 머리에서 가슴까지 검은색인데 얼굴 주변에 흰색 깃이 흩어져 있다. 아랫면은 회색이고 배는 흰색, 부리는 오렌지색, 다리는 흐린 오렌지색이다. 부리 끝은 검고 허리는 흰색이다. 전국에 번식하는 흔한 여름철새이나 중부 이남에서는 일부가 겨울을 나기도 한다.





찌르레기 무리에 붉은부리찌르레기(왼쪽)나 흰점찌르레기(오른쪽) 등이 작은 무리를 이루어 함께 통과하는 경우가 있다. 붉은부리찌르레기는 일부가 제주도에서 번식한다.



멧비둘기 *Streptopelia orientalis* Oriental Turtle Dove

31~34cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종


머리와 목은 잿빛이고 붉은빛을 띤다. 양쪽 목옆은 청회색 및 검은 줄무늬가 있다. 등과 어깨깃은 검은색인데 깃 가장자리는 폭넓은 적갈색이다.
국내에서 매우 흔한 텃새이며 적지 않은 수가 봄 가을 이동하는 나그네새다. 매우 이른 시기부터 번식을 시작하며 흰색 알을 2개 낳아 16일간 품는다. 매우 엉성한 둥지를 만들어 연 2회 이상 번식하는데, 번식기에 날개를 들어올리고 활공하는 모습이 맹금류의 비행 모습과 비슷하다.



집비둘기 *Columba livia ver. Domestica* Rock Dove

29~35cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종


야생종이던 비제비둘기(Columba livia)를 개량하여 보급한 종으로 전 세계에 약 280종이 있다. 1988년 서울올림픽 이후 대량으로 방사하면서 개체수가 급격하게 늘었다. 회색 바탕의 날개에 2줄의 검은색 줄무늬가 있다. 멸종위기종인 양비둘기(낭비둘기)와 매우 흡사하다.



양비둘기(낭비둘기). 생존 개체수 200마리 미만인 토종 비둘기. 집비둘기와 매우 흡사한데 허리와 꼬리 중간이 흰색이다.



녹색비둘기



흑비둘기



제비 *Hirundo rustica* Barn Swallow

15.5~18cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

몸의 윗면은 푸른빛이 도는 검정색이고 이마와 멱은 어두운 붉은 갈색, 나머지 아랫면은 크림색을 띤 흰색이다. 어린 새는 긴 꼬리깃이 다 자란 새보다 짧으며 전체적으로 색이 희미하다.
한국에서는 흔한 여름새이지만 최근 도심에서는 거의 볼 수 없다. 둥지 재료를 얻거나 일광욕을 하기 위한 때가 아니면 거의 땅에 내리지 않는다. 우리나라에서는 제비, 귀제비 등 2종이 번식을 한다. 귀제비는 호리병 모양의 독특한 둥지를 만든다.


귀제비





알락할미새 *Motacilla alba* white wagtail

20cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

유라시아대륙 전역과 아프리카대륙의 폭 넓은 지역에 분포한다. 앉아 있을 때 꼬리를 위아래로 흔드는 습성이 있다. 세계적으로 11아종으로 나누는데, 국내에서 백할미새, 검은턱할미새, 시베리아알락할미새 등 6아종이 기록돼 있다.
흔하게 번식하는 여름철새이며, 남부 지역에서는 매우 적은 수가 월동한다. 백할미새는 흔한 겨울철새이거나 나그네새이고, 검은턱할미새는 드문 나그네새이거나 극소수가 월동한다.



알락할미새



백할미새



검은턱할미새



노랑할미새

Motacilla cinerea
gray wagtail

20cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

전국에 걸쳐 흔하게 번식하는 여름철새이며 흔히 통과하는 나그네새다. 적은 수가 남부, 제주도 등지에서 월동한다. 머리와 몸 윗면은 회색이고, 눈썹선과 턱선은 흰색이며 멱은 검은색이다. 몸 아랫면은 노란색이며 옆구리는 흰색이다. 암컷은 수컷과 비슷하지만, 멱이 흰색이고 노란색이 약하다.




암컷



괭이갈매기 *Larus crassirostris* Black-tailed Gull

47~52.5cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

날개길이 34~39cm의 중형 갈매기이다. 머리와 가슴·배는 흰색이고 날개와 등은 잿빛이다. 꽁지깃 끝에 검은 띠가 있어서 다른 갈매기류와 구별된다. 부리는 다른 종에 비해 긴 편이고 끝 부분에 빨간색과 검은색 띠가 있다. 다리는 노란색이고 겨울깃은 뒷머리와 뒷목에 갈색줄무늬가 있다.
어린 새는 전체적으로 어두운 흑갈색이고 부리의 2/3는 살구색이며 끝 부분이 검은색이다. 울음소리가 고양이 소리를 닮았다고 괭이갈매기라고 부르며 매우 흔한 텃새이다.








재갈매기 *Larus vegae* Vega Gull

55~67cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

몸빛깔은 갈매기와 비슷하나 더 크고 아랫부리에 붉은색 반점이 있다. 여름깃의 머리·목·가슴·배·옆구리·허리·꼬리털깃은 흰색이고 다리는 분홍색이다. 겨울깃은 머리에서 가슴까지 작은 갈색 반점이 많이 있는데 개체 간 차이가 크다. 첫째날갯깃이 검고 등과 날개 윗면의 색깔은 옅은 회색이어서 차이가 명확하다.







큰재갈매기 *Larus schistisagus* Slaty-backed Gull

58~61cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

큰재갈매기라 이름 붙였지만, 크기는 재갈매기와 비슷하다. 부리는 재갈매기보다 약간 더 크다. 첫째날갯깃 끝이 검은색인데 날개윗면과 등의 색깔이 진한 회색이어서 재갈매기처럼 색깔 차이가 심하게 나지 않는다. 한국에서는 흔한 겨울철새이다.



앞〉 큰재갈매기
뒤〉 재갈매기





검은머리갈매기 *Larus saundersi* Saunder's Gull

32~34cm / 멸종위기2급, IUCN Red-List 취약(VU)종

중국 동북부와 우리나라 서해안 일부 지역에서 번식하고, 낙동강하구, 순천만, 중국, 대만, 일본 등지에서 월동하는 국제적 보호조이다. 1998년, 시화호 매립지에서 첫 번식이 확인되었으나 사람의 간섭으로 쫓겨 났으며, 이후 영종도와 송도 인근 개활지에서 번식하고 있다. 영종도와 송도의 개활지들이 계속되는 개발로 매년 쫓겨나고 있고, 번식공간도 급격하게 줄어들고 있어 이에 대한 대책이 필요하다. 번식기간 중에 강화남단 갯벌에서 많은 무리를 관찰할 수 있다. 부리가 짧고 검은색이며 첫째날갯깃에 흰 반점이 있어, 부리가 길고 붉은색이며 첫째날갯깃에 흰 반점이 없는 붉은부리갈매기와 구별된다.




번식이 끝나면 머리의 검은색이 하얗게 변하고 귀깃에 검은 반점만 남게 된다.



붉은부리갈매기 *Chroicocephalus ridibundus* Black-headed gull

39~49cm / IUCN Red-List 취약(VU)종


검은머리갈매기와 비슷한 모습이지만, 크기가 더 크다. 번식기 때 검은머리갈매기는 얼굴의 검은 부분이 목 까지 내려오지만, 붉은부리리갈매기는 뒷목이 하얗다. 붉은부리갈매기는 부리가 길고 붉다.








검은머리갈매기







붉은부리갈매기



논병아리 *Tachybaputus ruficollis* little grebe

25~27cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

논병아리과 가운데 가장 작다. 부리는 검은색이고 부리의 기부와 끝이 황백색이다. 번식기에는 뺨과 앞목이 적갈색이고 머리는 흑갈색이다가 겨울이 되면 뺨에서 앞목까지 황갈색으로 변한다. 과거에는 겨울철새이다가 1990년대 후반부터 전국의 습지에서 번식이 확인되었다.

식생이 풍부한 저수지, 하천 등지에서 생활하는데, 놀라면 잠수를 하거나 수면 위를 빠르게 차고 나가며 달아난다.



번식깃



뿔논병아리 *Podiceps cristatus great crested grebe*


56cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

한국에서 관찰되는 논병아리류 중에서 가장 크다. 부리는 분홍색이고 눈앞은 검은색이며 눈 주위는 폭 넓은 흰색이다. 번식기에는 뺨이 적갈색이고 머리 위로 검은색 깃이 길게 돌출된다. 겨울깃은 전체적으로 희게 보이고 머리의 검은색 깃이 뚜렷하게 짧아진다.

1996년 첫 번식이 확인된 후 전국 각지에서 번식이 확인되고 있으며, 갈대, 줄 등이 무성한 곳에 물에 뜨는 구조의 둥지를 만든다.







흰뺨검둥오리 *Anas zonorhyncha* Eastern Spot-billed Duck

52~62cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

전체가 암갈색이며 암수 색이 비슷하다. 얼굴은 누런 색을 띠는 흰색이며, 긴 검은색 눈선 아래로 흐린 검은 줄무늬가 있다. 부리는 검은색이며 끝은 노란색이다. 우리나라에서 관찰되는 오리류는 대부분 겨울철새지만, 원앙과 함께 번식하는 텃새이다. 암수 구별이 어렵다. 수컷의 부리 끝 노란색이 더 넓고 꼬리덮깃의 검은색이 더 강하다.







청둥오리 *Anas platyrhynchos* Mallard


52~60cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

수컷은 머리와 목이 광택있는 짙은 녹색이고 흰색의 가는 목테가 있다. 윗가슴은 짙은 갈색이다. 꽁지깃은 흰색이지만 가운데꽁지깃은 검정색이며 위로 말려 올라갔다. 부리는 노란색이다. 암컷은 갈색으로 얼룩지며, 부리는 오렌지색 바탕에 불규칙한 검은 무늬가 있다.



오리는 봄에 짝을 선택하는 다른 새들과 달리 가을과 초겨울에 짝을 선택한다. 이 시기 수컷들의 깃털이 화려한 이유이다. 봄, 여름 사이 번식이 끝나면 수컷은 화려한 깃털을 버리고 암컷과 비슷한 칙칙한 깃털로 바꾼다. 이것을 eclipse plumage라고 한다.





넓적부리 *Spatula clypeata* Northern Shoveler


45~50cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

넓적하고 긴 검은 부리가 특징적이다. 암컷의 부리는 오렌지색에 검은 반점이 있다. 수컷은 머리에 어두운 녹색 광택이 있고, 배에 적갈색 무늬가 있다.
작은 무리를 이루어 행동하는데, 수면에서 뱅글뱅글 원을 그리며 돌면서 파장을 일으킨 후 물 위에 떠오른 수초, 수서곤충, 플랑크톤 등을 넓적한 부리를 좌우로 흔들며 잡아 먹는다. 영명 'shoveler'는 이러한 습성에 기인한다.

수컷



암컷






댕기흰죽지 *Aythya fuligula* tufted duck

40cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

암수 모두 뒷머리에 댕기모양의 깃이 있으나 수컷이 더 길다. 수컷의 몸 빛깔은 머리와 목·등은 금속 광택이 나는 검정색이고 옆구리와 배는 흰색다. 암컷은 전체적으로 어두운 갈색이며 옆구리와 배는 엷은 갈색이다.
암수 모두 부리가 청회색이며, 부리 끝은 검은 색이다. 날 때 검은색 날개에 흰색 줄무늬가 있다.










검은머리흰죽지 *Aythya marila* Greater Scaup

45cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

댕기흰죽지와 비슷하지만, 몸집이 더 크고 뒷머리에 댕기깃이 없다. 국내에 다수 흔한 겨울철새이다. 해안 근처의 호수, 하구 등에서 무리를 지어 생활하며 잠수해 먹이를 찾는다.



검은머리흰죽지




댕기흰죽지



흰죽지 *Aythya ferina* Common Pochard

45cm / IUCN Red-List 취약(VU)종

수컷 겨울깃의 머리와 목은 적갈색이고 가슴과 꼬리덮깃은 검은색이며, 검은색 부리의 중앙에 청회색의 넓은 띠가 있다. 홍채는 붉은색이다. 암컷은 전체적으로 회갈색이고 홍채는 갈색이며 눈테는 흰색인데 눈 뒤쪽으로 흐린 흰색 줄무늬가 있다. 비슷하게 생긴 큰흰죽지가 흰죽지 무리에 섞여 드물게 관찰되기도 한다.







고방오리 *Anas acuta* Northern Pintail

56~75cm / IUCN Red-List 미평가(NE)종

목은 가늘고 길며, 꼬리는 길고 뾰족하다. 수컷의 머리는 갈색이며, 목옆에 흰색 선이 뒷머리 쪽으로 있으며, 앞목은 흰색이다. 검은 중앙꼬리깃이 바늘처럼 길고 뾰족하게 위로 치솟았다. 부리는 회색인데 중앙부분 기부부터 끝까지 검은색 줄무늬가 있고 가장자리가 검은색이다. 암컷은 꼬리깃이 수컷보다 짧고 부리는 검은색이다. 암컷이 수컷보다 작다.
우리나라에서 흔한 철새이며 종종 큰 무리를 이루어 해안에서 자맥질해 수초 및 식물의 씨앗을 먹는다.





홍머리오리 *Mareca penelope* Eurasian wigeon

46~50cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

수컷의 머리는 적갈색이고, 이마와 머리꼭대기는 크림색이다. 청회색 부리는 짧으며 끝부분이 검은색이다. 암컷은 전체적으로 어두운 갈색이고 머리와 목에 흑갈색 줄무늬가 많이 흩어져 있으며, 눈 주변과 눈 뒷부분, 뒷머리 부분이 약간 어둡게 보인다. 홍머리오리를 비롯한 다른 오리 무리에 섞여 월동하는 아메리카홍머리오리도 매우 드물게 관찰된다.



홍머리오리



아메리카홍머리오리




청머리오리

Mareca falcata
falcated teal


14.5~16cm / IUCN Red-List 준위협(NT)종

하구, 내륙의 강, 호수 등지에서 작은 무리를 지어 겨울을 나는 흔한 겨울철새이다. 머리에 광택이 나는 독특한 적갈색 무늬가 있고, 셋째날개깃이 길게 늘어진 낫 모양(falcate)을 하고 있다. 중국 등지에서 식량 및 깃털을 구하기 위해 무분별한 사냥이 자행되었는데, 이로 인해 개체수가 급감하여 세계자연보전연맹(IUN) 적색 색목록에 '준위협(NT)'종으로 등재되어 있다.





청머리오리 암컷



비오리

Mergus merganser
Common Merganser

65cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

수컷은 등의 중앙부만 검고 나머지 몸통은 흰색이다. 머리는 광택이 나는 짙은 녹색이며 부리는 붉은색으로 가늘고 길다. 바다비오리나 호사비오리와 달리 댕기깃이 없다. 암컷은 등은 회색, 아랫면은 흰색이고 머리는 갈색에 댕기가 있다. 비행할 때 날개 윗면에 흰색 무늬가 돋보인다.





쇠오리 *Anas crecca* Eurasian Teal

35.5~37.5cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

우리나라를 찾는 오리류 중에서 가장 작은 종이다. 머리는 밤색이며 얼굴 앞에서 눈 뒤로 넓은 녹색 줄무늬가 있다. 아래꼬리덮깃 양쪽이 노란색이며 부리는 검은색이다. 암컷은 전체적으로 어두운 갈색에 검은색 반점이 있고, 눈 뒤로 검은색 눈선이 있다.



쇠오리 암컷



아메리카쇠오리(뒤)와 쇠오리(앞),
아메리카쇠오리는 가슴 옆에 흰색의 세로 줄무늬가 있다.



물닭 *Fulica atra* Eurasian Coot

39cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종

암수 색깔이 같다. 온몸이 검정색이며 통통한 체형이고 눈은 붉은색이며, 흰색 이마, 옅은 살구빛 부리를 가지고 있다. 과거에는 흔하게 통과하는 나그네새, 겨울철새였으나 지금은 전국 각지의 습지에서 번식한다. 겨울에는 강, 호수 등에서 큰 무리를 이루어 월동하는데, 잘 날지 않는다. 놀라면 수면 위를 발로 튀기며 달리다가 날아 오른다.



일반적인 경우와 달리 물닭의 새끼는 매우 화려하다. 어미의 눈에 띄어서 먹이를 많이 받아 먹으려는 새끼들의 전략이다.



어린 새



쇠물닭 *Gallinula chloropus* Common Moorhen

30.5~33cm / IUCN Red-List 관심대상(LC)종


이마에 붉은색 액판이 있고, 아래꼬리덮깃의 양쪽 끝에 흰색 반점이 있다. 물닭에 비해 발가락에 판족이 없고, 발가락이 길다. 겨울깃은 이마의 액판이 줄어들고 아랫배에 흰깃이 섞인다. 흔한 여름철새이며 중, 남부 지역에서 적은 수가 월동한다.



물닭



쇠물닭



큰기러기

Anser fabalis
Bean Goose

84.5~90cm / 멸종위기2급, IUCN Red-List 관심대상(LC)종

암수가 거의 동일하고 머리와 날개, 옆구리는 짙은 갈색이며 날개와 옆구리 깃털은 외각이 흰 줄무늬의 비늘모양이다. 목과 가슴은 밝은 갈색이며 배는 흰색이다. 부리는 검은색이며 윗부리 끝부분은 검고 그 뒤로 주황색 띠가 있다. 다리는 주황색이다.
10월에 도래하여 이듬해 3월까지 관찰되며 주로 넓은 농경지에서 먹이 활동을 하고 낙곡이나 식물의 새순, 뿌리 등을 먹는다. 강화도 전역에서 볼 수 있으며 특히 넓은 논이나 저수지 등에서 쉽게 볼 수 있다. 들에 있을 때 나이 든 기러기들이 주변에서 경계를 서는 것을 볼 수 있다.





야외에서 쇠기러기와 섞여 있기도 하여 구별하기 쉽지 않으나 부리 전제가 분홍색이며 흰색의 이마, 배 부분에 불규칙적인 검은색의 굵은 줄무늬를 가진 쇠기러기와 비교하면 어렵지 않게 구별할 수 있다.



2026년 오조리탐조대회

2026’ Ojori Bird-watching Competition