

Introducing R

Coopsie

2020-05-29

Plan for today

1. example
2. content
3. another example

An Equation

$$y = mx + b$$

$$\alpha + \beta$$

Some code

```
summary(lm(Sepal.Length ~ Species, data = iris))

##
## Call:
## lm(formula = Sepal.Length ~ Species, data = iris)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.6880 -0.3285 -0.0060  0.3120  1.3120
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      5.0060     0.0728  68.762 < 2e-16 ***
## Speciesversicolor  0.9300     0.1030   9.033 8.77e-16 ***
## Speciesvirginica   1.5820     0.1030  15.366 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.5148 on 147 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6187,    Adjusted R-squared:  0.6135
## F-statistic: 119.3 on 2 and 147 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Viewing a data.frame

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa