

# NCT03171688 - clinical protocol (PT-BR)

Gabriel Guimarães

## Abstract

A single prospective cohort of women submitted to cesarean section who received spinal anesthesia will be assessed for the proposed risk factors and the incidence of nausea or vomiting will be observed during the first 48 hours.

**Citation:** Gabriel Guimarães NCT03171688 - clinical protocol (PT-BR). **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.q9mdz46

**Published:** 25 Jun 2018

## Protocol

### Avaliar pacientes elegíveis

#### Step 1.

Verificar critérios de inclusão em pacientes aguardando cesariana.

Critérios de inclusão:

- Cesariana indicada
- Anestesia planejada é anestesia subaracnoide

Ambos os critérios são necessários, caso contrário paciente não é incluída porém adiciona uma unidade na contagem de pacientes não incluídas (e no motivo da não inclusão).

### Consentimento informado

#### Step 2.

Um protocolo de consentimento informado é aplicado e duas vias de um termo de consentimento livre e esclarecido (ver anexo) é assinado tanto pelo pesquisador principal quanto pela voluntária. Uma cópia é retida pelo pesquisador principal e outra fica com a paciente.

### Questionário pré-anestesia

#### Step 3.

Perguntamos às voluntárias sobre:

- NVPO prévio (Sim ou não)
- Cirurgia prévia (Sim ou não)
- História de tabagismo
- Cinetose (Sim ou não)
- Náuseas no primeiro trimestre (Sim ou não)
- Náusea no terceiro trimestre (Sim ou não)
- Idade em anos;
- Idade gestacional;

Dados são gravados em formulário eletrônico de captura de dados online com tecnologia de controle de versão.

## Questionário após anestesia

### Step 4.

É aplicado ao término da cirurgia.

- Anestesia foi apenas subaracnoide (Sim ou não)
  - Se não, a paciente é excluída.
- Dose de bupivacaína pesada
- Dose de sufentanil subaracnoide
- Dose de fentanil subaracnoide
- Dose de morfina subaracnoide
- Pressão arterial média basal
- Menor pressão arterial média antes do nascimento
- Náusea intraoperatória
- Vasopressor intraoperatório
- Dose de ondansetron intraoperatório
- Dose de dexametasona intraoperatória

Dados são gravados em formulário eletrônico de captura de dados online com tecnologia de controle de versão.

## Questionário após recuperação da anestesia

### Step 5.

Aplicado após duas horas de recuperação da anestesia, sobre NVPO durante as primeiras duas horas após a cesariana:

- Intensidade das náuseas (0-10)
- Número de episódios de vômitos (número inteiro)

Dados são gravados em formulário eletrônico de captura de dados online com tecnologia de controle de versão.

## Questionário final (24h)

### Step 6.

Paciente é arguida sobre NVPO entre 2 e 24 horas após a cesariana:

- Intensidade das náuseas (0-10)
- Número de episódios de vômitos (número inteiro)

Dados são gravados em formulário eletrônico de captura de dados online com tecnologia de controle de versão.