Equilibrio radiativo y albedo de la superficie de la tierra

Acerca de esta actividad

Esta actividad demostrará la influencia de la reflectividad de la superficie de la tierra (medida por el albedo) influencia la temperatura de esta. Aprenderás además los conceptos de temperatura de equilibrio y equilibrio radiativo.



Imagen de una parte de la superficie de la tierra, tomada desde la estación espacial internacional. Aquí se puede apreciar la gran variedad de materiales y colores presentes en la superficie, los cuales reflejan en diferentes cantidades la luz que les llega del sol.

Credito: NASA

Lo que necesitarás

Fuente de luz

2 bloques de aluminio

2 termómetros

Cronómetro

Carboncillo

Qué hacer

- **1.** Pon carboncillo sobre uno de los bloques de modo que quede negro.
- **2.** Inserta un termómetro en cada bloque, uno representará la tierra sin hielo o nieve, el otro una tierra congelada.
- **3.** Sitúa los dos bloques bajo la fuente de luz de modo que sean irradiados con la misma intensidad.



4. Mide la temperatura de los dos bloques cada 30 segundos, anota los resultados en la tabla y grafícalos.


Tiempo en s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Temperatura negro en °C											
Temperatura blanco en °C											



<u>Sugerencia</u>: lee las Secciones 2.2 y 3.2 del Manual del Cambio Climático antes de leer esta explicación.

En esta actividad se observa que el aluminio que no fue oscurecido con carbón se calienta más que el aluminio oscurecido. Esto se debe a que las superficies claras tienen un albedo alto: la luz que incide sobre estas superficies es reflejada en su mayoría y solo una pequeña fracción de luz es absorbida, calentándose muy poco el aluminio. El aluminio que fue oscurecido, por el contrario, tiene un albedo bajo y absorbe una mayor cantidad de la luz que incide sobre el, por lo que se calienta mucho más.

Sobre la superficie de la tierra sucede lo mismo: en la imagen de abajo la luz del Sol es absorbida por los océanos oscuros (con albedo bajo) y reflejada por los glaciares (con albedo alto).



Crédito: NASA

Otro hecho interesante es que la temperatura de ambos bloques de aluminio deja de aumentar. Cuando la luz incide sobre estos, la energía que absorben los calienta (aumenta su temperatura) y al calentarse, los bloques irradian energía térmica. Entre más calientes, más energía irradian. En algún punto llegan a un equilibrio radiativo: la energía absorbida es igual a la irradiada. La temperatura a la que esto sucede se conoce como temperatura de equilibrio.









Calentamiento de diferentes capas atmosféricas

Acerca de esta actividad

La atmósfera juega un papel fundamental en el clima de la tierra. En esta actividad verás que la radiación directa la calienta solo ligeramente, en contraste a la radiación térmica emitida por el suelo.



Lo que necesitarás

Fuente de luz

Vaso

Cartulina negra

2 termómetros

2 ganchos

Cronómetro

Qué hacer

- **1.** Recorta un círculo de cartulina negra y sitúalo en el fondo del vaso.
- **2.** Usa los ganchos para atar un termómetro justo arriba el fondo del vaso y el otro a mitad de altura.



- **3.** Sitúa el vaso debajo de la fuente de luz tan verticalmente como sea posible.
- **4.** Mide la temperatura en cada termómetro cada 30 segundos y anótalas en una tabla como la siguiente.

Tiempo en s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Temperatura negro en °C											
Temperatura blanco en °C											



(Sin equipo de laboratorio)

Calentamiento de diferentes capas atmosféricas

Acerca de esta actividad

La atmósfera juega un papel fundamental en el clima de la tierra. En esta actividad se usará una analogía sencilla para ilustrar cómo la radiación solar que absorbe el suelo y es luego reemitida, calienta progresiva-mente las capas de la atmósfera.



Lo que necesitarás


Vela de cera

Alambre

Plastilina

Qué hacer


- **1.** Arma con el alambre un rectángulo dejando el lado largo de al menos 15 cm.
- **2.** Ubica el rectángulo de forma vertical y ánclalo a una base con plastilina.
- **3.** Con la vela encendida agrega gotitas de cera a lo largo del rectángulo.
- **4.** Pon la vela en un extremo del rectángulo y deja que vaya calentando el alambre.
- **5.** Registra en una tabla el tiempo que tarda en desprenderse cada una de las gotitas del alambre.





<u>Sugerencia</u>: lee la Sección 2.2 del Manual del Cambio Climático antes de leer esta explicación.

La radiación solar con longitud de onda en el espectro visible es apenas absorbida por la atmósfera y llega al suelo casi sin ser alterada. En el suelo (superficie con un albedo bajo) es absorbida y por lo tanto contribuye al calentamiento de la superficie de la Tierra. El suelo irradia esta energía de vuelta al espacio como radiación térmica de onda larga (radiación infrarroja, IR). En el camino, parte de esta radiación térmica es absorbida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera.



Crédito: Scorza, Strähle

En la actividad realizada es la radiación absorbida por la cartulina negra y reemitida posteriermente la que calienta en aire del vaso progresivamente. En la actividad alternativa podemos observar cómo la energía que es trasmitida al alambre al ser calentado por la vela se transmite a lo largo de todo el alambre derritiendo las gotas de la vela, de manera análoga la radiación del sol que es absorbida y reemitida por el suelo transmiten energía a las capas atmosféricas calentándolas.









Detectando la radiación infrarroja invisible

Acerca de esta actividad

Esta actividad usarás una cámara para detectar radiación que nuestros ojos no pueden detectar.



Lo que necesitarás

Control remoto


Celular con cámara

Qué hacer

- 1. Abre la cámara del celular.
- **2.** Observa el bombillo del control remoto con tus ojos de manera directa.
- **3.** Observa el bombillo del control remoto al oprimir cualquier botón del control.



La radiación solar consiste en ondas electromagnéticas divididas en radiación gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo y radio. ¡Nuestros ojos solo pueden percibir una pequeña parte de este espectro! Sin embargo, nuestra piel siente radiación infrarroja invisible como calor. Un parámetro importante de las ondas es la longitud de onda λ (la distancia entre dos crestas / valles de onda). En la figura λ crece de izquierda a derecha.



Crédito: NASA

La radiación infrarroja puede ser emitida y detectada con instrumentos tecnológicos modernos: los mandos a distancia que utilizamos para encender el televisor, el equipo de música o el microondas utilizan rayos infrarrojos. En este experimento se usó un detector CCD, este dispositivo permite capturar y acumular paquetes de luz (fotones) durante un período de tiempo determinado, de manera que podemos detectar objetos que emiten o reflejan poca luz. Tanto así que en algunos casos su rango cubre el infrarrojo.

El dispositivo más sencillo, de uso cotidiano, que posee una cámara moderna y por lo tanto un detector CCD, es el teléfono móvil. ¡Es por esto que podemos obervar la luz infrarroja que emite el control remoto usando la cámara del celular!











Arcoíris usando un espejo y agua

Acerca de esta actividad

En esta actividad crearás un arcoiris usando un vaso de agua y un espejo. Entenderás de dónde surgen los colores que ves en el arcoiris.



Lo que necesitarás

1 vaso o taza plástica transparente

1 espejo pequeño que quepa en el recipiente

1 hoja de papel

Cinta de enmascarar

Agua

Qué hacer


- 1. Vierte el agua en el recipiente transparente.
- **2.** Coloca un espejo dentro del recipiente y sumérgel hasta la mitad, formando un ángulo de 45° con la superficie del agua (ver figura abajo).
- **3.** La luz deberá brillar a través de la parte superior del recipiente e iluminar directamente la superficie del agua.
- **4.** La luz deberá pasar a través del lateral del vaso, formando un arcoiris visible. Ubica la hoja de papel por fuera del vaso, frente a la parte sumergida del espejo para observarlo.



Crédito: pendiente



La luz del sol está compuesta por muchos colores o longitudes de onda, por lo que el color verdadero del sol es blanco (la uninón de todos los colores). Sin embargo, para nosotros el sol luce amarillo debido a que la atmósfera dispersa gran parte los colores verde, azul y violeta (con longitudes de onda más cortas) y llegan principalmente los rojos, amarillos y naranjas (con longitudes de onda más largas) a nuestros ojos.



Crédito: DrBob, Wikimedia

Un arcoiris es un fenómeno metereológico en el cual la luz del sol es dividida en todos los colores que la componen (espectro). En la imagen de arriba se ilustra cómo el fenómeno que observamos en la actividad ocurre también en una gota de agua. El aire en una región donde está lloviendo o llivió recientemente está lleno de pequeñas gotas como las de la imagen, este fenómeno ocurre en cada una de ellas y da origen a los arcoiris que observamos.







