

Pulverización segura de fitosanitarios

Guía práctica de buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios.

1. Antes de tratar. Lea siempre la etiqueta del producto: indica la dosis, el cultivo autorizado, el plazo de seguridad hasta la cosecha y el equipo de protección necesario. Compruebe que el producto está registrado para su cultivo y para la plaga que quiere controlar. Revise la previsión meteorológica: no trate con viento superior a 3 metros por segundo, con temperaturas por encima de 25 grados ni si se espera lluvia en las próximas horas, porque el producto se pierde por deriva, evaporación o lavado.
2. Calibración del equipo. Un pulverizador mal calibrado aplica de más o de menos. Al menos una vez por campaña, mida el caudal de cada boquilla con una probeta durante un minuto y sustituya las que se desvíen más de un 10 por ciento de la media. Ajuste la presión según la ficha de la boquilla y la velocidad de avance del tractor. Las boquillas antideriva reducen mucho las pérdidas en días con algo de aire. La inspección técnica periódica del equipo (ITEAF) es obligatoria.
3. Protección personal. Use guantes de nitrilo, mono de protección química, botas de goma y mascarilla con filtro adecuado durante la preparación del caldo, que es el momento de mayor riesgo porque se manipula el producto concentrado. No coma, beba ni fume mientras trata. Al terminar, lave el equipo de protección por separado de la ropa de casa y dúchese.
4. Después del tratamiento. Realice el triple enjuagado de los envases vacíos, vierta el agua del enjuague en el depósito y entregue los envases en un punto de recogida autorizado. Nunca los queme ni los entierre. Respete el plazo de reentrada a la parcela y el plazo de seguridad antes de cosechar. Anote cada tratamiento en el cuaderno de explotación: fecha, parcela, producto, dosis y plaga.
5. Protección del agua y la biodiversidad. Respete las bandas de seguridad junto a cursos de agua indicadas en la etiqueta. No limpie el pulverizador cerca de pozos o acequias. Evite tratar en floración si el producto es tóxico para las abejas, y si es inevitable, hágalo al atardecer, cuando la actividad de los polinizadores es menor.