
Funktionentheorie II

im Wintersemester 2017 / 18
Vorlesung von Prof. Dr. Winfried Kohnen

Vorlesungsmitschrieb von
Jonas Müller
Heidelberg, den 27. Oktober 2017

Vorwort

Dies ist eine Mitschrift der Vorlesung Funktionentheorie II von Prof. Winfried Kohnen aus dem Wintersemester 2017 / 18. Bei Fehlern meldet euch gerne bei mir

jj@mathphys.stura.uni-heidelberg.de

Die aktuellste version des Skriptes befindet sich immer unter

<https://github.com/jenuk/funktheo2/blob/master/script.pdf>

Die L^AT_EX-Source Dateien findet man hier

<https://github.com/jenuk/funktheo2/tree/master>

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 0 | Wiederholung | 1 |
| 1 | Konstruktion meromorpher und holomorpher Funktionen | 3 |
| 1.1 | Partialbruchzerlegung | 3 |
| 1.2 | Unendliche Produkte | 9 |

0 Wiederholung

Definition 0.1. Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ offen. $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ heit HOLOMORPH, falls f in jedem $z_0 \in D$ komplex differenzierbar ist, d. h.

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existiert.

Satz 0.2 (CAUCHYSCHER INTEGRALSATZ FR STERNGEBIETE). Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ ein Sterngebiet, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann gilt

(i) f hat auf D eine Stammfunktion.

(ii) $\int_C f(z) dz = 0$ fr jede stckweise glatte, geschlossene Kurve $C \subseteq D$.

Satz 0.3 (CAUCHYSCHES INTEGRALFORMEL). Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ offen und $\overline{U_r(z_0)} \subseteq D$. Dann gilt fr alle $z \in U_r(z_0)$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(w)}{w - z} dw$$

wobei C gegeben ist durch $z_0 + re^{2\pi i t}$ fr $t \in [0, 1]$.

Daraus folgen einige Aussagen:

- $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, dann ist $f \in \mathcal{C}^\infty$.
- Satz von Taylor: $f: U_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, dann gilt

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{mit } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

- f ist genau dann auf D holomorph, wenn f auf D analytisch ist.
- Lokale Abbildungseigenschaften holomorpher Funktionen
 - Identittssatz
 - Satz von der Gebietstreue
 - Maximumsprinzip

Definition 0.4 (SINGULARITTEN). Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ offen, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $a \notin D$, $\dot{U}_r(a) \subseteq D$. Dann heit a eine SINGULARITT von f . Die Klassifikationen einer Singularitt sind

-
- a ist *hebbar* (Riemannscher Hebbarkeitssatz)
 - a ist ein *Pol* ($\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = \infty$ wobei $z \neq a$ gelten muss)
 - a ist *wesentlich* (Casorati-Weierstraß)

Satz 0.5 (LAURENTZERLEGUNG). Sei $\mathcal{R} = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}$ ein Ringgebiet mit $0 \leq r < R \leq \infty$, $f: \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann existiert eine eindeutige Zerlegung

$$f(z) = g(z - a) + h\left(\frac{1}{z - a}\right) \quad z \in \mathcal{R}$$

wobei $g: U_R(0) \rightarrow \mathbb{C}$ der NEBENTEIL und $h: U_{r^{-1}}(0) \rightarrow \mathbb{C}$ der HAUPTTEIL holomorph mit $h(0) = 0$.

Anwendung auf Singularitäten: $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und a eine Singularität von f . Dann gibt es $\delta > 0$ mit $\dot{U}_\delta(a) \subseteq D$. Dann gilt

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n \quad z \in \dot{U}_\delta(a)$$

→ a ist genau dann hebbar, wenn $a_n = 0$ für alle $n \leq -1$.

→ a ist genau dann ein Pol der Ordnung $m \geq 1$, wenn $a_{-m} \neq 0$ und $a_n = 0$ für alle $n < -m$.

→ a ist genau dann wesentlich, wenn es unendlich viele $n < 0$ gibt mit $a_n \neq 0$.

Satz 0.6 (RESIDUENSATZ). Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ ein Elementargebiet, $z_1, \dots, z_h \in D$, $f: D \setminus \{z_1, \dots, z_h\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und C eine glatte geschlossene Kurve in $D \setminus \{z_1, \dots, z_h\}$. Dann gilt

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^h \operatorname{res}_{z=z_j} f \cdot \mathcal{X}(C, z_j)$$

wobei $\operatorname{res}_{z=z_j} f$ das Residuum von f ist und $\mathcal{X}(C, z_j)$ die Umlaufzahl von C um z_j ist.

1 Konstruktion meromorpher und holomorpher Funktionen

1.1 Partialbruchzerlegung

Satz 1.1 (PARTIALBRUCHZERLEGUNG RATIONALER FUNKTIONEN). Seien p, q zwei Polynome über \mathbb{C} , $q \neq 0$ und $R(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $q(z) \neq 0$ die zugehörige rationale Funktion. Seien z_1, \dots, z_h die verschiedenen Polstellen mit den Ordnungen μ_1, \dots, μ_h . Dann gibt es eindeutig bestimmte Polynome $p_1(z), \dots, p_h(z)$ mit $p_r(0) = 0$ ($r = 1, \dots, h$) und ein eindeutig bestimmtes Polynom p_0 , so dass gilt

$$R(z) = \sum_{r=1}^h p_r \left(\frac{1}{z - z_r} \right) + p_0(z) \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_h\}$$

Außerdem gilt $\deg p_r = \mu_r$ für $r = 1, \dots, h$.

Beweis. Für jedes $r = 1, \dots, h$ sei p_r der Hauptteil der Laurententwicklung von R bezüglich der Polstelle z_r . Dann ist p_r ein Polynom vom Grad μ_r . Sei

$$p_0(z) := R(z) - \sum_{r=1}^h p_r \left(\frac{1}{z - z_r} \right).$$

Dann hat p_0 keinen Hauptteil mehr, d. h. p_0 hat in z_1, \dots, z_h hebbare Singularitäten, ist also auf ganz \mathbb{C} holomorph. Aber p_0 ist nach Konstruktion eine rationale Funktion. Also ist p_0 ein Polynom. Das heißt es existieren p_0, \dots, p_h wie behauptet, es verbleibt die Eindeutigkeit zu zeigen.

Sei eine weitere Darstellung wie oben gegeben durch $\tilde{p}_0, \dots, \tilde{p}_h$. Sei $\nu \in \{1, \dots, h\}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} R(z) &= \tilde{p}_\nu \left(\frac{1}{1 - z_\nu} \right) + \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq \nu}}^h \tilde{p}_r \left(\frac{1}{1 - z_r} \right) + \tilde{p}_0(z) \\ &= p_\nu \left(\frac{1}{1 - z_\nu} \right) + \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq \nu}}^h p_r \left(\frac{1}{1 - z_r} \right) + p_0(z). \end{aligned} \tag{1.1}$$

Die ersten Summanden sind in einer kleinen punktierten Umgebungen von z_0 holomorph, der Rest in der gesamten Umgebung. Also ist (1.1) die Laurentzerlegung von R bezüglich z_ν . Da die Laurententwicklung eindeutig ist, folgt $p_\nu = \tilde{p}_\nu$. Da dies für alle $\nu \in \{1, \dots, h\}$ gilt, folgt bereits $p_0 = \tilde{p}_0$. *q.e.d.*

1.1. Partialbruchzerlegung

Ziel: Man beweise einen ähnlichen Satz für beliebige meromorphe Funktionen auf \mathbb{C} . (Erinnerung: eine meromorphe Funktion auf \mathbb{C} wird gegeben durch eine holomorphe Abbildung $f: \mathbb{C} \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$, wobei $S \subseteq \mathbb{C}$ diskret ist, d. h. S hat in \mathbb{C} keinen Häufungspunkt (insbesondere ist $\mathbb{C} \setminus S$ offen), und die Punkte aus S sind Pole von f .)

Problem: Ist S unendlich, so ist die Summe über die Hauptteile $\sum_{s \in S} p_s \frac{1}{z-s}$ im Allgemeinen nicht mehr konvergent.

Lösung: Man addiere konvergenz erzeugende Summanden!

Satz 1.2 (PARTIALBRUCHSATZ VON MITTAG-LEFFLER). (i) Sei $S \subseteq \mathbb{C}$ diskret. Jedem $s \in S$ sei eine ganze Funktion $h_s: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $h_s(0) = 0$ zugeordnet. (Man nennt $\{h_s\}_{s \in S}$ eine HAUPTTEILVERTEILUNG.) Dann gibt es eine holomorphe Funktion $h: \mathbb{C} \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$, deren Hauptteil in $s \in S$ durch $h_s(\frac{1}{z-s})$ gegeben wird. (Man nennt h eine Lösung der Hauptteilverteilung.) Ist H eine weitere Lösung, so existiert eine ganze Funktion g mit $H = h + g$.

(ii) Sei f eine auf \mathbb{C} meromorphe Funktion mit einer Polstellenmenge S und Hauptteilen p_s ($s \in S$). (Beachte: p_s ist ein Polynom mit $p_s(0) = 0$.) Dann existieren Polynome q_s ($s \in S$) und eine ganze Funktion g , sodass gilt

$$f(z) = \sum_{s \in S} \left(p_s \left(\frac{1}{z-s} \right) - q_s(z) \right) + g(z)$$

wobei die Summe in der Klammer auf kompakten Teilmengen $K \subseteq \mathbb{C} \setminus S$ absolut gleichmäßig konvergiert.

Beweis. (i) Ist S endlich, so ist $h(z) = \sum_{s \in S} h_s(\frac{1}{z-s})$ eine Lösung (siehe Beweis von Satz 1.1).

Sei nun S unendlich. Zeige dafür zunächst, dass S abzählbar ist. Sei $K \subseteq \mathbb{C}$ kompakt, dann ist $K \cap S$ beschränkt.

Angenommen $K \cap S$ ist unendlich. Nach Bolzano-Weierstraß hat dann $K \cap S$, also auch S , einen Häufungspunkt. \nmid

Also ist $S \cap K$ endlich. Da $\mathbb{C} = \bigcap_{n \geq 1} \overline{U_n(0)}$ und $\overline{U_n(0)}$ kompakt, ist S abzählbar.

Sei $s_0, s_1, \dots, s_n, \dots$ eine Abzählung derart, dass

$$|s_0| \leq |s_1| \leq \dots \leq |s_n| \leq \dots \rightarrow \infty$$

(Beachte: falls $0 \in S$, dann $s_0 = 0$, ferner $|s_n| > 0$ für $n \geq 1$.) Schreibe $h_n := h_{s_n}$ für $n \geq 0$.

Sei nun $n \geq 1$ fest. Dann ist die auf der offenen nichtleeren Kreisscheibe $U_{|s_n|}(0)$ holomorphe Funktion $h_n(\frac{1}{z-s_n})$ um den Ursprung in eine Potenzreihe entwickelbar (Taylor), welche auf kompakten Teilmengen gleichmäßig absolut konvergiert. Nach Definition der Konvergenz existiert daher ein Polynom $q_n(z)$ sodass

$$\left| h_n \left(\frac{1}{z-s_n} \right) - q_n(z) \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad \forall z \in \mathbb{C}: |z| \leq \frac{|s_n|}{2}$$

Sei $K \subseteq \mathbb{C}$ kompakt. Dann existiert $N \in \mathbb{N}$ sodass für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$ und $z \in K$ gilt $|z| \leq \frac{|s_n|}{2}$ (denn $|s_n| \rightarrow \infty$). Es folgt dass die Reihe

$$h(z) := h_0 \left(\frac{1}{z - s_0} \right) + \sum_{n \geq 1} \left(h_n \left(\frac{1}{z - s_n} \right) - q_n(z) \right)$$

auf Kompakta $K \subseteq \mathbb{C} \setminus S$ gleichmäSSig absolut konvergiert, denn $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} < \infty$. Nach WeierstraSS ist daher $h(z)$ auf $\mathbb{C} \setminus S$ holomorph. Schreibt man $h(z) = h_m(\frac{1}{z-s_m}) + \text{Rest}$ ($m \geq 0$ fest), so folgt, dass $h(z)$ eine Lösung der Hauptteilverteilung ist.

Sei H eine weitere Lösung. Dann haben h und H dieselbe Postellenmenge S und die gleichen Hauptteile für $s \in S$. Daraus folgt $g(z) := H(z) - h(z)$ hat in allen Punkten $s \in S$ hebbare Singularitäten, ist also ganz.

- (ii) Sei $\{p_s\}_{s \in S}$ die angegebene Hauptteilverteilung. Dieser hat als Lösung per Definition f . Ferner existiert die im Beweis von Satz 2, (i) konstruierte Lösung. Nach der Eindeutigkeit stimmen daher beide Lösung bis auf eine ganze Funktion g überein.

g.e.d.

Praktische Anwendung von Satz 2 Gegeben sei eine meromorphe Funktion f auf \mathbb{C} mit Polstellenmenge S .

- (i) Man bestimme die Hauptteile für alle $s \in S$.
- (ii) Man untersuche $\sum_{s \in S} p_s(\frac{1}{z-s})$ auf Konvergenz und bestimme gegebenenfalls Polynome q_s ($s \in S$) (durch Abbruch der entsprechenden Taylor-Reihe), sodass $\sum_{s \in S} (p_s(\frac{1}{z-s}) - q_s(z))$ auf Kompakta $K \subseteq \mathbb{C} \setminus S$ gleichmäSSig absolut konvergiert.
- (iii) Man bestimme eine ganze Funktion g , so dass

$$f(z) = \sum_{s \in S} \left(p_s \left(\frac{1}{z - s} \right) - q_s(z) \right) + g(z) \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus S$$

Beispiel 1.3. (i) Es gilt

$$\frac{\pi^2}{(\sin \pi z)^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2} \quad \text{für } z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} \quad (1.2)$$

wobei die Summe rechts auf Kompakta $K \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gleichmäSSig absolut konvergiert.

Beweis. Siehe unten.

g.e.d.

- (ii) *Partialbruchzerlegung des Kotangens*

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z - n} + \frac{1}{n} \right) \quad (z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}) \quad (1.3)$$

1.1. Partialbruchzerlegung

Beweis. Siehe unten.

g.e.d.

Beweis. (i) Die Polstellenmenge ist offensichtlich $S = \mathbb{Z}$.

Bestimmung der Hauptteile: Sei $z \neq 0$, z nahe bei Null. Dann ist

$$\frac{\pi}{\sin(\pi z)} = \frac{1}{z} \frac{1}{\frac{\sin(\pi z)}{\pi z}} = \frac{1}{z} \cdot (1 + a_2 z^2 + \dots)$$

wobei $\frac{\sin \pi z}{\pi z}$ in $z = 0$ eine hebbare Singularität dort den Wert 1 hat und eine gerade Funktion ist. Also

$$\frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2} = \frac{1}{z^2} \cdot (1 + 2a_2 z^2 + \dots) = \frac{1}{z^2} + 2a_2 + \dots$$

Also ist der Hauptteil in $z = 0$ bereits $\frac{1}{z^2}$.

Sei $n \in \mathbb{Z}$ fest. Für $z \neq n$, z nahe bei n gilt

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2} &= \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi(z - n) + \pi n)} \\ &= \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi(z - n))} \\ &= \frac{1}{(z - n)^2} + 2a_2 + \dots \end{aligned}$$

Also ist der Hauptteil von $\frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2}$ von $z = n$ bereits $\frac{1}{(z - n)^2}$.

Konvergenz der Reihe in (1.2): Sei $K \subseteq \mathbb{C}$ kompakt. Es gelte $|z| \leq c$ für $z \in K$. Für $n \in \mathbb{Z}$ mit $|n| \geq 2c$ gilt

$$|z - n| = |n - z| \geq |n| - |z| \geq |z| - c \geq \frac{|n|}{2} \quad \forall z \in K$$

Also

$$\sum_{|n| \geq 2c} \frac{1}{|z - n|^2} \leq \sum_{|n| \geq 2c} \frac{4}{|n|^2} < \infty$$

Daher ist

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z - n|^2}$$

auf Kompakta in $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gleichmäßig absolut konvergent.

Folgerung: Beide Seiten von (1.2) sind auf $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ holomorphe Funktionen mit den gleichen Polstellen und gleichen Hauptteilen. Daher folgt

$$\frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2} + g(z) \quad (z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z})$$

wobei g ganz ist.

Zeige $g \equiv 0$. Es gilt für $z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}\sin^2 \pi z &= \left| \frac{e^{\pi iz} - e^{-\pi iz}}{2} \right|^2 \\ &= \frac{1}{4} (e^{\pi iz} - e^{-\pi iz}) \overline{(e^{\pi iz} - e^{-\pi iz})} \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{4} (e^{-2\pi y} + e^{2\pi y}) - \frac{1}{2} \cos(2\pi x) \\ &\xrightarrow{|y| \rightarrow \infty} \infty \quad \text{gleichmäSSig in } x\end{aligned}$$

denn $\cos(2\pi x)$ ($x \in \mathbb{R}$) ist beschränkt. Also $\left| \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} \right| \rightarrow 0$ für $|y| \rightarrow \infty$ gleichmäSSig in x . Insbesondere ist $\frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2}$ beschränkt auf

$$R := \{ z = x + iy \mid |x| \leq 1, |y| \geq 1 \}$$

Zeige rechte Seite von (1.2) ebenfalls auf R beschränkt. Sei $z \in R, n \neq 0$. Dann

$$\begin{aligned}|z - n|^2 &= (x - n)^2 + y^2 = |n - x|^2 + y^2 \\ &\geq (|n| - |x|)^2 + y^2 \geq (|n| - 1)^2 + y^2 \\ &\geq (|n| - 1)^2 + 1\end{aligned}$$

Also für $z \in R$ gilt

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z - n|^2} = \frac{1}{z^2} + \sum_{n \neq 0} \frac{1}{|z - n|^2} \leq 1 + \sum_{n \neq 0} \frac{1}{(|n| - 1)^2 + 1} < \infty \quad (1.4)$$

Daher ist $g(z)$ auf R beschränkt. Aber $g(z+1) = g(z)$ für $z \in \mathbb{C}$. Trivialerweise ist g auf $\{ z = x + iy \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1 \}$ beschränkt. Also ist g auf \mathbb{C} beschränkt, nach Liouville ist $g \equiv c$ konstant.

Aus (1.4) folgt, dass $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z - n|^2}$ gleichmäSSig absolut konvergiert. Sei $z = x + iy \in \mathbb{C}$ mit $x \in \mathbb{R}$ fest. Dann folgt

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z - n|^2} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{|z - n|^2} = 0,$$

da

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{|z - n|^2} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{(x - n)^2 + y^2} = 0.$$

Und wir wissen bereits, dass $\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} \rightarrow 0$ für $|y| \rightarrow \infty$. Also muss bereits gelten $c = 0$.

1.1. Partialbruchzerlegung

- (ii) Vorgehen wie in (i): Man sieht $S = \mathbb{Z}$ und der Hauptteil in $z = n \in \mathbb{Z}$ ist $\frac{1}{z-n}$. Da $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{z-n}$ schlechte Konvergenzeigenschaften hat, muss man Polynome abziehen. Beachte für $n \neq 0$ ist $\frac{1}{z-n}|_{z=0} = -\frac{1}{n}$. Damit folgt dann die Behauptung.

Alternativ kann man (i) + Trick benutzen: Differenziere beide Seiten von (1.3):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right) \right) &= -\frac{1}{z^2} - \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{1}{(z-n)^2} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} (\pi \cot(\pi z)) &= \pi \frac{d}{dz} \left(\frac{\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)} \right) \\ &= \pi \frac{-\pi \sin(\pi z) \sin(\pi z) - \pi \cos(\pi z) \cos(\pi z)}{\sin(\pi z)^2} \\ &= -\frac{\pi^2}{\sin(\pi z)^2}. \end{aligned}$$

Da $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ ein Gebiet ist, unterscheiden sich die rechte und linke Seite (da die Ableitungen nach (i) gleich sind) nur um eine Konstante c . Zeige $c = 0$. Hierfür zeige, dass $\pi \cot(\pi z)$ und $\frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right)$ ungerade sind. Es gilt

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{-z-n} + \frac{1}{n} \right) &= - \left(\frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= - \left(\frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right) \right), \end{aligned}$$

wobei der letzte Schritt folgt, wenn wir $n \mapsto -n$ ersetzen, was eine bijektive Abbildung von $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ auf sich selbst ist.

Es muss also gelten, dass c ungerade ist. Für eine ungerade Konstante gilt bereits $c = 0$.

q.e.d.

1.2 Unendliche Produkte

Gegeben sei eine Folge $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ komplexer Zahlen. Wir wollen nun in sinnvoller Weise das unendliche Produkt

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

definieren. Ein naheliegender Vorschlag dafür ist: $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ heist konvergent, falls die Folge $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ der Partialprodukte $P_N = \prod_{n=1}^N p_n$ konvergent ist. In diesem Fall setzen wir

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n := \lim_{N \rightarrow \infty} P_N =: P.$$

Das Problem was sich mit dieser Definition stellt ist, dass falls einer der Faktoren Null ist, so ist der Wert des Produktes gleich 0. Dieses hngt also gar nicht von der Gesamtheit der Faktoren ab. Ferner mchte man oft $\prod_{n=1}^N p_n$ bzw. P mit der Summe $\sum_{n=1}^N \log p_n$ bzw. mit $\log P$ vergleichen. Und das geht nur falls $p_n \neq 0$ fr alle $n \in \mathbb{N}$ und entsprechend $P \neq 0$. Spter wollen wir allerdings holomorphe Funktionen als Produkte darstellen, dies sollte auch mglich sein, wenn diese Nullstellen haben.

Definition 1.4 (UNENDLICHES PRODUKT). Sei $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in \mathbb{C} derart, dass nur endlich viele der p_n Null sind. Sei $m \in \mathbb{N}$ der grste Index mit $p_m = 0$ (und $m := 0$, falls $p_n \neq 0$ fr alle $n \in \mathbb{N}$). Dann heist das UNENDLICHE PRODUKT

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

konvergent, falls der Limes

$$\lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ N \geq m+1}} P_N \text{ mit } P_N = \prod_{n=m+1}^N p_n$$

existiert und ungleich Null ist. Man setzt dann

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n := \begin{cases} \lim_{N \rightarrow \infty} P_N & \text{falls } m = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Dabei ist zu beachten, dass nach Definition ein konvergentes unendliches Produkt den Wert 0 genau dann hat, wenn ein Faktor gleich Null ist.

Beispiel 1.5. (i) Das unendliche Produkt $\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n^2})$ ist konvergent und hat den Wert $\frac{1}{2}$.

1.2. Unendliche Produkte

Beweis. Zunächst sind alle Faktoren ungleich Null und

$$\begin{aligned} P_n &= \prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} \\ &= \frac{(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (N-1)) \cdot (3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (N+1))}{(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot N) \cdot (2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot N)} \\ &= \frac{1}{N} \frac{N+1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{N}\right) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

g.e.s.

- (ii) $\prod_{n \geq 1} (1 - \frac{1}{n^2}) = 0 \cdot \prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n^2})$ ist konvergent und hat Wert 0
 (iii) $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ist nicht konvergent in unserem Sinn. Denn

$$P_N = \prod_{n=1}^N \frac{1}{n} = \frac{1}{N!} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Satz 1.6. (i) Ist $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ konvergent, so gilt notwendigerweise $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$.

(ii) Sei $p_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ konvergent genau dann, wenn

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log} p_n$$

konvergiert. (Erinnerung $\operatorname{Log} z = \log|z| + i \operatorname{Arg} z$ der Hauptwert des Logarithmus und $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$ das Argument von z .) Insbesondere ist $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P$, so existiert $h \in \mathbb{Z}$ so dass

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log} p_n = \operatorname{Log} P + 2\pi i h$$

gilt. Ist umgekehrt $S = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log} p_n$, so gilt

$$e^S = \prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

Beweis. (i) Es ist

$$p_{N+1} = \frac{P_{N+1}}{P_N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{P}{P} = 1$$

für $N \geq m+1$, hierbei benutzt man $p_n \neq 0$ für $n \geq m+1$ und $P \neq 0$.

(ii) Es gelte

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log} p_n$$

Also $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ mit $S_N = \sum_{n=1}^N \operatorname{Log} p_n$. Da \exp stetig ist, folgt

$$\begin{aligned} 0 \neq e^S &= \lim_{N \rightarrow \infty} e^{S_N} = \lim_{N \rightarrow \infty} e^{\log p_1 + \dots + \log p_N} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} e^{\log p_1} \cdot \dots \cdot e^{\log p_N} = \lim_{N \rightarrow \infty} (p_1 \cdot \dots \cdot p_N) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N p_n = P \end{aligned}$$

q.e.d.

Satz 1.7. (i) Sei $1 + a_n \neq 0$ für $n \geq 1$. Dann ist

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Log}(1 + a_n)$$

genau dann absolut konvergent, wenn $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergiert.

(ii) Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergiert. Dann ist $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ konvergent. Außerdem ist das Produkt unbedingt konvergent, d. h. jede Umordnung konvergiert und hat den gleichen Limes.

Liste der Sätze

| | | |
|-----|--|---|
| 0.2 | Satz (Cauchyscher Integralsatz für Sterngebiete) | 1 |
| 0.3 | Satz (Cauchysche Integralformel) | 1 |
| 0.4 | Definition (Singularitäten) | 1 |
| 0.5 | Satz (Laurentzerlegung) | 2 |
| 0.6 | Satz (Residuensatz) | 2 |
| 1.1 | Satz (Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen) | 3 |
| 1.2 | Satz (Partialbruchsatz von Mittag-Leffler) | 4 |
| 1.4 | Definition (Unendliches Produkt) | 9 |

Index

Hauptteil, [2](#)

Hauptteilverteilung, [4](#)

holomorph, [1](#)

Nebenteil, [2](#)

Singularität, [1](#)

unendliche Produkt, [9](#)