

---

# Modulformen I

Sommersemester 2018  
Vorlesung von Prof. Dr. Winfried Kohnen

---

Vorlesungsmitschrieb von  
Patrick Arras  
Jonas Müller

Heidelberg, den 2. Juli 2018



# Vorwort

Dies ist ein nicht offizielles Skript der Vorlesung Modulformen 1 aus dem Sommersemester 2018 gehalten von Professor Winfried Kohnen an der Universität Heidelberg. Das Skript wurde in der Vorlesung mitgetext und mit pdf<sub>l</sub>atex kompiliert. Deshalb kann es Fehler enthalten und wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit.

Bei Fehlern kann ich unter folgender Mailadresse erreicht werden:

[jj@mathphys.stura.uni-heidelberg.de](mailto:jj@mathphys.stura.uni-heidelberg.de)

Die aktuellste Version des Skriptes befindet sich immer unter

<https://github.com/jenuk/modulformen/blob/master/script.pdf>

Die L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Source Dateien findet man hier, auf Fehler kann hier alternativ über neues Issue aufmerksam gemacht werden:

<https://github.com/jenuk/modulformen/tree/master>



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>iv</b>
<b>1. Grundlegende Tatsachen</b>	<b>1</b>
1.1. Ergebnisse aus Funktionentheorie 2 (Erinnerung)	1
1.1.1. Fundamentalbereich	1
1.1.2. Modulform	3
1.1.3. Beispiele für Modulformen	4
1.1.4. Valenzformel und Anwendungen	6
1.2. Die Modulnvariante $j$	9
<b>2. Heckeoperatoren</b>	<b>13</b>
2.1. Vorbemerkung, Motivation	13
2.2. Die Heckeoperatoren $T(n)$	15
2.3. Folgerungen	22
<b>3. Das Petersson'sche Skalarprodukt</b>	<b>25</b>
3.1. Invariantes Maß und Skalarprodukt	25
3.2. Anwendung: Eine Charakterisierung der Eisensteinreihen	30
<b>4. Poincaré-Reihen</b>	<b>33</b>
4.1. Anwendungen	33
4.1.1. Die Ramanujan $\tau$ -Funktion	39
4.1.2. Die Petersson'schen Formeln	39
4.1.3. Hecke-Operatoren sind hermitesch	41
<b>5. Die Eichler-Selberg-Spurformel auf <math>SL_2(\mathbb{Z})</math></b>	<b>45</b>
<b>6. L-Reihen zu Modulformen</b>	<b>63</b>
6.1. Dirichletreihen	63
6.2. Formale Eigenschaften von Dirichletreihen	68
<b>A. Exkurs: Produktdarstellung der Diskriminantenfunktion</b>	<b>71</b>
<b>Index</b>	<b>75</b>
<b>Liste der Sätze</b>	<b>77</b>



# 1. Grundlegende Tatsachen

## 1.1. Ergebnisse aus Funktionentheorie 2 (Erinnerung)

### 1.1.1. Fundamentalbereich

Wie üblich sei

$$\mathbb{H} = \{ z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0 \}$$

die obere Halbebene und

$$\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{ M \in M_2(\mathbb{R}) \mid \det M = 1 \}.$$

Dann operiert  $\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})$  auf  $\mathbb{H}$  durch

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \circ z = \frac{az + b}{cz + d},$$

das heißt  $E \circ z = z$  und  $(M_1 M_2) \circ z = M_1 \circ (M_2 \circ z)$ . Hierbei beachte man, dass

$$\operatorname{Im} \left( \frac{az + b}{cz + d} \right) = \frac{\operatorname{Im} z}{|cz + d|^2}.$$

$\Gamma(1) = \operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}) \subseteq \operatorname{SL}_2(\mathbb{R})$  ist eine diskrete Untergruppe, spezielle Matrizen in  $\Gamma(1)$  sind

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

die Translation  $T \circ z = z + 1$  und Stürzung  $S \circ z = -\frac{1}{z}$ .

Man interessiert sich für die Operation von diskreten Untergruppen  $\Gamma \subseteq \operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})$  insbesondere  $\Gamma = \Gamma(1)$ .

**Definition 1.1.1.** Eine Teilmenge  $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{H}$  heißt FUNDAMENTALBEREICH für die Operationen von  $\Gamma \subseteq \operatorname{SL}_2(\mathbb{R})$  auf  $\mathbb{H}$ , falls:



Abbildung 1.1.: Der Fundamentalbereich  $\mathcal{F}_1$  der vollen Modulgruppe.

- (i)  $\mathcal{F}$  ist offen,
- (ii) zu jedem  $z \in \mathbb{H}$  existiert ein  $M \in \Gamma$  mit  $M \circ z \in \overline{\mathcal{F}}$ ,
- (iii) Sind  $z_1, z_2 \in \mathcal{F}$  und  $z_2 = M \circ z_1$  mit  $M \in \Gamma$ , dann gilt  $M = \pm E$  und somit  $z_1 = z_2$ .

**Beispiel 1.1.2.** Die Menge  $\mathcal{F}_1 := \{z = x + iy \mid |x| < \frac{1}{2}, |z| > 1\}$  ist ein Fundamentalbereich für die Operation von  $\Gamma(1)$  auf  $\mathbb{H}$ , dieser wird auch MODULFIGUR genannt. Siehe [Abbildung 1.1.](#)

**Bemerkung 1.1.3.** Identifikationen in  $\overline{\mathcal{F}_1}$  finden nur auf dem Rand statt. (Die Geraden  $x = \pm \frac{1}{2}$  werden miteinander identifiziert unter  $T$  bzw  $T^{-1}$ , Punkte auf den Kreisbögen rechts oder links von  $i$  werden unter  $S$  identifiziert.

**Satz 1.1.4.** Die Gruppe  $\Gamma(1)$  wird erzeugt von  $S$  und  $T$ .



### 1.1.2. Modulform

**Definition 1.1.5.** Eine Abbildung  $f: \mathbb{H} \rightarrow \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  heißt MODULFUNKTION vom Gewicht  $k \in \mathbb{Z}$  für  $\Gamma(1)$ , falls gilt:

- (i)  $f$  ist auf  $\mathbb{H}$  meromorph,
- (ii)  $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$  für alle  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$ ,
- (iii)  $f$  ist meromorph in  $\infty$ .

*Bedeutung von (iii):* Wendet man (ii) an mit  $M = T$ , so erhält man  $f(z+1) = f(z)$ . Sei  $\mathcal{R} = \{q \in \mathbb{C} \mid 0 < |q| < 1\}$ . Die Abbildung  $z \mapsto q = e^{2\pi iz}$  bildet  $\mathbb{H}$  auf  $\mathcal{R}$  ab und  $F(q) := f(z)$  ist wohldefiniert und holomorph bis auf mögliche Polstellen, die sich prinzipiell gegen  $q = 0$  häufen könnten. Bedingung (iii) fordert nun, dass  $q = 0$  eine unwesentliche isolierte Singularität<sup>1</sup> von  $F$  ist. Nach Funktionentheorie 1 hat dann  $F$  eine Laurententwicklung

$$F(q) = \sum_{n \geq n_0} a_n q^n \quad \text{für } 0 < |q| < |q_0|$$

wobei  $n_0 \in \mathbb{Z}$  fest. Damit erhalten wir also

$$f(z) = \sum_{n \geq n_0} a_n e^{2\pi i n z} \quad \text{für } 0 < y_0 < y$$

**Definition 1.1.6.** Ein solches  $f$  heißt MODULFORM falls  $f$  auf  $\mathbb{H}$  und in  $\infty$  holomorph ist (letzteres bedeutet, dass  $F$  in  $q = 0$  hebbbar ist, also  $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n e^{2\pi i n z}$  für alle  $z \in \mathbb{H}$ ). Eine Modulform heißt Spitzenform, falls  $a_0 = 0$ .

**Bemerkung 1.1.7.** Die Fourierkoeffizienten  $a_n$  sind im Allgemeinen wichtige und interessante Größen (z. B. Darstellungsanzahlen von natürlichen Zahlen durch quadratische Formen, etwa  $r_4(n) = \#\{(x, y, z, w) \in \mathbb{Z}^4 \mid n = x^2 + y^2 + z^2 + w^2\}$  oder die Anzahl von Punkten auf elliptischen Kurven über  $\mathbb{F}_p$ ).

**Definition 1.1.8.** Sei  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{R})$ . Man setzt

$$(f|_k M)(z) := (cz+d)^{-k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$$

für  $z \in \mathbb{H}$ , dies ist der PETERSSONSCHE STRICHOPERATOR.

<sup>1</sup>Das heißt es handelt sich um eine hebbare Singularität oder eine Polstelle.

## 1.1. Ergebnisse aus Funktionentheorie 2 (Erinnerung)

---

Dann gilt  $f|_k E = f$  und  $f|_k(M_1 M_2) = (f|_k M_1)|_k M_2$  für alle  $M_1, M_2 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ . Es folgt:

- (i) Es gilt  $(f|_k M)(z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = f(z)$  für alle  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$  genau dann, wenn dies für  $S$  und  $T$  gilt, d. h.  $f(-\frac{1}{z}) = z^k f(z)$  und  $f(z+1) = f(z)$ , da  $S$  und  $T$   $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  erzeugen.
- (ii) Eine Funktion  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  ist genau dann eine Modulform vom Gewicht  $k$ , wenn  $f$  eine Fourierentwicklung

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n e^{2\pi i n z} \quad \text{für } z \in \mathbb{H}$$

hat und zusätzlich gilt

$$f\left(-\frac{1}{z}\right) = z^k f(z)$$

### 1.1.3. Beispiele für Modulformen

#### Thetareihen

**Definition 1.1.9.** Sei  $A \in M_m(\mathbb{R})$  symmetrisch und positiv definit. Dann heißt

$$\vartheta_A(z) = \sum_{g \in \mathbb{Z}^m} e^{\pi i A[g]z} \quad \text{für } z \in \mathbb{H}$$

eine THETAREIHE, wobei  $A[g] := g^t A g$  für  $g \in \mathbb{Z}^m \cong M_{m,1}(\mathbb{Z})$ .

#### Satz 1.1.10.

- (i)  $\vartheta_A(z)$  ist gleichmäßig absolut konvergent auf  $y \geq y_0 > 0$ . Insbesondere ist  $\vartheta_A(z)$  auf  $\mathbb{H}$  holomorph.
- (ii) Es gilt die Theta-Transformationsformel:  $\vartheta_{A^{-1}} = \sqrt{\det A} \cdot \left(\frac{z}{i}\right)^{\frac{m}{2}} \vartheta_A(z)$ .

**Satz 1.1.11.** Sei  $A \in M_m(\mathbb{Z})$  symmetrisch, positiv definit, gerade<sup>2</sup> und  $\det A = 1$ . Dann gilt  $8|m$  und  $\vartheta_A(z)$  ist eine Modulform vom Gewicht  $\frac{m}{2}$  für  $\Gamma(1)$ .

*Beachte*  $\vartheta_A(z) = 1 + \sum_{n \geq 1} r_A(n) q^n$  wobei  $r_A(n)$  die Anzahl der Darstellungen von  $n$  durch die ganzzahlige, positive definite quadratische Form  $x \mapsto \frac{1}{2} x^t A x$  auf  $\mathbb{R}^m$  ist.

---

<sup>2</sup>Das heißt für alle  $\mu \in \{1, \dots, m\}$  gilt  $a_{\mu\mu}$  ist gerade

## Eisensteinreihen

**Definition 1.1.12.** Sei  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k$  gerade und  $k \geq 4$ . Dann heißt

$$G_k(z) = \sum'_{m,n} \frac{1}{(mz+n)^k} \quad \text{für } z \in \mathbb{H}$$

EISENSTEINREIHE vom Gewicht  $k$ .<sup>3</sup>

**Satz 1.1.13.**

- (i)  $G_k(z)$  ist gleichmäßig absolut konvergent auf  $D_\varepsilon = \{z = x + iy \mid y \geq \varepsilon, x^2 \leq \frac{1}{\varepsilon}\}$ , insbesondere also holomorph auf  $\mathbb{H}$ .
- (ii)  $G_k$  ist Modulform vom Gewicht  $k$  für  $\Gamma(1)$ .
- (iii) Es gilt

$$G_k(z) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

wobei  $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$  und  $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ .

Setze  $E_k := \frac{1}{2\zeta(k)} G_k$  die NORMALISIERTE EISENSTEINREIHE. Benutze nun

$$\zeta(k) = \frac{(-1)^{\frac{k}{2}-1} 2^{k-1} B_k}{k!} \pi^k$$

für  $k$  gerade und  $k \geq 2$ . Damit folgt

$$E_k = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

wobei alle  $B_k$  rationale Zahlen sind. Speziell gilt

$$B_4 = -\frac{1}{30} \quad \implies \quad E_4 = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n,$$

$$B_6 = \frac{1}{42} \quad \implies \quad E_6 = 1 - 504 \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n) q^n.$$

---

<sup>3</sup>  $\sum'_{m,n} := \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}}$

### 1.1.4. Valenzformel und Anwendungen

**Satz 1.1.14 (VALENZFORMEL).** Sei  $f$  eine Modulfunktion vom Gewicht  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $f \neq 0$ . Dann gilt

$$\text{ord}_\infty f + \frac{1}{2} \text{ord}_i f + \frac{1}{3} \text{ord}_\rho f + \sum_{\substack{z \in \Gamma(1) \backslash \mathbb{H} \\ z \neq i, \rho}} \text{ord}_z f = \frac{k}{12}.$$

Hierbei ist  $\rho = e^{\frac{2\pi i}{3}}$  und

$$\text{ord}_\infty f := \text{ord}_{q=0} F(q)$$

mit  $F(q) = f(z)$  für  $q = e^{2\pi i z}$ .

**Beweis.** Zum Nachweis reduziert man auf den Fall, dass  $f$  außer in  $z = \rho, -\bar{\rho}, i$  keine Null- oder Polstellen auf  $\partial \bar{F}_1$  hat und berechnet

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Wobei die Kurve  $\mathcal{C}$  wie in [Abbildung 1.2](#) gewählt ist.

*g.e.d.*

**Definition 1.1.15.** Sei

$$\Delta(z) = \frac{1}{1728} (E_4^3(z) - E_6^2(z))$$

die DISKRIMINANTENFUNKTION. Dann ist  $\Delta$  eine Spitzenform vom Gewicht  $k = 12$  mit  $\Delta(z) \neq 0 \forall z \in \mathbb{H}$  und  $\text{ord}_\infty \Delta = 1$ , d. h.  $\Delta = q + \dots$

**Bemerkung 1.1.16.**  $\Delta$  ist in gewisser Weise die „erste“ von 0 verschiedene Spitzenform und wurde von vielen Mathematikern studiert.

**Beispiel 1.1.17.**

- (i) Schreibe  $\Delta(z) = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n$ , dann heißt  $n \mapsto \tau(n)$  RAMANUJAN-FUNKTION. Es gilt:  $\tau(n) \in \mathbb{Z}$  für alle  $n \geq 1$ . Ferner lässt sich zeigen, dass  $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ , mithilfe von  $B_{12} = -\frac{691}{2730}$ .
- (ii) Vermutung:  $\tau(n) \neq 0$  für alle  $n \geq 1$  (Lehner)




Abbildung 1.2.: Die Kurve  $\mathcal{C}$  wobei  $A$  und  $E$  so gewählt sind, dass  $\mathcal{C}$  alle Null- und Polstellen enthält.

Sei  $M_k$  der  $\mathbb{C}$ -Vektorraum der Modulformen vom Gewicht  $k \in \mathbb{Z}$  und  $S_k \subseteq M_k$  der Unterraum der Spitzenformen.

**Bemerkung 1.1.18.**  $M_k = \{0\}$  für  $k$  ungerade, da  $f((-E) \circ z) = f(z) = (-1)^k f(z)$ .

**Satz 1.1.19.** Sei  $k \in \mathbb{Z}$  gerade. Dann gilt:

- (i)  $M_k = \{0\}$  für  $k < 0$  und  $M_2 = \{0\}$ .
- (ii)  $M_0 = \mathbb{C}$ .
- (iii)  $M_k = \mathbb{C}E_k \oplus S_k$ , falls  $k \geq 4$ .
- (iv) Die Abbildung  $f \mapsto f \cdot \Delta$  gibt einen Isomorphismus von  $M_{k-12}$  auf  $S_k$ .
- (v)  $\dim M_k < \infty$ .

**Satz 1.1.20.** Sei  $k \geq 0$  gerade. Dann gilt:

$$\dim M_k = \begin{cases} \lfloor \frac{k}{12} \rfloor & \text{falls } k \equiv 2 \pmod{12} \\ 1 + \lfloor \frac{k}{12} \rfloor & \text{falls } k \not\equiv 2 \pmod{12} \end{cases}$$

**Beispiel 1.1.21.**

- (i)  $M_4 = \mathbb{C}E_4$ .
- (ii)  $M_6 = \mathbb{C}E_6$ .
- (iii)  $M_8 = \mathbb{C}E_8 = \mathbb{C}E_4^2$ .
- (iv)  $M_{10} = \mathbb{C}E_{10} = \mathbb{C}E_4E_6$ .
- (v)  $M_{12} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta$ .
- (vi)  $M_{14} = \mathbb{C}E_{14}$ .

**Satz 1.1.22.** Sei  $k \geq 0$  gerade. Dann bilden  $E_4^\alpha E_6^\beta$  mit  $4\alpha + 6\beta = k$  eine Basis von  $M_k$ , insbesondere gilt also

$$M_k = \bigoplus_{\substack{\alpha, \beta \geq 0 \\ 4\alpha + 6\beta = k}} \mathbb{C}E_4^\alpha E_6^\beta$$

**Beweis.** Wir zeigen zunächst induktiv, dass die Monome  $M_k$  erzeugen. Für  $k \leq 10$  ist dies nach Beispiel 1.1.21 klar. Sei also  $k \geq 12$ . Man bestimme eine beliebige Kombination  $\alpha, \beta \geq 0$  mit  $4\alpha + 6\beta = k$  und setze  $g := E_4^\alpha E_6^\beta \in M_k$  mit konstantem Term gleich 1.

Sei nun  $f \in M_k$  beliebig mit konstantem Term  $a_0$ . Dann ist  $f - a_0 \cdot g \in S_k$ . Nach Satz 1.1.19, iv) gilt daher  $f - a_0 \cdot g = \Delta \cdot h$  mit  $h \in M_{k-12}$ . Nach Induktionsvoraussetzung ist  $h$  eine Linearkombination von Monomen  $E_4^\gamma E_6^\delta$  mit  $4\gamma + 6\delta = k - 12$ . Aber  $\Delta = \frac{1}{1728}(E_4^3 - E_6^2)$  und daher ist  $f - a_0 \cdot g$  Linearkombination von Monomen  $E_4^{\gamma+3} E_6^\delta$  und  $E_4^\gamma E_6^{\delta+2}$ . Wegen

$$4(\gamma + 3) + 6\delta = k - 12 + 12 = k$$

$$4\gamma + 6(\delta + 2) = k - 12 + 12 = k$$

ist also auch  $f$  als Linearkombination von Monomen der behaupteten Form schreibbar. Somit erzeugen die Monome tatsächlich  $M_k$ .

Noch zu zeigen ist, dass die Monome über  $\mathbb{C}$  linear unabhängig sind. Beweis durch Widerspruch: *Angenommen*, es existiere eine nicht-triviale lineare Relation

$$\sum_{\substack{\alpha, \beta \geq 0 \\ 4\alpha + 6\beta = k}} \lambda_{\alpha, \beta} E_4^\alpha E_6^\beta = 0.$$

*Fall 1:* Sei  $k \equiv 0 \pmod{4}$ . Dann sind alle  $\beta$  gerade, also schreibe jeweils  $\beta = 2\beta'$  mit  $\beta' \geq 0$ . Es folgt  $\alpha = \frac{k}{4} - 3\beta'$  und somit

$$E_4^\alpha E_6^\beta = E_4^{\frac{k}{4} - 3\beta'} E_6^{2\beta'} = E_4^{\frac{k}{4}} \left( \frac{E_6^2}{E_4^3} \right)^{\beta'}.$$

Da  $E_4^{\frac{k}{4}}$  nicht die Nullfunktion ist, ergibt sich eine nicht-triviale Polynom-Relation für  $\frac{E_6^2}{E_4^3}$ , d. h. die meromorphe Funktion  $\frac{E_6^2}{E_4^3}$  ist Nullstelle eines nicht-trivialen Polynoms über  $\mathbb{C}$ . Da  $\mathbb{C}$  algebraisch abgeschlossen ist (jedes nicht-konstante Polynom über  $\mathbb{C}$  zerfällt vollständig über  $\mathbb{C}$  in Linearfaktoren), ist  $\frac{E_6^2}{E_4^3}$  somit konstant.

Wir zeigen  $\frac{E_6^2}{E_4^3} \equiv 0$  mit einem *Trick*: Es gilt  $E_6(-\frac{1}{z}) = z^6 E_6(z)$ , denn  $E_6 \in M_6$ . Auswerten in  $z = i = -\frac{1}{i}$  liefert  $E_6(i) = 0$ . Ferner gilt

$$E_4(z) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) e^{2\pi i n z} \implies E_4(i) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) e^{-2\pi n}.$$

Da alle Summanden positiv sind, folgt  $E_4(i) \neq 0$  und somit  $\frac{E_6^2(i)}{E_4^3(i)} = 0$ . Dies impliziert jedoch da  $\frac{E_6^2}{E_4^3}$  konstant ist bereits  $E_6 \equiv 0$ .  $\nmid$

*Fall 2:* Sei  $k \equiv 2 \pmod{4}$ , dann sind alle  $\beta$  ungerade. Analoges Vorgehen zum ersten Fall liefert ebenfalls einen Widerspruch.

Somit sind die Monome über  $\mathbb{C}$  linear unabhängig.

*g. e. d.*

**Bemerkung 1.1.23.** Der Satz impliziert additive Faltungsformeln für die multiplikativen Funktionen  $\sigma_{k-1}(n)$  (weiterhin  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k \geq 4$  gerade). „Multiplikativ“ bedeutet hier

$$\text{ggT}(m, n) = 1 \implies \sigma_{k-1}(m \cdot n) = \sigma_{k-1}(m) \cdot \sigma_{k-1}(n).$$

**Beispiel 1.1.24.**  $E_8 = E_4^2$ , ferner  $E_4 = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n$ , also  $\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(n-m) \sigma_3(m)$ .

Allgemeiner kann man  $E_k$  ausdrücken als Linearkombination von Monomen der Form  $E_4^\alpha E_6^\beta$  und erhält hieraus Formeln für  $\sigma_{k-1}(n)$ .

## 1.2. Die Modulinvariante $j$

**Definition 1.2.1.** Sei  $j := \frac{E_4^3}{\Delta}$ .

## 1.2. Die Modulinvariante $j$

---

### Satz 1.2.2.

- (i)  $j$  ist holomorph auf  $\mathbb{H}$  und hat einen einfachen Pol in  $\infty$ .
- (ii)  $j$  ist eine Modulfunktion vom Gewicht 0.
- (iii)  $j$  liefert eine Bijektion  $\Gamma(1) \backslash \mathbb{H} \cong \mathbb{C}$ .

### Beweis.

- (i) Da  $\Delta(z) \neq 0$  für alle  $z \in \mathbb{H}$ , ist  $j(z)$  holomorph auf  $\mathbb{H}$ . Ferner gilt

$$\text{ord}_\infty j = \text{ord}_\infty E_4^3 - \text{ord}_\infty \Delta = 0 - 1 = -1.$$

- (ii) Da  $E_4^3, \Delta \in M_{12}$  folgt die Aussage.
- (iii) Sei  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Dann ist zu zeigen, dass die Modulfunktion  $j_\lambda := j - \lambda$  vom Gewicht Null eine modulo  $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$  eindeutig bestimmte Nullstelle hat. Man wendet auf  $j_\lambda$  die Valenzformel an! Es gilt  $\text{ord}_z j_\lambda \geq 0$  für alle  $z \in \mathbb{H}$  und  $\text{ord}_\infty j_\lambda = -1$ . Da  $k = 0$  folgt mit der Valenzformel

$$-1 + n + \frac{n'}{2} + \frac{n''}{3} = 0$$

mit  $n, n', n'' \in \mathbb{N}_0$ . Also

$$n + \frac{n'}{2} + \frac{n''}{3} = 1 \tag{1.1}$$

Man prüft nach: die einzigen Lösungen  $(n, n', n'') \in \mathbb{N}_0^3$  von (1.1) sind  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$  und  $(0, 0, 3)$ . Dies impliziert die Behauptung. *g.e.d.*

**Satz 1.2.3.** Sei  $f: \mathbb{H} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  eine meromorphe Funktion. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $f$  ist eine Modulfunktion vom Gewicht 0.
- (ii)  $f$  ist Quotient zweier Modulformen gleichen Gewichts.
- (iii)  $f$  ist eine rationale Funktion in  $j$ .

### Beweis.

- (iii)  $\Rightarrow$  (ii) Sei  $f = \frac{P(j)}{Q(j)}$  wobei  $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_m X^m$  mit  $a_\nu \in \mathbb{C}$ ,  $a_m \neq 0$  und  $Q(X) = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n$  mit  $b_\nu \in \mathbb{C}$ ,  $b_n \neq 0$  mit  $Q \not\equiv 0$ , insbesondere also auch  $Q(j) \not\equiv 0$ . Wegen  $j = \frac{E_4^3}{\Delta}$  folgt

$$f = \frac{a_0 + a_1 \frac{E_4^3}{\Delta} + \dots + a_m \left(\frac{E_4^3}{\Delta}\right)^m}{b_0 + b_1 \frac{E_4^3}{\Delta} + \dots + b_n \left(\frac{E_4^3}{\Delta}\right)^n}$$



$$= \frac{(a_0 \Delta^m + a_1 E_4^3 \Delta^{m-1} + \dots + a_m (E_4^3)^m) \cdot \Delta^n}{(b_0 \Delta^n + b_1 E_4^3 \Delta^{n-1} + \dots + b_n (E_4^3)^n) \cdot \Delta^m}.$$

Hier sind Zähler und Nenner Modulformen vom Gewicht  $12(m+n)$ . Also folgt die Behauptung.

(ii)  $\Rightarrow$  (i) klar

(i)  $\Rightarrow$  (iii) Sei  $f$  eine Modulfunktion vom Gewicht Null und  $f \neq 0$ . Seien  $z_1, \dots, z_r$  die modulo  $\Gamma(1)$  verschiedenen Polstellen von  $f$  und  $m_1, \dots, m_r$  deren Ordnungen. Sei

$$P(z) := \prod_{\nu=1}^r (j(z) - j(z_\nu))^{m_\nu}.$$

Dann gilt

$$\text{ord}_{z_\nu} P = \text{ord}_{z_\nu} (j(z) - j(z_\nu))^{m_\nu} = m_\nu \text{ord}_{z_\nu} (j(z) - j(z_\nu)) \geq m_\nu.$$

Dann ist  $P(z)f(z)$  eine Modulfunktion vom Gewicht Null und holomorph auf  $\mathbb{H}$ . Da  $P(z)$  ein Polynom in  $j$  ist, genügt es die Behauptung für  $P(z)f(z)$  zu zeigen. Insbesondere kann man voraussetzen, dass  $f$  holomorph auf  $\mathbb{H}$  ist. Da  $\text{ord}_\infty \Delta = 1$ , gibt es  $n \in \mathbb{N}_0$  so dass  $g := \Delta^n f$  in unendlich holomorph ist. Dann ist  $f = \frac{g}{\Delta^n}$  und  $g$  ist eine Modulform vom Gewicht  $12n$ . Nach Satz 1.1.22 ist  $g$  eine Linearkombination von Monomen  $E_4^\alpha E_6^\beta$  mit  $4\alpha + 6\beta = 12n$ . Es genügt somit die Behauptung für  $\frac{E_4^\alpha E_6^\beta}{\Delta^n}$  zu zeigen. Insbesondere gilt  $3|\alpha$  und  $2|\beta$ , schreibe  $\alpha = 3p$  und  $\beta = 2q$ . Dann gilt

$$\frac{E_4^\alpha E_6^\beta}{\Delta^n} = \frac{(E_4^3)^p (E_6^2)^q}{\Delta^{p+q}} = j^p (j - 1728)^q,$$

$$\text{denn } j - 1728 = j - \frac{E_4^3 - E_6^2}{\Delta} = \frac{E_4^3}{\Delta} - \frac{E_4^3 - E_6^2}{\Delta} = \frac{E_6^2}{\Delta}. \quad \text{g.e.d.}$$

#### Bemerkung 1.2.4.

(i) Der Quotient  $\Gamma(1) \backslash \mathbb{H}$  besitzt in natürlicher Weise die Struktur einer Riemannschen Fläche isomorph zu  $S^2 \setminus \{\text{Punkt}\}$  indem man die Ränder in  $\overline{\mathcal{F}_1}$  identifiziert. Fügt man den Punkt  $\infty$  hinzu, so erhält man  $\overline{\Gamma(1) \backslash \mathbb{H}} := \Gamma(1) \backslash \mathbb{H} \cup \{\infty\} \cong S^2$  (die Sphäre in  $\mathbb{R}^3$ ). Satz 1.2.2 (iii) besagt dann, dass  $j$  ein Isomorphismus von  $\overline{\Gamma(1) \backslash \mathbb{H}} \cong S^2 \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \infty$  ist. Satz 1.2.3 entspricht dann der Tatsache, dass die einzigen meromorphen Funktionen auf  $S^2$  die rationalen Funktionen sind.

(ii) Man kann zeigen (schwer!)

$$\Delta(z) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}.$$

## 1.2. Die Modulnvariante $j$

---

Damit folgt

$$\begin{aligned}
 j &= \frac{E_4^3}{\Delta} = \frac{1}{q} \left( 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n \right)^3 \frac{1}{\prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}} \\
 &= \frac{1}{q} \left( 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n \right)^3 \prod_{n \geq 1} \left( \sum_{m \geq 0} q^{mn} \right)^{24} \\
 &= \frac{1}{q} + 744 + \sum_{n \geq 1} c(n) q^n \quad \text{mit } c(n) \in \mathbb{N}.
 \end{aligned}$$

Also hat die  $j$ -Funktion eine Fourierentwicklung in  $q$ , wobei die Koeffizienten positive ganzen Zahlen sind.

- (iii) Man zeigt leicht:  $\frac{1}{\prod_{n \geq 1} (1 - q^n)} = 1 + \sum_{n \geq 1} p(n) q^n$  wobei  $p(n)$  die Anzahl der Partionen von  $n$  ist, d. h. die Anzahl der Zerlegungen von  $n$  als Summe positiver, ganzer Zahlen (Beispielsweise  $p(4) = 5$ , denn  $4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$ ). Man sagt: die erzeugende Reihe von  $p(n)$  wird durch  $\frac{1}{\prod_{m \geq 1} (1 - q^m)}$  gegeben.

Beachte  $1 + \sum_{n \geq 1} p(n) q^n = \frac{e^{\pi i \frac{z}{12}}}{\eta(z)}$  wobei  $\eta(z) = e^{\pi i \frac{z}{12}} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$  die sogenannte DEDEKINDISCHE  $\eta$ -FUNKTION ist. Beachte  $\eta^{24} = \Delta$ .  $\eta$  sollte also eine Modulform vom Gewicht  $\frac{1}{2}$  sein. Mit Hilfe der Theorie der Modulformen kann man zeigen  $p(n) \sim \frac{1}{4\sqrt{3}n} \cdot e^{\pi \sqrt{\frac{3}{2}n}}$  für  $n \rightarrow \infty$  (hier  $a(n) \sim b(n)$  genau dann, wenn  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(n)}{b(n)} = 1$ ).

## 2. Heckeoperatoren

### 2.1. Vorbemerkung, Motivation

**Definition 2.1.1.** Definiere die Gruppe

$$\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid ad - bc > 0 \right\},$$

welche  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$  als Untergruppe enthält.

**Definition 2.1.2.**

(i) Seien  $z \in \mathbb{H}$  und

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}),$$

dann setze

$$M \circ z := \frac{az + b}{cz + d}.$$

(ii) Für  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $M \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$  und  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  setze

$$(f|_k M)(z) := (ad - bc)^{\frac{k}{2}} (cz + d)^{-k} f(M \circ z).$$

Diese Definitionen verallgemeinern die früheren Definitionen für  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$  (siehe 1.1.1). Beachte, dass weiterhin für alle  $\lambda \in \mathbb{R}_+$  gilt:

$$f|_k \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = f.$$

**Lemma 2.1.3.**

(i) Die Abbildung  $(M, z) \mapsto M \circ z$  definiert eine Operation von  $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$  auf  $\mathbb{H}$ .

## 2.1. Vorbemerkung, Motivation

---

(ii) Man hat  $f|_k M_1 M_2 = (f|_k M_1)|_k M_2$ .

**Beweis.**

(i) Rechne nach und beachte hierbei, dass  $\operatorname{Im} \left( \frac{az+b}{cz+d} \right) = (ad-bc) \frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$ .

(ii) Für  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \operatorname{GL}_2^+(\mathbb{R})$  setze  $j(M, z) := cz + d$ . Dann gilt für beliebige Matrizen  $M_1, M_2 \in \operatorname{GL}_2^+(\mathbb{R})$ , dass

$$j(M_1 M_2, z) = j(M_1, M_2 \circ z) \cdot j(M_2, z),$$

woraus wegen  $(cz + d)^{-k} = j(M, z)^{-k}$  die Behauptung folgt.

*g.e.s.*

*Ziel:* Definition gewisser linearer Operatoren  $T: M_k \rightarrow M_k$  auf den Vektorräumen  $M_k$  (Modulformen vom Gewicht  $k \in \mathbb{Z}$ ) durch geeignete Mittelbildung.

*Idee:* Sei  $\mathcal{M} \subseteq \operatorname{GL}_2^+(\mathbb{R})$  eine Teilmenge mit folgenden Eigenschaften (mit  $\cdot$  die gewöhnliche Matrizenmultiplikation):

- (i)  $\Gamma(1) \cdot \mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$
- (ii)  $\mathcal{M} \cdot \Gamma(1) \subseteq \mathcal{M}$
- (iii)  $\mathcal{M}$  zerfällt in endlich viele disjunkte Rechtsnebenklassen, d.h.

$$\mathcal{M} = \dot{\bigcup}_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} \Gamma(1) \cdot M,$$

wobei die Vereinigung disjunkt und endlich ist.

Für eine Modulform  $f \in M_k$  setze dann

$$f|T_{\mathcal{M}} := \sum_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} f|_k M.$$

Dann ist  $f|T_{\mathcal{M}}$  wohldefiniert, denn jede Rechtsnebenklasse  $\Gamma(1) \cdot M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}$  besteht aus Vertretern der Form  $NM$  mit  $N \in \Gamma(1)$  und es gilt

$$f|_k NM = (f|_k N)|_k M = f|_k M$$

wegen Lemma 2.1.3, ii) und  $f|_k N = f$  für beliebiges  $N \in \Gamma(1)$ , da  $f \in M_k$ .

*Ferner:* Sei eine Matrix  $N \in \Gamma(1)$  gegeben. Dann ist

$$(f|T_{\mathcal{M}})|_k N = \sum_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} f|_k MN = \sum_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} f|_k M = f|T_{\mathcal{M}},$$

denn mit  $M$  durchläuft auch  $MN$  ein Vertretersystem der Rechtsnebenklassen. (Begründung: Sind zwei Matrizen  $M_1, M_2 \in \mathcal{M}$  nicht äquivalent unter Linksmultiplikation mit  $\Gamma(1)$ , so gilt dies trivialerweise auch für  $M_1N, M_2N$ . Auch ist

$$\mathcal{M}N = \left( \bigcup_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} \Gamma(1) \cdot M \right) N = \bigcup_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}} \Gamma(1) \cdot MN = \mathcal{M},$$

denn nach Voraussetzung gilt sowohl  $\mathcal{M}N \subseteq \mathcal{M}$  als auch  $\mathcal{M} = \mathcal{M}N^{-1}N \subseteq \mathcal{M}N$ .)

*Folgerung:*  $f|T_{\mathcal{M}}$  hat das Transformationsverhalten einer Modulform vom Gewicht  $k$ .

## 2.2. Die Heckeoperatoren $T(n)$

**Definition 2.2.1.** Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Setze

$$\mathcal{M}(n) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \mid ad - bc = n \right\}.$$

*Beobachtung:*  $\mathcal{M}(n)$  ist invariant unter Links- und Rechtsmultiplikation von  $\Gamma(1)$ .

**Lemma 2.2.2.**

$$\mathcal{M}(n) = \bigcup_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b(\bmod d)}} \Gamma(1) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix},$$

wobei die Vereinigung über alle Matrizen  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$  geht, derart dass  $a, b, d \in \mathbb{Z}$ ,  $ad = n$ ,  $d > 0$ , und  $b$  ein volles Restsystem modulo  $d$  durchläuft (also z.B.  $b \in \{1, 2, \dots, d\}$ ).

**Beweis.** Die Inklusion  $\supseteq$  ist klar, zeige also noch  $\subseteq$ . Sei dazu  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(n)$ . Da  $ad - bc = n > 0$ , können  $a$  und  $c$  nicht gleichzeitig Null sein. Deswegen existiert  $t := \text{ggT}(a, c) \in \mathbb{N}$ . Also sind  $-\frac{c}{t}$  und  $\frac{a}{t}$  teilerfremd und es existieren  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$  mit

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\frac{c}{t} & \frac{a}{t} \end{pmatrix} \in \Gamma(1).$$

Dann ist

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\frac{c}{t} & \frac{a}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}.$$

## 2.2. Die Heckeoperatoren $T(n)$

---

Man kann also voraussetzen, dass  $c = 0$ . Wegen  $\det M = n$  gilt dann  $ad = n$ . Multipliziert man gegebenenfalls mit  $-E$ , so kann man annehmen, dass  $d > 0$ . Schließlich multipliziere für  $\nu \in \mathbb{Z}$  mit

$$\begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma(1) \implies \begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b + \nu d \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

Durch geeignete Wahl von  $\nu \in \mathbb{Z}$  kann man erreichen, dass  $b + \nu d$  in einem vorgegebenen Restsystem modulo  $d$  liegt. Damit ist die Inklusion  $\subseteq$  gezeigt.

Noch zu zeigen ist, dass die Vereinigung disjunkt ist (die Endlichkeit ist nach Konstruktion klar). Angenommen, für zwei Matrizen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$$

(mit  $ad = n = a'd'$ ,  $d > 0$ ,  $d' > 0$  und  $b, b'$  Vertreter zweier Restklassen modulo  $d$  bzw.  $d'$ ) existiere ein  $N \in \Gamma(1)$ , sodass

$$N \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}.$$

Dann folgt, dass die untere linke Komponente von  $N$  Null ist,  $N \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  also die Gestalt

$$N = \begin{pmatrix} \pm 1 & \nu \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

mit  $\nu \in \mathbb{Z}$  hat. Damit ist

$$N \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 1 & \nu \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm a & \pm b + \nu d \\ 0 & \pm d \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}.$$

Es folgt  $d' = \pm d$  und da  $d, d' > 0$  nach Voraussetzung bereits  $d = d'$ . Die Diagonalelemente von  $N$  sind also beide  $+1$  und es folgt  $b' = b + \nu d$ . Wegen  $d = d'$  stammen  $b, b'$  beide aus dem gleichen Restsystem modulo  $d$ . Da sie sich nur um ein Vielfaches von  $d$  unterscheiden, folgt

$$\begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

*g.e.d.*

**Definition 2.2.3.** Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Man setze dann für  $f \in M_k$

$$f|T(n) := n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}(n)} f|_k M.$$

**Satz 2.2.4.**

- (i) Durch  $T(n)$  wird eine lineare Abbildung  $M_k \rightarrow M_k$  definiert. Diese lässt  $S_k$  invariant (gemeint ist: Spitzenformen werden auf Spitzenformen geschickt). Man nennt  $T(n)$  den  $n$ -ten HECKE-OPERATOR.
- (ii) Ist  $f = \sum_{m \geq 0} a(m)q^m \in M_k$ , so gilt

$$f|T(n) = n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{m \geq 0} \left( \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) \right) q^m.$$

*Beachte:* Der konstante Term von  $f|T(n)$  ist gleich

$$n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{d|n} d^{k-1} a(0) = n^{\frac{k}{2}-1} \sigma_{k-1}(n) a(0)$$

**Beispiel 2.2.5.** Sei  $n = p$  prim. Dann ist

$$\begin{aligned} f|T(p) &= p^{\frac{k}{2}-1} \sum_{m \geq 0} \left( \sum_{d|(m,p)} d^{k-1} a\left(\frac{mp}{d^2}\right) \right) q^m \\ &= p^{\frac{k}{2}-1} \sum_{m \geq 0} \left( a(mp) + p^{k-1} a\left(\frac{m}{p}\right) \right) q^m, \end{aligned}$$

wobei  $a\left(\frac{m}{p}\right) := 0$  für  $p \nmid m$ , denn

$$\sum_{d|(m,p)} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) = a(mp) + \begin{cases} 0 & \text{falls } p \nmid m \\ p^{k-1} a\left(\frac{m}{p}\right) & \text{falls } p | m \end{cases}$$

**Beweis.**

- (i) Nach den Überlegungen in [Abschnitt 2.1](#) wissen wir, dass  $f|T(n)$  das Transformationsverhalten einer Modulform vom Gewicht  $k$  besitzt. Auch ist  $f|T(n)$  als Summe holomorpher Funktionen selbst holomorph auf  $\mathbb{H}$ . Zu zeigen verbleibt noch, dass  $f|T(n)$  holomorph in  $\infty$  ist und den Raum  $S_k$  invariant lässt. Beides folgt direkt aus Teil ii) des Satzes.
- (ii) Benutze [Lemma 2.2.2](#), damit folgt

$$f|T(n) = n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b \bmod d}} f|_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

## 2.2. Die Heckeoperatoren $T(n)$

---

$$\begin{aligned}
&= n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b \bmod d}} n^{\frac{k}{2}} d^{-k} f\left(\frac{az+b}{d}\right) \\
&= n^{k-1} \sum_{\substack{m>0 \\ ad=n, d>0 \\ b \bmod d}} d^{-k} a(m) e^{2\pi i m \frac{az+b}{d}} \\
&= n^{k-1} \sum_{\substack{m>0 \\ d|n, d>0}} d^{-k} a(m) e^{2\pi i m \frac{n}{d^2} z} \left( \sum_{b \bmod d} e^{2\pi i m \frac{b}{d}} \right).
\end{aligned}$$

Es gilt

$$\sum_{b \bmod d} e^{2\pi i m \frac{b}{d}} = \begin{cases} 0 & \text{falls } d \nmid m \\ d & \text{falls } d|m \end{cases}$$

Allgemein  $1 + q + \dots + q^{N-1} = \frac{q^N - 1}{q - 1} = 0$ , falls  $q \neq 1$  und  $q^N = 1$ , wende dies an mit  $q = e^{2\pi i \frac{m}{d}}$ ,  $N = d$ . Damit erhalten wir, wobei zu beachten ist, dass die Vertauschung wegen absoluter Konvergenz gerechtfertigt sind

$$\begin{aligned}
f|T(n) &= n^{k-1} \sum_{\substack{m \geq 0 \\ m \equiv 0 \bmod d \\ d|n, d>0}} d^{-k+1} a(m) e^{2\pi i \frac{mn}{d^2} z} && (m \mapsto md) \\
&= \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d|n, d>0}} \left(\frac{n}{d}\right)^{k-1} a(md) e^{2\pi i \frac{mn}{d} z} && \left(d \mapsto \frac{n}{d}\right) \\
&= \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d|n, d>0}} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d}\right) e^{2\pi i m d z} && (md \mapsto m) \\
&= \sum_{\substack{m \geq 0 \\ m \equiv 0 \bmod d \\ d|n, d>0}} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) e^{2\pi i m z} \\
&= \sum_{m \geq 0} \left( \sum_{d|m, d|n} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) \right) q^m.
\end{aligned}$$

*g.e.d.*



**Satz 2.2.6.** Für alle  $m, n \in \mathbb{N}$  gilt

$$T(m)T(n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T\left(\frac{mn}{d^2}\right)$$

Speziell gilt (vergleiche mit Ramanujan- $\tau$ -Funktion):

- (i)  $T(n)T(m) = T(mn)$  falls  $\text{ggT}(m, n) = 1$
- (ii)  $T(p)T(p^\nu) = T(p^{\nu+1}) + p^{k-1}T(p^{\nu-1})$  für  $p$  prim und  $\nu \geq 1$ .

Beachte dass (ii) äquivalent ist zur Identität

$$\frac{1}{1 - T(p)X + p^{k-1}X^2} = \sum_{\nu \geq 0} T(p^\nu)X^\nu$$

**Beweis.** in mehreren Schritten: 1. Schritt: Beweis von (i): Seien  $m, n$  teilerfremd. Benutze **Lemma 2.2.2**, dann gilt

$$\begin{aligned} f|T(m)T(n) &= (mn)^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{ad=m \\ d>0, b \bmod d}} \left( \sum_{\substack{a'd'=n \\ d'>0, b' \bmod d'}} f|_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix} \right) \\ &= (mn)^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{ad=m \\ d>0, b \bmod d}} \left( \sum_{\substack{a'd'=n \\ d'>0, b' \bmod d'}} f|_k \begin{pmatrix} aa' & ab'+bd' \\ 0 & dd' \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

Durchläuft  $d$  alle positiven Teiler von  $m$  und  $d'$  alle positiven Teiler von  $n$ , so durchläuft  $D := dd'$  alle positiven Teiler von  $mn$ , denn  $\text{ggT}(m, n) = 1$ . Setzt man  $A := aa'$ , so gilt dann  $AD = mn$ . Ferner gilt: Durchläuft  $b$  ein volles Restsystem mod  $d$  und  $b'$  ein solches mod  $d'$ , so durchläuft  $B = ab + b'd'$  ein volles Restsystem mod  $dd'$ , denn in der Tat genügt es zu zeigen, dass diese Zahlen inkongruent mod  $dd'$  sind, denn dann sind dies genau  $dd'$  paarweise inkongruente Zahlen. Angenommen

$$ab'_1 + b_1d' \equiv ab'_2 + b_2d' \pmod{dd'},$$

dann gilt

$$a(b'_1 - b'_2) \equiv d(b_2 - b_1) \pmod{dd'}.$$

Dies impliziert  $a(b'_1 - b'_2) \equiv 0 \pmod{d'}$ . Aber  $\text{ggT}(a, d') = 1$ , denn  $a|m$  und  $d'|n$  und  $\text{ggT}(m, n) = 1$  nach Voraussetzung. Also folgt  $b'_1 \equiv b'_2 \pmod{d'}$ , also  $b'_1 = b'_2$ . Es folgt jetzt  $b_2 \equiv b_1 \pmod{d}$ , also  $b_2 = b_1$ . Also folgt die Behauptung. Und damit

$$f|T(m)T(n) = (mn)^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{AD=mn \\ D>0, B \bmod D}} f|_k \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = f|_k T(mn).$$

## 2.2. Die Heckeoperatoren $T(n)$

---

2. Schritt: Beweis von (ii): Es gilt nach **Lemma 2.2.2**:

$$f|T(p) = p^{\frac{k}{2}-1} \left( f|_k \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{\mu \bmod p} f|_k \begin{pmatrix} 1 & \mu \\ 0 & p \end{pmatrix} \right)$$

und

$$f|T(p^\nu) = (p^\nu)^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu-\beta} & b \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix}.$$

Dann

$$\begin{aligned} f|T(p)T(p^\nu) &= (p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}-1} \left( \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^{\nu-\beta} & b \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix} + \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta \\ \mu \bmod p}} f|_k \begin{pmatrix} 1 & \mu \\ 0 & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^{\nu-\beta} & b \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix} \right) \\ &= (p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}-1} \left( \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu+1-\beta} & pb \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix} + \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta \\ \mu \bmod p}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu-\beta} & b+\mu p^\beta \\ 0 & p^{\beta+1} \end{pmatrix} \right) \quad (2.1) \end{aligned}$$

Betrachte 2. Summe in (2.1): Durchläuft  $b$  ein Restsystem modulo  $p^\beta$  und  $\mu$  ein Restsystem modulo  $p$ , so durchläuft  $b + \mu p^\beta$  ein solches modulo  $p^{\beta+1}$  (denn insgesamt  $p^{\beta+1}$  Zahlen, paarweise inkongruent modulo  $p^{\beta+1}$ ). Man sieht daher, dass die 2. Summe gleich

$$f|T(p^{\nu+1}) - (p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu+1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ist.

Betrachte 1. Summe in (2.1). Diese ist gleich

$$(p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}-1} \left( f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu+1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{\substack{1 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu+1-\beta} & pb \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix} \right).$$

Man erhält also

$$f|_k T(p)T(p^\nu) = f|T(p^{\nu+1}) + \underbrace{(p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{1 \leq \beta \leq \nu \\ b \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} |_k \begin{pmatrix} p^{\nu-\beta} & b \\ 0 & p^{\beta-1} \end{pmatrix}}_{=:R}$$

In  $R$  ersetze  $\beta$  durch  $\beta + 1$ , erhalte

$$R = \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu-1 \\ b \bmod p^{\beta+1}}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu-1-\beta} & b \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix},$$

Man setze  $b = \tilde{b} + \mu p^\beta$  wobei  $\mu$  modulo  $p$  und  $\tilde{b}$  modulo  $p^\beta$  läuft

$$R = \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu-1 \\ \tilde{b} \bmod p^\beta \\ \mu \bmod p}} f|_k \begin{pmatrix} 1 & \mu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} |_k \begin{pmatrix} p^{\nu-1-\beta} & \tilde{b} \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix}$$

da  $f$  Periode 1 hat, erhält man

$$(p^{\nu+1})^{\frac{k}{2}-1} R = p^{k-1} (p^{\nu-1})^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{0 \leq \beta \leq \nu-1 \\ \tilde{b} \bmod p^\beta}} f|_k \begin{pmatrix} p^{\nu-1-\beta} & \tilde{b} \\ 0 & p^\beta \end{pmatrix} = p^{k-1} f|_k T(p^{\nu-1})$$

3. Schritt: zeige durch Induktion nach  $s \in \mathbb{N}$  (Übungsaufgabe), dass

$$T(p^\nu)T(p^s) = \sum_{\alpha=0}^{\min\{\nu, s\}} (p^\alpha)^{k-1} T(p^{\nu+s-2\alpha}),$$

was sich mit Teilern der Form  $d = p^\alpha$  umschreiben lässt zu

$$T(p^\nu)T(p^s) = \sum_{d|(p^\nu, p^s)} d^{k-1} T\left(\frac{p^{\nu+s}}{d^2}\right).$$

4. Schritt: der allgemeine Fall! Induktion über die verschiedenen Primteiler von  $m$ . Sei  $m = p^r m'$ ,  $n = p^s n'$  mit  $p \nmid m'$ ,  $p \nmid n'$ . Dann folgt mit i), dass

$$\begin{aligned} T(m)T(n) &= T(m'p^r)T(n'p^s) = T(m')T(p^r)T(n')T(p^s) \\ &= T(m')T(n')T(p^r)T(p^s). \end{aligned}$$

Wendet man dieses Argument nun induktiv auf  $T(m')T(n')$  und weitere gemeinsame Primteiler an, so kann man davon ausgehen, dass  $m', n'$  nach endlich vielen Iterationen teilerfremd sind. Dann kann man mit i) und Schritt 3 schreiben

$$T(m)T(n) = \left( \sum_{d|(m', n')} d^{k-1} T\left(\frac{m'n'}{d^2}\right) \right) \left( \sum_{t|(p^r, p^s)} t^{k-1} T\left(\frac{p^r p^s}{t^2}\right) \right),$$

was sich nach erneuter Anwendung von i) vereinfacht zu

$$T(m)T(n) = \sum_{\substack{d|(m', n') \\ t|(p^r, p^s)}} (dt)^{k-1} T\left(\frac{p^r m' p^s n'}{(dt)^2}\right)$$

und mit  $D = dt$  schließlich zu

$$T(m)T(n) = \sum_{D|(m, n)} D^{k-1} T\left(\frac{mn}{D^2}\right).$$

*q.e.d.*

## 2.3. Folgerungen

**Satz 2.3.1.** Die Hecke-Operatoren  $T(n)$  für  $n \in \mathbb{N}$  erzeugen eine kommutative  $\mathbb{C}$ -Algebra von Endomorphismen von  $M_k$ , welche  $S_k$  stabil lässt. Die Algebra wird sogar bereits von den Hecke-Operatoren  $T(p)$  für  $p$  prim erzeugt.

**Beweis.** Die Kommutativität folgt direkt aus [Satz 2.2.6](#). Wir zeigen noch, dass für beliebiges  $n \in \mathbb{N}$  der Hecke-Operator  $T(n)$  durch Hecke-Operatoren der Form  $T(p)$  mit  $p$  prim darstellbar ist. Sei dazu  $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$  die Primzahlzerlegung von  $n$ , dann ist nach [Satz 2.2.6](#), i)

$$T(n) = \prod_{i=1}^r T(p_i^{\alpha_i}).$$

Ferner gilt nach [Satz 2.2.6](#), ii)

$$T(p)T(p^\nu) = T(p^{\nu+1}) + p^{k-1}T(p^{k-1}),$$

also lässt sich beispielsweise durch Wahl von  $\nu = 1$  und Umstellen der Gleichung der Hecke-Operator  $T(p^2)$  als Funktion von  $T(p^1) = T(p)$  und  $T(p^0) = T(1) = \text{id}_{M_k}$  ausdrücken. Induktiv gilt dies für alle Hecke-Operatoren der Form  $T(p_i^{\alpha_i})$ , sodass sich  $T(n)$  bereits als Funktion der  $T(p_i)$  darstellen lässt. Damit erzeugen die Hecke-Operatoren  $T(p)$  mit  $p$  prim bereits die gesamte Algebra. *q.e.d.*

**Definition 2.3.2.** Sei  $f \in M_k$  mit  $k > 0$ . Dann heißt  $f$  HECKE-EIGENFORM, falls gilt

- (i)  $f \neq 0$ ,
- (ii)  $f|T(n) = \lambda(n)f$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , wobei  $\lambda(n) \in \mathbb{C}$ .

**Satz 2.3.3.** Sei  $f = \sum_{m \geq 0} a(m)q^m \in M_k$  eine Hecke-Eigenform mit  $f|T(n) = \lambda(n)f$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , dann gilt

- (i)  $a(n) = \lambda(n) \cdot a(1)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ ,
- (ii)  $a(1) \neq 0$ ,
- (iii)

$$\lambda(m)\lambda(n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} \lambda\left(\frac{mn}{d^2}\right)$$

für alle  $m, n \in \mathbb{N}$ . Speziell ist für  $(m, n) = 1$

$$\lambda(m)\lambda(n) = \lambda(mn)$$

sowie für  $\nu \geq 1$  und  $p$  prim

$$\lambda(p)\lambda(p^\nu) = \lambda(p^{\nu+1}) + p^{k-1}\lambda(p^{\nu-1}).$$

**Beweis.**

(i) Nach Satz 2.2.4, ii) gilt

$$\lambda(n)f = f|T(n) = \sum_{m \geq 0} \left( \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) \right) q^m.$$

Koeffizientenvergleich bei  $q^1$  liefert sofort  $\lambda(n) \cdot a(1) = a(n)$ .

(ii) Angenommen,  $a(1) = 0$ . Dann ist nach i) auch  $a(n) = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Somit ist  $f = a(0)$  konstant und daher in  $M_0$ . Da für eine Hecke-Eigenform  $f \in M_k$  nach Definition  $k > 0$  gefordert wird, folgt aus  $f \in M_0 \cap M_k$  bereits  $f \equiv 0$ , was im Widerspruch zur Definition der Hecke-Eigenformen steht.

(iii) Folgt aus Satz 2.2.6 und wegen  $f \neq 0$ . Genauer gilt

$$f|T(m)T(n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} f|T\left(\frac{mn}{d^2}\right) \implies \lambda(m)\lambda(n) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} \lambda\left(\frac{mn}{d^2}\right).$$

*q.e.d.*

**Definition 2.3.4.** Man nennt  $f = \sum_{m \geq 0} a(m)q^m$  eine normalisierte Hecke-Eigenform, falls  $a(1) = 1$ .

**Bemerkung 2.3.5.** Durch Division durch  $a(1) \neq 0$  lässt sich jede Hecke-Eigenform normalisieren. Beachte jedoch, dass zum Beispiel die „normalisierten Eisensteinreihen“  $E_k$  zwar Hecke-Eigenformen, aber keine normalisierten Hecke-Eigenformen sind. Die beiden Normalisierungsbegriffe unterscheiden sich also.

*Frage:* Gibt es immer Hecke-Eigenformen? Gibt es vielleicht sogar eine Basis von Hecke-Eigenformen?

**Bemerkung 2.3.6.**

(i) Man zeigt „leicht“, dass die Eisensteinreihe

$$E_k = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n)q^n \quad \text{mit } \sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$$

### 2.3. Folgerungen

---

eine Hecke-Eigenform ist mit  $E_k|T(n) = \sigma_{k-1}(n)E_k$  für alle  $n \geq 1$ .

In der Tat: Der konstante Term von  $E_k|T(n)$  ist gleich  $\sigma_{k-1}(n)$ , siehe 2.2.4. Die höheren Terme ergeben sich nach demselben Satz als

$$-\frac{2k}{B_k} \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} \sigma_{k-1}\left(\frac{mn}{d^2}\right) = -\frac{2k}{B_k} \sigma_{k-1}(m) \sigma_{k-1}(n)$$

wegen

$$\sum_{d|(m,n)} d^\alpha \sigma_\alpha\left(\frac{mn}{d^2}\right) = \sigma_\alpha(m) \sigma_\alpha(n).$$

für beliebiges  $\alpha \in \mathbb{N}$ . Diese Identität lässt sich leicht induktiv zeigen (Übungsaufgabe), besitzt jedoch nur für  $\alpha = k - 1$  im Kontext der Modulformen eine sinnvolle Interpretation.

- (ii) Es ist  $S_{12} = \mathbb{C}\Delta$ , wobei  $\Delta = \frac{1}{1728}(E_4^3 - E_6^2) = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n$  mit  $\tau(n) \in \mathbb{Z}$  und  $\tau(1) = 1$ . Daher ist  $\Delta$  eine normalisierte Hecke-Eigenform in  $S_{12}$ . Insbesondere ist

$$\tau(m)\tau(n) = \sum_{d|(m,n)} d^{11} \tau\left(\frac{mn}{d^2}\right),$$

$$\tau(m)\tau(n) = \tau(mn) \quad \text{für } (m, n) = 1,$$

$$\tau(p)\tau(p^\nu) = \tau(p^{\nu+1}) + p^{11}\tau(p^{\nu-1}) \quad \text{für } p \text{ prim.}$$

- (iii) Man kann  $S_k$  mit einem Skalarprodukt versehen, derart dass die  $T(n)$  hermitesch bezüglich dieses Skalarproduktes sind. Dann folgt aus der Linearen Algebra bereits, dass die  $T(n)$  *simultan* diagonalisierbar sind. Dies garantiert die Existenz einer Basis von Hecke-Eigenformen.

# 3. Das Petersson'sche Skalarprodukt

## 3.1. Invariantes Maß und Skalarprodukt

*Ziel:* Definition eines „natürlichen“ Skalarprodukts auf  $S_k$ . Hierzu benötigt man zunächst ein  $\Gamma(1)$ -invariantes Maß auf  $\mathbb{R}^2$ .

**Definition 3.1.1.** Für  $z = x + iy \in \mathbb{H}$  setze man

$$d\omega(z) := \frac{dx \, dy}{y^2}$$

**Satz 3.1.2.** Die Differentialform  $dw = \frac{dy \, dy}{y^2}$  für  $z = x + iy \in \mathbb{H}$  ist  $SL_2(\mathbb{R})$ -invariant, d. h.  $dw(M \circ z) = dw$  für alle  $M \in SL_2(\mathbb{R})$ .

**Beweis.** Es gilt  $d\omega(z) = \frac{i}{2y^2} dz \, \overline{dz}$ , denn

$$\begin{aligned} dz \, \overline{dz} &= (dx + i \, dy)(dx - i \, dy) \\ &= dx \, dx - i \, dx \, dy + i \, dy \, dx + dy \, dy \\ &= 0 - i \, dx \, dy - i \, dx \, dy + 0 \\ &= -2i \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Sei nun  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$ , dann gilt unter Verwendung von

$$\frac{d(M \circ z)}{dz} = \frac{d \frac{az+b}{cz+d}}{dz} = \frac{a(cz+d) - (az+b)c}{(cz+d)^2} = \frac{1}{(cz+d)^2}$$

die Behauptung nach

$$\begin{aligned} d\omega(M \circ z) &= \frac{i}{2(\operatorname{Im}(M \circ z))^2} d(M \circ z) \, \overline{d(M \circ z)} \\ &= \frac{i}{2 \frac{y^2}{|cz+d|^4}} \frac{dz}{(cz+d)^2} \overline{\frac{dz}{(cz+d)^2}} \end{aligned}$$

### 3.1. Invariantes Maß und Skalarprodukt

---

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{2 \frac{y^2}{|cz+d|^4}} \frac{dz}{(cz+d)^2} \frac{\overline{dz}}{\overline{(cz+d)^2}} \\
&= \frac{i|cz+d|^4}{2y^2} \cdot \frac{1}{|cz+d|^4} \cdot dz \overline{dz} \\
&= \frac{i}{2y^2} dz \overline{dz} \\
&= d\omega(z).
\end{aligned}$$

*g.e.d.*

*Ansatz:*  $f, g \in S_k$ , setze:

$$\langle f, g \rangle := \int_{\mathcal{F}} y^k f(z) \overline{g(z)} d\omega$$

wobei  $\mathcal{F}$  ein Fundamentalbereich ist.

**Bemerkung 3.1.3.** Sei  $\eta = \frac{dz}{y}$ . Dann gilt  $d\eta = \frac{dx dy}{y^2}$ , denn

$$d\eta = d\left(\frac{dx}{y} + i \frac{dy}{y}\right) = -\frac{1}{y^2} dy dx + i\left(-\frac{1}{y^2}\right) dy dy = \frac{dx dy}{y^2}.$$

**Erinnerung.** Eine Teilmenge  $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{H}$  heißt Fundamentalbereich (für  $\Gamma(1)$ ), falls gilt

- (i)  $\mathcal{F}$  ist offen,
- (ii) für alle  $z \in \mathbb{H}$  existiert  $M \in \Gamma(1)$  mit  $M \circ z \in \overline{\mathcal{F}}$ ,
- (iii) sind  $z_1, z_2 \in \mathcal{F}$  und  $z_2 = M \circ z_1$  mit  $M \in \Gamma(1)$ , dann gilt  $M = \pm E$  und  $z_1 = z_2$ .

*Beobachtung:* Für  $A \subseteq \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$  ist der Rand  $\partial A$  abgeschlossen, daher meßbar. Wir werden oft fordern, dass  $\partial F$  eine Nullmenge ist.

**Beispiel 3.1.4.** Der Rand des Standardfundamentalbereich

$$\mathcal{F}_1 = \left\{ z = x + iy \in \mathbb{H} \mid |x| < \frac{1}{2}, |z| > 1 \right\}$$

ist eine Nullmenge.



**Satz 3.1.5.** Seien  $\mathcal{F}_1$  und  $\mathcal{F}_2$  Fundamentalbereiche derart, dass  $\partial F_1$  und  $\partial F_2$  Nullmengen sind. Sei  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  meßbar und  $\Gamma(1)$ -invariant, d. h.  $f(M \circ z) = f(z)$  für alle  $M \in \Gamma(1)$ . Ferner gelte

$$\int_{\mathcal{F}_1} |f| dw < \infty,$$

d. h. also dass  $|f|$  über  $\overline{\mathcal{F}_1}$  integrierbar ist, dies impliziert, dass  $f$  über  $\overline{\mathcal{F}_1}$  integrierbar ist.

Dann ist  $f$  auch über  $\overline{F_2}$  integrierbar und

$$\int_{\overline{\mathcal{F}_1}} f dw = \int_{\overline{\mathcal{F}_2}} f dw.$$

**Beweis.** Nach Eigenschaft (ii) eines Fundamentalbereichs gilt (mit  $\Gamma(1)' = \Gamma(1)/\pm E$ )

$$\mathbb{H} = \bigcup_{M \in \Gamma(1)'} M^{-1} \circ \overline{\mathcal{F}_1} = \bigcup_{M \in \Gamma(1)'} M \circ \overline{\mathcal{F}_2}.$$

Nach (iii) gilt  $M \circ \mathcal{F}_1 \cap N \circ \mathcal{F}_1 = \emptyset$  für  $M \neq \pm N$ . Wegen  $\overline{\mathcal{F}_1} = \mathcal{F}_1 \cup \partial \mathcal{F}_1$  und da  $\partial F_1$  eine Nullmenge, folgt, dass

$$M \circ \overline{\mathcal{F}_1} \cap N \circ \overline{\mathcal{F}_2} \text{ eine Nullmenge für } M \neq \pm N,$$

denn

$$\begin{aligned} M \circ \overline{\mathcal{F}_1} \cap N \circ \overline{\mathcal{F}_1} &= M \circ (\mathcal{F}_1 \cup \partial \mathcal{F}_1) \cap N \circ (\mathcal{F}_1 \cup \partial \mathcal{F}_1) \\ &= (M \circ \mathcal{F}_1 \cup M \circ (\partial \mathcal{F}_1)) \cap (N \circ \mathcal{F}_1 \cup N \circ (\partial \mathcal{F}_1)) \\ &= (M \circ \mathcal{F}_1 \cap N \circ \mathcal{F}_1) \cup (M \circ \mathcal{F}_1 \cap N \circ (\partial \mathcal{F}_1)) \cup \dots \end{aligned}$$

Es gilt

$$\int_{\overline{\mathcal{F}_1}} f dw = \int_{\bigcup_{M \in \Gamma(1)'} M \circ \overline{\mathcal{F}_2} \cap \overline{\mathcal{F}_1}} f dw,$$

wobei zu beachten ist, dass es sich um eine abzählbare Vereinigung von meßbaren Mengen handelt und die Durchschnitte haben Maß Null, also gilt die abzählbare Additivität des Integrals:

$$\int_{\overline{\mathcal{F}_1}} f dw = \sum_{M \in \Gamma(1)'} \int_{M \circ \overline{\mathcal{F}_2} \cap \overline{\mathcal{F}_1}} f dw = \sum_{M \in \Gamma(1)'} \int_{\overline{\mathcal{F}_2} \cap M^{-1} \overline{\mathcal{F}_1}} f(M \circ z) dw(M \circ z)$$

### 3.1. Invariantes Maß und Skalarprodukt

---

$$= \sum_{M \in \Gamma(1)'} \int_{\overline{F_2} \cap M^{-1} \circ \overline{F_1}} f \, dw = \dots = \int_{\overline{F_2}} f \, dw.$$

*g. e. d.*

**Beispiel 3.1.6.** Für jeden Fundamentalbereich  $\mathcal{F}$ , so dass  $\partial\mathcal{F}$  eine Nullmenge ist, gilt

$$\text{vol}(\Gamma(1) \backslash \mathbb{H}) = \int_{\overline{\mathcal{F}}} dw = \frac{\pi}{3} < \infty$$

**Beweis.** Es genügt nach [Satz 3.1.5](#) den Fall von  $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1$  zu betrachten wobei  $\mathcal{F}_1$  der Standard Fundamentalbereich ist (siehe [Beispiel 3.1.4](#)).

Es gilt für  $\mathcal{F}_c := \mathcal{F}_1 \cap \{z \in \mathbb{H} \mid y \leq c\}$

$$\int_{\overline{\mathcal{F}_1}} \frac{dx \, dy}{y^2} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{\overline{\mathcal{F}_c}} \frac{dx \, dy}{y^2} = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{\overline{\mathcal{F}_c}} d\eta = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{\partial\overline{\mathcal{F}_c}} \frac{dz}{y},$$

wobei die letzte Gleichheit wegen dem Satz von Stokes und [Bemerkung 3.1.3](#) folgt.

Das Integral über die Gerade  $z(t) = ic + t$  für  $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$  ergibt

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{c} \, dt = -\frac{1}{c} \xrightarrow{c \rightarrow \infty} 0.$$

Die Integrale über die beiden Geradenstücke heben sich auf, wegen entgegengesetzter Orientierung und da  $y$  invariant unter  $z \mapsto z + 1$ . Damit bleibt das Integral über den Kreisbogen, dieser wird parametrisiert durch

$$z(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t \quad \text{für} \quad \frac{2\pi}{3} \leq t \leq \frac{\pi}{3}.$$

Integral ist reellwertig und hat damit den Wert

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{i(\cos t + i \sin t)}{\sin t} \, dt = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \text{Re} \left( \frac{i \cos t - \sin t}{\sin t} \right) \, dt = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (-1) \, dt = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

*g. e. d.*

**Satz 3.1.7.** Für  $f \in M_k$  setze man  $g(z) := y^{\frac{k}{2}} |f(z)|$  für  $z \in \mathbb{H}$ . Dann gilt

- (i)  $g$  ist invariant unter  $\Gamma(1)$ ,

(ii) ist  $f \in S_k$ , dann ist  $g$  auf  $\mathbb{H}$  beschränkt.

**Beweis.**

(i) Es gilt

$$g\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \left(\operatorname{Im}\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)\right)^{\frac{k}{2}} \left|f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)\right| = \left(\frac{y}{|cz+d|^2}\right)^{\frac{k}{2}} |cz+d|^k |f(z)| = g(z).$$

(ii) Es ist  $\mathbb{H} = \bigcup_{M \in \Gamma(1)} M \circ \overline{\mathcal{F}}$ . Da nach (i)  $g$  invariant unter  $\Gamma(1)$  ist, genügt es zu zeigen, dass  $g$  auf  $\overline{\mathcal{F}_1}$  beschränkt ist. Aber

$$\overline{\mathcal{F}_1} \cap \overline{\mathcal{F}_c} \text{ ist kompakt.}$$

Wegen Stetigkeit genügt es also zu zeigen, dass  $g$  für  $y \rightarrow \infty$  beschränkt ist. Sei  $f(z) = \sum_{n \geq 1} a(n) e^{2\pi i n z}$ , beachte  $n \geq 1$ , denn  $f \in S_k$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} |g(z)| &= y^{\frac{k}{2}} |f(z)| = y^{\frac{k}{2}} \left| e^{2\pi z} \sum_{n \geq 1} a(n) e^{2\pi i(n-1)z} \right| \\ &\leq y^{\frac{k}{2}} e^{-2\pi y} \left( \sum_{n \geq 1} |a(n)| e^{-2\pi(n-1)y} \right) \\ &= y^{\frac{k}{2}} e^{-2\pi y} e^{2\pi c} \left( \sum_{n \geq 1} |a(n)| e^{-2\pi n c} \right) \\ &= \frac{y^{\frac{k}{2}}}{e^{2\pi y}} \cdot K \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

*g.e.d.*

**Definition 3.1.8.** Für  $f, g \in M_k$  derart, dass  $fg \in S_{2k}$ , setze

$$\langle f, g \rangle := \int_{\overline{\mathcal{F}}} f(z) \overline{g(z)} y^k dw, \quad (3.1)$$

wobei  $\mathcal{F}$  ein Fundamentalbereich wie oben ist.

**Satz 3.1.9.**

(i) (3.1) ist absolut konvergent und hängt nicht von der Auswahl von  $\mathcal{F}$  ab.

### 3.2. Anwendung: Eine Charakterisierung der Eisensteinreihen

---

(ii)  $S_k \times S_k \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $(f, g) \mapsto \langle f, g \rangle$  ist ein Skalarprodukt auf  $S_k$ .

**Beweis.**

(i) Beachte  $fg \in S_{2k}$  und  $|f(z)\overline{g(z)}|y^k = y^k|f(z)g(z)|$ , wende **Satz 3.1.7** (ii) an und bemerke  $\int_{\mathcal{F}} dw < \infty$ . Unabhängig von  $\mathcal{F}$  folgt aus **Satz 3.1.5**.

(ii) Klar.

*g.e.d.*

### 3.2. Anwendung: Eine Charakterisierung der Eisensteinreihen

**Satz 3.2.1.** Sei  $k \in 2\mathbb{Z}$ ,  $k \geq 4$ . Sei  $C_k := \{f \in M_k \mid \langle f, g \rangle = 0 \ \forall g \in S_k\}$  ein Unterraum von  $M_k$ . Dann gilt  $C_k = \mathbb{C}E_k$ .

**Beweis.** Der Beweis erfolgt in mehreren Schritten:

**Lemma 3.2.2.** Es gilt  $M_k = C_k \oplus S_k$  (und  $M_k = \mathbb{C}E_k \oplus S_k$ ).

**Beweis.** Sei  $f \in C_k \cap S_k$ . Dann  $\langle f, f \rangle = 0$ , also  $f = 0$ .

Sei  $f \in M_k$ . Die Abbildung  $S_k \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $g \mapsto \langle g, f \rangle$  ist ein lineares Funktional. Nach dem Satz von Riesz-Fischer existiert daher ein eindeutig bestimmtes Element  $g_0 \in S_k$ , so dass  $\langle g, f \rangle = \langle g, g_0 \rangle$  für alle  $g \in S_k$ . Daher  $\langle g, f - g_0 \rangle = 0$  für alle  $g \in S_k$ , d. h.  $\langle f - g_0, g \rangle = 0$  für alle  $g \in S_k$ . Also ist  $f - g_0 \in C_k$  nach Definition und somit

$$f = \underbrace{(f - g_0)}_{\in C_k} + \underbrace{g_0}_{\in S_k}.$$

*g.e.d.*

Es folgt

$$\dim C_k = \dim M_k - \dim S_k = 1 + \dim S_k - \dim S_k = 1.$$

Daher genügt es zu zeigen, dass  $E_k \in C_k$ , d. h.  $\langle E_k, g \rangle = 0$  für alle  $g \in S_k$ .

**Lemma 3.2.3.** Es gilt

$$E_k(z) = \frac{1}{2} \sum_{M \in \Gamma(1)_\infty \setminus \Gamma(1)} (1|_k M)(z),$$

wobei  $\Gamma(1)_\infty = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$  und  $(1|_k M) = (cz + d)^{-k}$ .

**Beweis.** Es gilt  $E_k = \frac{1}{2\zeta(k)} G_k$  mit  $G_k = \sum'_{m,n} \frac{1}{(mz+n)^k}$ . Ist  $(m, n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , so schreibe  $(m, n) = \lambda(c, d)$  wobei  $\lambda = \text{ggT}(m, n) \in \mathbb{N}$  und  $(c, d) \in \mathbb{Z}^2$  mit  $\text{ggT}(c, d) = 1$ . Also

$$G_k(z) = \underbrace{\zeta(k)}_{=\sum_{\lambda=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda^k}} \cdot \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1}} (cz+d)^{-k}.$$

Damit

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1}} (cz+d)^{-k}.$$

Daher genügt es zu zeigen

$$\sum_{M \in \Gamma(1)_{\infty} \setminus \Gamma(1)} (1|_k M)(z) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1}} (cz+d)^{-k}.$$

Jeder Summand links hat die Gestalt  $(cz+d)^{-k}$  mit  $\text{ggT}(c, d) = 1$ . Umgekehrt ist zu zeigen: Jedes  $(c, d) \in \mathbb{Z}^2$  mit  $\text{ggT}(c, d) = 1$  lässt sich vervollständigen zu  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$  eindeutig bis auf Links-Multiplikation eines Elementes in  $\Gamma(1)_{\infty}$ . Es gilt:

- $\text{ggT}(c, d) = 1$ , also existieren  $a, b \in \mathbb{Z}$  mit  $ad - bc = 1$ , denn  $\mathbb{Z}$  ist ein Hauptidealring. Also  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$ .
- $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+nc & b+nd \\ c & d \end{pmatrix}$ .
- Seien  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$ . Dann  $ad - bc = 1 = a'd - b'c$ . Also  $(a - a')d = (b - b')c$ , also  $\frac{c}{d} = \frac{a-a'}{b-b'}$ . Da  $\text{ggT}(c, d) = 1$  folgt  $a - a' = nc, b - b' = nd$  mit  $n \in \mathbb{Z}$ . Das heißt  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c & d \end{pmatrix}$ .

*q.e.d.*

Man kann dies schreiben als

$$E_k(z) = \sum_{M \in \Gamma(1)_{\infty}' \setminus \Gamma(1)'} (1|_k M)(z),$$

wobei  $\Gamma(1)' = \Gamma(1)/\{\pm E\}$  und  $\Gamma(1)'_{\infty} = \left\{ \begin{pmatrix} \pm 1 & n \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\} / \{\pm E\}$ .

Sei  $g \in S_k$ , zu zeigen ist  $\langle E_k, g \rangle = 0$ .

Nach Definition

$$\langle E_k, g \rangle = \int_{\mathcal{F}} E_k(z) \overline{g(z)} y^k dw = \int_{\mathcal{F}} \left( \sum_{M \in \Gamma(1)'_{\infty} \setminus \Gamma(1)'} (1|_k M)(z) \overline{g(z)} (\text{Im } z)^k \right) dw(z)$$

### 3.2. Anwendung: Eine Charakterisierung der Eisensteinreihen

---

Beachte

$$\begin{aligned} (1|_k M)(z) \overline{g(z)} (\operatorname{Im} z)^k &= (1|_k M)(z) \overline{g(M \circ z) (1|_k M)(z)} (\operatorname{Im} M \circ z)^k |(1|_k M)(z)|^{-2} \\ &= \overline{g(M \circ z)} (\operatorname{Im} M \circ z)^k. \end{aligned}$$

Sei  $\tilde{\mathcal{F}} := \bigcup_{M \in \Gamma(1)'_\infty \setminus \Gamma(1)'} M \circ \overline{\mathcal{F}}$  ein Fundamentalbereich für die Untergruppe  $\Gamma(1)'_\infty \subseteq \Gamma(1)'$ , welche durch  $z \mapsto z + n$  operiert. Dann folgt, wobei die zweite Gleichheit durch Substitution und Vertauschung erfolgt, diese ist aufgrund der absoluten Konvergenz gerechtfertigt:

$$\langle E_k, g \rangle = \sum_{M \in \Gamma(1)'_\infty \setminus \Gamma(1)'} \int_{M \circ \overline{\mathcal{F}}} \overline{g(z)} y^{k-2} dx dy = \int_{\tilde{\mathcal{F}}} \overline{g(z)} y^{k-2} dx dy.$$

Man zeigt formal: Integral ist unabhängig der Auswahl des Fundamentalbereichs  $\mathcal{G}$ . Man wähle für  $\mathcal{G}$  einen Streifen der Breite 1, etwa  $\mathcal{G} = \{z = x + iy \in \mathbb{H} \mid |x| < \frac{1}{2}\}$ . Dann

$$\langle E_k, g \rangle = \int_0^\infty \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \overline{g(z)} y^{k-2} dx dy$$

Sei  $g(z) = \sum_{n \geq 1} a(n) e^{2\pi i n z} = \sum_{n \geq 1} a(n) e^{2\pi i n x} e^{-2\pi n y}$ , daher  $\overline{g(z)} = \sum_{n \geq 1} \overline{a(n)} e^{-2\pi n y} e^{-2\pi i n x}$ .

$$\langle E_k, g \rangle = \int_0^\infty \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{n \geq 1} \overline{a(n)} e^{-2\pi n y} y^{k-2} e^{-2\pi i n x} \right) dx dy = 0$$

Vertausche Summe und Integral (denn  $g \in S_k$ ) und beachte  $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-2\pi i n x} dx = 0$ , da  $n \neq 0$ . *g.e.s.*

## 4. Poincaré-Reihen

*Motivation:* Die Abbildung  $S_k \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \mapsto a_f(n) = n$ -ter Fourierkoeffizient von  $f$  ist ein lineares Funktional. Nach dem Darstellungssatz von Fréchet-Riesz existiert ein eindeutig bestimmtes  $\tilde{P}_n$  für  $n \in \mathbb{N}$  mit

$$a_f(n) = \langle f, \tilde{P}_n \rangle \quad \text{für alle } f \in S_k.$$

*Frage:* Kann man  $\tilde{P}_n$  explizit angeben? Antwort: ja!

**Definition 4.0.1.** Sei  $k \in 2\mathbb{Z}$ ,  $k \geq 4$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Dann heißt die formale Reihe

$$P_n(z) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1 \\ ad-bc=1}} (cz+d)^{-k} e^{2\pi i n \frac{az+b}{cz+d}} \quad \text{für } z \in \mathbb{H}$$

die  $n$ -te Poincaré Reihe vom Gewicht  $k$  für  $\Gamma(1)$ . Summiert wird über alle  $(c,d) \in \mathbb{Z}^2$  mit  $\text{ggT}(c,d) = 1$  und zu jedem solchen Paar ist  $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$  zu bestimmen, so dass  $ad-bc = 1$ , d. h.  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$ . Dies ist unabhängig von der Auswahl von  $a, b$ , denn ist auch  $a', b'$  ein solches Paar, so gilt  $a' = a + mc$ ,  $b' = b + md$  für ein  $m \in \mathbb{Z}$  und somit

$$\frac{a'z + b'}{cz + d} = \frac{az + b}{cz + d} + m$$

mit  $m \in \mathbb{Z}$  und  $e^{2\pi i nm} = 1$ .

### 4.1. Anwendungen

**Bemerkung 4.1.1.** Es gilt  $P_0 = E_k$ , wie man durch Vergleich mit [Lemma 3.2.3](#) leicht einsieht.

**Satz 4.1.2.**

- (i) Die Reihe  $P_n$  konvergiert auf Kompakta in  $\mathbb{H}$  gleichmäßig absolut, stellt also dort eine holomorphe Funktion dar. Es gilt  $P_n \in S_k$  für  $n \geq 1$ .

## 4.1. Anwendungen

---

(ii) Es gilt

$$\langle f, P_n \rangle = \frac{(k-2)!}{(4\pi n)^{k-1}} a_f(n).$$

für alle  $f \in S_k$  mit  $f = \sum_{m \geq 1} a_f(m) q^m$ .

**Beweis.**

(i) Wegen  $\frac{az+b}{cz+d} \in \mathbb{H}$  ist

$$\left| e^{2\pi i n \frac{az+b}{cz+d}} \right| \leq 1$$

und daher

$$\sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1 \\ ad-bc=1}} |cz+d|^{-k} \cdot \left| e^{2\pi i n \frac{az+b}{cz+d}} \right| \leq \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1 \\ ad-bc=1}} |cz+d|^{-k},$$

sodass die Reihe der Absolutbeträge nach [Lemma 3.2.3](#) durch die Eisensteinreihe von Gewicht  $k$  majorisiert wird. Letztere konvergiert nach FT 2 auf Kompakta in  $\mathbb{H}$  gleichmäßig absolut.

Zeige noch  $P_n \in S_k$  für  $n \geq 1$ . Schreibe zunächst

$$P_n(z) = \frac{1}{2} \sum_{M \in \Gamma(1)_\infty \backslash \Gamma(1)} (e^n|_k M)(z),$$

mit  $e^n(z) := e^{2\pi i n z}$  und beachte, dass  $e^n|_k M = e^n$  für  $M \in \Gamma(1)_\infty$ . Hierbei ist wie in [Lemma 3.2.3](#)

$$\Gamma(1)_\infty := \left\{ M \in \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \right\}.$$

Für  $P_n \in S_k$  müssen wir zeigen, dass  $P_n|_k M = P_n$  für alle  $M \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$  und zudem in  $z = i\infty$  verschwindet. Wie im Fall der Eisensteinreihen ist hierfür zu zeigen, dass

$$\lim_{z \rightarrow i\infty} P_n(z) = 0,$$

also

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} P_n(z_\nu) = 0$$

für jede Folge von  $z_\nu \in \mathbb{H}$  mit  $z_\nu \rightarrow i\infty$ . Wegen gleichmäßiger Konvergenz gilt

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} P_n(z_\nu) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1 \\ ad-bc=1}} \lim_{\nu \rightarrow \infty} (cz_\nu + d)^{-k} e^{2\pi i n \frac{az_\nu+b}{cz_\nu+d}}$$



und alle Grenzwerte unter der Summe sind 0. In der Tat ist der Exponentialterm wegen  $\frac{az_\nu+b}{cz_\nu+d} \in \mathbb{H}$  beschränkt und für  $c \neq 0$  strebt  $(cz_\nu + d)^{-k}$  gegen 0. Andererseits ist für  $c = 0$  der vordere Term gleich  $d^{-k}$  und somit beschränkt, während

$$\frac{az_\nu+b}{d} \rightarrow i\infty \implies e^{2\pi i n \frac{az_\nu+b}{d}} \rightarrow 0.$$

Damit ist alles gezeigt.

(ii) Unter Benutzung der Darstellung

$$P_n(z) = \frac{1}{2} \sum_{M \in \Gamma(1)_\infty \setminus \Gamma(1)} (e^n|_k M)(z)$$

zeigt man mit dem gleichen „Konvolutionstrick“ wie im Beweis von [Satz 3.2.1](#), dass

$$\langle f, P_n \rangle = \int_0^\infty \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(z) e^{\overline{2\pi i n z}} y^{k-2} dx dy.$$

Man stelle sich hierzu vor, dass  $\mathbb{H}$  als disjunkte Vereinigung von Bildern des exakten Fundamentalbereichs unter Linksmultiplikation mit  $M \in \Gamma(1)$  entsteht. Teilt man nun  $\Gamma(1)_\infty$  heraus, also alle Translationen, so verbleibt noch der Streifen  $|x| < \frac{1}{2}, y > 0$ .

Es gilt weiter für beliebiges  $f \in S_k$  mit Darstellung  $f(z) = \sum_{m \geq 1} a(m) q^m$ , wie üblich  $q = \exp(2\pi i z)$  und  $z = x + iy$ , dass

$$\begin{aligned} \langle f, P_n \rangle &= \int_0^\infty \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sum_{m \geq 1} a(m) e^{2\pi i m x} e^{-2\pi m y} e^{-2\pi i n x} e^{-2\pi n y} y^{k-2} dx dy \\ &= \int_0^\infty \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sum_{m \geq 1} a(m) e^{2\pi i (m-n)x} e^{-2\pi (n+m)y} y^{k-2} dx dy. \end{aligned}$$

Wegen

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2\pi i r x} dx = \delta_{r,0} := \begin{cases} 1, & r = 0 \\ 0, & r \neq 0 \end{cases} \quad (\text{Kronecker-Delta})$$

für beliebiges  $r \in \mathbb{Z}$  folgt

$$\begin{aligned} \langle f, P_n \rangle &= \int_0^\infty \sum_{m \geq 1} a(m) \delta_{m,n} e^{-2\pi (n+m)y} y^{k-2} dy \\ &= a(n) \int_0^\infty e^{-4\pi n y} y^{k-2} dy \end{aligned}$$

## 4.1. Anwendungen

---

$$\begin{aligned}
 &= a(n) \frac{1}{(4\pi n)^{k-1}} \underbrace{\int_0^\infty e^{-y} y^{k-2} dy}_{=\Gamma(k-1)} \\
 &= a(n) \frac{(k-2)!}{(4\pi n)^{k-1}}.
 \end{aligned}$$

*g.e.d.*

**Korollar 4.1.3.** Die Poincaré-Reihen  $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  zu einem festen Gewicht  $k \geq 4$  mit  $k$  gerade, erzeugen den Raum  $S_k$ .

**Beweis.** Angenommen die  $P_n$  erzeugen nicht ganz  $S_k$ , dann existiert ein  $f \in S_k$  mit  $\langle f, P_n \rangle = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Mit [Satz 4.1.2](#), ii) folgt hieraus aber  $a(n) = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und damit  $f \equiv 0$ . *g.e.d.*

**Satz 4.1.4.** Die Reihe  $P_n$  hat die Fourier-Entwicklung

$$P_n(z) = \sum_{m \geq 1} g_n(m) q^m$$

mit

$$g_n(m) := \delta_{m,n} + 2\pi \cdot (-1)^{\frac{k}{2}} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{k-1}{2}} \cdot \sum_{c \geq 1} \left[ \frac{1}{c} \cdot K(m, n, c) \cdot J_{k-1} \left( \frac{4\pi\sqrt{mn}}{c} \right) \right].$$

Hierbei ist die Kloosterman-Summe  $K$  definiert als

$$K(m, n, c) := \sum_{\substack{d \pmod{c} \\ (c,d)=1}} e^{2\pi i \frac{md+n\bar{d}}{c}},$$

wobei  $\bar{d} \in \mathbb{Z}$  mit  $\bar{d}d \equiv 1 \pmod{c}$  ist, und die Besselfunktion  $J_{k-1}$  definiert als

$$J_{k-1}(x) := \left(\frac{x}{2}\right)^{k-1} \sum_{\ell \geq 0} \frac{(-\frac{1}{4}x^2)^\ell}{\ell!(k-1+\ell)!}.$$

**Beweis.** Nach Definition ist

$$P_n(z) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ \text{ggT}(c,d)=1 \\ ad-bc=1}} (cz+d)^{-k} e^{2\pi i n \frac{az+b}{cz+d}}.$$

Ist  $c = 0$ , so folgt aus  $\text{ggT}(c, d) = 1$  bereits  $d = a = \pm 1$  und unabhängig von  $b \in \mathbb{Z}$  ergibt sich zweimal der Term

$$\frac{1}{2}(\pm 1)^{-k} e^{2\pi i n \frac{\pm z + b}{\pm 1}} = \frac{1}{2} e^{2\pi i n z} e^{\pm 2\pi i n b} = \frac{1}{2} e^{2\pi i n z},$$

zusammengenommen also  $e^{2\pi i n z}$ . Die übrigen Terme ergeben den Beitrag

$$\sum_{\substack{c \geq 1, d \in \mathbb{Z} \\ \text{ggT}(c, d) = 1 \\ ad - bc = 1}} (cz + d)^{-k} e^{2\pi i n \frac{az + b}{cz + d}} = \sum_{c \geq 1} \sum_{\substack{d' \pmod{c} \\ \text{ggT}(c, d') = 1 \\ ad' - b'c = 1}} \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (c(z + \nu) + d')^{-k} e^{2\pi i n \frac{a(z + \nu) + b'}{c(z + \nu) + d'}}.$$

Die rechte Seite entsteht aus der linken, indem man für festes  $c \geq 1$  und ein festes Vertretersystem  $d' \pmod{c}$  jedes  $d \in \mathbb{Z}$  mit  $\text{ggT}(c, d) = 1$  in der Form  $d = d' + c\nu$  mit  $\nu \in \mathbb{Z}$  und  $d'$  im vorgegebenen Vertretersystem schreibt. Schreibt man zudem mit geeignetem  $b' \in \mathbb{Z}$  auch  $b = b' + a\nu$ , so wird die Bedingung  $ad - bc = 1$  zu

$$1 = ad - bc = a(d' + c\nu) - (b' + a\nu)c = ad' - b'c$$

und die obige Darstellung folgt durch Ausklammern von  $c$  und  $a$ . Im Folgenden schreiben wir wieder  $d$  und  $b$  statt  $d'$  und  $b'$ .

**Lemma 4.1.5.** Sei  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{R})$  mit  $c > 0$ . Sei  $\gamma > 0$  beliebig (insbesondere nicht unbedingt ganzzahlig). Dann gilt

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (c(z + \nu) + d)^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a(z + \nu) + b}{c(z + \nu) + d}} = \frac{2\pi(-1)^{\frac{k}{2}}}{c} \sum_{m \geq 1} \left(\frac{m}{\gamma}\right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1}\left(\frac{4\pi\sqrt{m\gamma}}{c}\right) e^{\frac{2\pi i}{c}(\gamma a + md)} e^{2\pi i m z}.$$

**Beweis.** Es genügt, diese Aussage nur für den Fall  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  zu zeigen, d.h.

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (z + \nu)^{-k} e^{-2\pi i \gamma \frac{1}{z + \nu}} = 2\pi(-1)^{\frac{k}{2}} \sum_{m \geq 1} \left(\frac{m}{\gamma}\right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1}(4\pi\sqrt{m\gamma}) e^{2\pi i m z}.$$

In der Tat: Ersetzt man in dieser Gleichung  $z$  durch  $z + \frac{d}{c}$  und  $\gamma$  durch  $\frac{\gamma}{c^2}$  und multipliziert dann mit  $c^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a}{c}}$ , so wird die linke Seite zu

$$\begin{aligned} c^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a}{c}} \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} \left(z + \frac{d}{c} + \nu\right)^{-k} e^{-2\pi i \frac{\gamma}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c} + \nu}} &= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (cz + d + c\nu)^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a}{c} - 2\pi i \frac{\gamma}{c} \frac{1}{cz + d + c\nu}} \\ &= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (c(z + \nu) + d)^{-k} e^{\frac{2\pi i \gamma}{c} \left(a - \frac{1}{c(z + \nu) + d}\right)} \end{aligned}$$

#### 4.1. Anwendungen

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (c(z + \nu) + d)^{-k} e^{\frac{2\pi i \gamma}{c} \frac{ac(z+\nu) + \overbrace{ad-1}^{=bc}}{c(z+\nu)+d}} \\
&= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (c(z + \nu) + d)^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a(z+\nu)+b}{c(z+\nu)+d}}
\end{aligned}$$

sowie die rechte Seite zu

$$\begin{aligned}
&c^{-k} e^{2\pi i \gamma \frac{a}{c}} 2\pi (-1)^{\frac{k}{2}} \sum_{m \geq 1} \left( \frac{mc^2}{\gamma} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1} \left( 4\pi \sqrt{\frac{m\gamma}{c^2}} \right) e^{2\pi i m(z + \frac{d}{c})} \\
&= c^{-k+2\frac{k-1}{2}} 2\pi (-1)^{\frac{k}{2}} \sum_{m \geq 1} \left( \frac{m}{\gamma} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1} \left( \frac{4\pi \sqrt{m\gamma}}{c} \right) e^{2\pi i \gamma \frac{a}{c} + 2\pi i m z + 2\pi i m \frac{d}{c}} \\
&= \frac{2\pi (-1)^{\frac{k}{2}}}{c} \sum_{m \geq 1} \left( \frac{m}{\gamma} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1} \left( \frac{4\pi \sqrt{m\gamma}}{c} \right) e^{\frac{2\pi i}{c} (\gamma a + md)} e^{2\pi i m z}.
\end{aligned} \tag{4.1}$$

Die linke Seite von (4.1) konvergiert gleichmäßig absolut auf kompakten Mengen in  $\mathbb{H}$  und hat den Limes 0 für  $q \rightarrow \infty$  (gleicher Beweis wie in Satz 4.1.2). Sie hat daher eine Fourierentwicklung  $\sum_{m \geq 1} c(m) q^m$  mit

$$c(m) = \int_{ic}^{ic+1} \left( \sum_{\nu \in \mathbb{Z}} (z + \nu)^{-k} e^{-2\pi \gamma \frac{1}{z+\nu}} \right) e^{-2\pi i m z} dz \stackrel{z \mapsto is}{=} -i^{-k+1} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} s^{-k} e^{-2\pi \frac{\gamma}{s}} e^{2\pi m s} ds$$

Es gilt nach „Abramowitz-Stegun“, Seite 1026, Formel 29.3.80:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} s^{-k} e^{-\frac{\alpha}{s}} e^{ts} ds = \left( \frac{t}{\alpha} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1}(2\sqrt{\alpha t})$$

Setzt man  $\alpha = 2\pi\gamma$ ,  $t = 2\pi m$ , so folgt

$$c(m) = -i^{-k+1} \cdot 2\pi i \left( \frac{2\pi m}{2\pi\gamma} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1}(2\sqrt{2\pi\gamma - 2\pi m}) = (-1)^{\frac{k}{2}} \cdot 2\pi \left( \frac{m}{\gamma} \right)^{\frac{k-1}{2}} J_{k-1}(2\pi\sqrt{m\gamma})$$

wie behauptet.

*q.e.d.*

Nach dem Lemma folgt nun

$$P_n(z) = e^{2\pi n z} + \sum_{c \geq 1} \sum_{\substack{d \bmod c \\ \text{ggT}(d,c)=1}} \frac{2\pi(-1)^{\frac{k}{2}}}{c} \sum_{m \geq 1} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{k-1}{2}} J_{m-1}\left(\frac{4\pi\sqrt{mn}}{c}\right) \cdot e^{\frac{2\pi i}{c}(na+md)} e^{2\pi i m z}$$

und die Behauptung folgt nach Vertauschung der Summation über  $c$  und  $m$  (absolute Konvergenz). Beachte  $ad \equiv 1 \pmod{c}$ .

*g.e.d.*

#### 4.1.1. Die Ramanujan $\tau$ -Funktion

**Satz 4.1.6.** Sei  $\Delta(z) = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n \in S_{12}$  ( $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \dots$ ). Dann gilt

$$\tau(n) \neq 0 \iff P_{n,12} \neq 0$$

$$\iff g_n(n) \neq 0$$

wobei  $g_n(n)$  der  $n$ -te Fourier-Koeffizient von  $P_{n,12}$  ist (siehe Satz 4.1.4).

**Beweis.** Es gilt  $P_n = c_n \cdot \Delta$  mit  $c_n \in \mathbb{C}$ . Durch Vergleich des ersten Fourier-Koeffizienten folgt  $c_n \in \mathbb{R}$ . Aus  $\langle \Delta, P_n \rangle \sim \tau(n)$  (siehe Satz 4.1.2 (ii)) folgt  $c_n \langle \Delta, \Delta \rangle \sim \tau(n)$ , also gilt  $\tau(n) = 0$  genau dann, wenn  $c_n = 0$ . Aber  $c_n = 0$  genau dann, wenn  $P_n \equiv 0$  genau dann, wenn  $g_n(n) \sim \langle P_n, P_n \rangle = 0$ . Hieraus folgt die Behauptung. Wobei  $x \sim y \iff x = ky$ . *g.e.d.*

**Bemerkung 4.1.7.** Es wird vermutet, dass  $\tau(n) \neq 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  (Lehmer).

#### 4.1.2. Die Petersson'schen Formeln und Abschätzungen für Fourier-Koeffizienten

Sei  $\{f_1, f_2, \dots, f_g\}$  irgendeine orthogonale Basis von  $S_k$  (nach dem Gram-Schmidt-Verfahren kann man z. B. jedes  $f \in S_k \setminus \{0\}$  zu irgendeiner orthogonalen Basis  $\{f, \dots, f_g\}$  ergänzen). Dann gilt nach Satz 4.1.2 (ii) für jedes  $n \in \mathbb{N}$ :

$$P_n = \frac{(k-2)!}{(4\pi n)^{k-1}} \sum_{\nu=0}^g \frac{\overline{a_\nu(n)} f_\nu}{\langle f_\nu, f_\nu \rangle}$$

wenn  $f_\nu = \sum_{m \geq 1} a_\nu(m)q^m$ . Nimmt man auf beiden Seiten den  $m$ -ten Fourier-Koeffizienten so erhält man

$$g_n(m) = \frac{(k-2)!}{(2\pi n)^{k-1}} \sum_{\nu=1}^g \frac{a_\nu(m) \overline{a_\nu(m)}}{\langle f_\nu, f_\nu \rangle}$$

## 4.1. Anwendungen

---

Damit folgt

$$g_n(n) = \frac{(k-2)!}{(4\pi n)^{k-1}} \sum_{\nu=1}^g \frac{|a_\nu(n)|^2}{\langle f_\nu, f_\nu \rangle}$$

Speziell ist

$$|a_\nu(n)|^2 \leq \|f\|^2 \frac{(4\pi n)^{k-1}}{(k-2)!} g_n(n)$$

Für  $g_n(n)$  substituiert man aus **Satz 4.1.4** explizite Formeln. Benutzt man  $J_n(x) = \mathcal{O}(\min\{x^{-\frac{1}{2}}, x^n\})$  (einfach) und  $k(n, n, c) = \mathcal{O}_\varepsilon((n, c)^{\frac{1}{2}c^{\frac{1}{2}+\varepsilon}})$  (Weilsche Abschätzung, tieflegend) so erhält man nach einigen Rechnungen

$$g_n(n) = \mathcal{O}(n^{\frac{1}{2}+\varepsilon})$$

also folgt

$$a_\nu(n) = \mathcal{O}_\varepsilon(n^{\frac{k}{2}-\frac{1}{4}+\varepsilon}).$$

**Satz 4.1.8.** Sei  $f \in S_k$ . Dann gilt  $a(n) = \mathcal{O}_\varepsilon(n^{\frac{k}{2}-\frac{1}{4}+\varepsilon})$ , für  $\varepsilon > 0$ .

**Bemerkung 4.1.9.**

- (i) Man kann leicht zeigen, dass  $a(n) \ll_f n^{\frac{k}{2}}$  (siehe später)
- (ii) Mit der Theorie der L-Reihen zu Modulformen kann man

$$a(n) \ll_{f,\varepsilon} n^{\frac{k}{2}-\frac{1}{4}+\varepsilon}$$

zeigen

- (iii) Nach Deligne (sehr tieflegend) gilt sogar  $a(n) \ll_{f,\varepsilon} n^{\frac{k}{2}-\frac{1}{2}+\varepsilon}$ ,  $\varepsilon > 0$  (Ramanujan-Petersson-Vermutung). Dies ist bestmöglich, denn nach Rankin gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_f(n)|^2}{n^{k-1}} = \infty$$

### 4.1.3. Hecke-Operatoren sind hermitesch

**Satz 4.1.10.** Sei  $P_m$  für  $m \in \mathbb{N}$  die  $m$ -te Poincaré-Reihe in  $S_k$ . Dann

$$P_m|T(n) = \sum_{d|(m,n)} \left(\frac{n}{d}\right)^{k-1} P_{\frac{mn}{d^2}}.$$

**Beweis.** Nach Definition ist

$$P_m = \frac{1}{2} \sum_{M \in \Gamma(1)_\infty \backslash \Gamma(1)} e^m|_k M$$

unabhängig vom Vertretersystem von  $\Gamma(1)_\infty \backslash \Gamma(1)$ . Es gilt

$$2P_m|T(n) = n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{\substack{M \in \Gamma(1)_\infty \backslash \Gamma(1) \\ N \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}(n)}} e^m|_k MN = n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{R \in \Gamma(1)_\infty \backslash \mathcal{M}(n)} e^m|R$$

Wir behaupten nun, dass die Menge

$$\{ MN | N = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} : ad = n, d > 0, b \bmod d, \\$$

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} : (\gamma, \delta) \in \mathbb{Z}^2 : \text{ggT}(\gamma, \delta) = 1 \text{ und } (\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2 \text{ fixiert s. d. } \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \}$$

ein Vertretersystem für  $\Gamma(1)_\infty \backslash \mathcal{M}(n)$  ist.

Wir zeigen zunächst, dass die gesamten Matrizen inäquivalent modulo  $\Gamma(1)_\infty$  sind. Angenommen

$$\begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} NM = N' M'$$

mit  $\nu \in \mathbb{Z}$  und  $N, N'$  und  $M, M'$  wie oben. Daraus folgt

$$N'^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} N = M' M^{-1}$$

also

$$\begin{pmatrix} \frac{d'}{d} & \frac{d'b-b'd+\nu d'd}{n} \\ 0 & \frac{d}{d'} \end{pmatrix} = M' M^{-1}$$

Da  $M' M^{-1}$  Komponenten in  $\mathbb{Z}$  hat, folgt  $\frac{d}{d'}, \frac{d'}{d} \in \mathbb{Z}$ , also  $d = \pm d'$ , also  $d = d'$  und  $a' = a$  und somit

$$M' M^{-1} \in \Gamma(1)_\infty$$

## 4.1. Anwendungen

d. h.  $M' = M$ , da Vertretersystem modulo  $\Gamma(1)_\infty$ . Dann folgt aber  $\begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} N = N'$ , bzw.  $b' = b + \nu d$ , also  $b = b'$  und damit  $N' = N$ . Die Matrizen in der oben angegebenen Menge sind also tatsächlich inäquivalent modulo  $\Gamma(1)_\infty$ .

Es verbleibt noch zu zeigen, dass sich jedes  $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(n)$  schreiben lässt als

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

d. h.

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

mit  $\nu \in \mathbb{Z}$  und  $ad = n, d > 0, b \pmod{d}$  und  $(\gamma, \delta) \in \mathbb{Z}^2, \text{ggT}(\gamma, \delta) = 1, \alpha\delta - \beta\gamma = 1$ . Man bestimmt zunächst  $(\gamma, \delta) \in \mathbb{Z}^2$  mit  $\text{ggT}(\gamma, \delta) = 1$ , sodass  $C\delta - D\gamma = 0$ , dann ist

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(n),$$

also

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \tilde{b} \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

mit  $\tilde{b} \in \mathbb{Z}, ad = n$ . Indem man gegebenenfalls mit  $-E$  multipliziert, d. h.  $(\gamma, \delta)$  durch  $(-\gamma, -\delta)$  ersetzt, kann man auch  $d > 0$  erreichen. Wähle nun  $\nu \in \mathbb{Z}$ , sodass  $b = b + \nu d$ . Dies zeigt die Behauptung, dass die oben angegebene Menge ein Vertretersystem für  $\Gamma(1)_\infty \backslash \mathcal{M}(n)$  ist.

Es gilt nun

$$2P_m | T(n) = n^{\frac{k}{2}-1} \sum_{M \in \Gamma(1)_\infty \backslash \Gamma(1)} \left( \sum_{\substack{ad=n, d>0 \\ b \pmod{d}}} e^m |_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \right) |_k M.$$

Die innere Summe ist gleich

$$\sum_{d|n} n^{\frac{k}{2}} d^{-n} e^{2\pi i m \left( \frac{n}{d^2} z + \frac{b}{d} \right)} = n^{\frac{k}{2}} \sum_{d|(m,n)} d^{1-k} e^{2\pi i \frac{mn}{d^2} z},$$

wegen

$$\sum_{b \pmod{d}} e^{2\pi i \frac{b}{d} m} = \begin{cases} d, & d|m \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Hieraus folgt die Behauptung.

*g. e. d.*



**Satz 4.1.11.** Die Operatoren  $T(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  eingeschränkt auf  $S_k$  sind hermitesch bezüglich des Petersson-Skalarproduktes, d.h.

$$\langle f|T(n), g \rangle = \langle f, g|T(n) \rangle \quad \forall f, g \in S_k.$$

**Beweis.** Man zeigt dies normalerweise, indem man Modulformen zu sogenannten Kongruenzuntergruppen von  $\Gamma(1)$  und deren Skalarprodukt definiert und dann gewisse Invarianzeigenschaften des Skalarproduktes (beim Übergang von einer Untergruppe zur anderen) beachtet. Wir werden hier die Behauptung unter Benutzung von **Satz 4.1.10** beweisen. Da die  $P_m$  mit  $m \in \mathbb{N}$  den Raum  $S_k$  erzeugen, genügt es zu zeigen, dass

$$\langle f|T(n), P_m \rangle = \langle f, P_m|T(n) \rangle.$$

Man schreibe  $f = \sum_{l \geq 1} a(l)q^l$  und  $f|T(n) = \sum_{l \geq 1} b(l)q^l$ . Nach **Satz 4.1.2**, ii) ist

$$\begin{aligned} \langle f|T(n), P_m \rangle &= \frac{(k-2)!}{(4\pi m)^{k-1}} b(m) \\ &= \frac{(k-2)!}{(4\pi m)^{k-1}} \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right). \end{aligned}$$

Andererseits ist nach **Satz 4.1.10**:

$$\begin{aligned} \langle f, P_m|T(n) \rangle &= \sum_{d|(m,n)} \left(\frac{n}{d}\right)^{k-1} \langle f, P_{\frac{mn}{d^2}} \rangle \\ &= \sum_{d|(m,n)} \left(\frac{n}{d}\right)^{k-1} \frac{(k-2)!}{(4\pi \frac{mn}{d^2})^{k-1}} a\left(\frac{mn}{d^2}\right) \\ &= \frac{(k-2)!}{(4\pi m)^{k-1}} \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right). \end{aligned}$$

*g.e.d.*

**Korollar 4.1.12.** Die Eigenwerte von  $T(n)$  sind reell.

**Beweis.** Ist nach **Satz 4.1.11** und LA 1 klar.

*g.e.d.*

**Korollar 4.1.13.** Seien  $f, g$  normalisierte Eigenformen in  $S_k$ . Dann ist entweder  $f = g$  oder  $\langle f, g \rangle = 0$ .

## 4.1. Anwendungen

**Beweis.** Seien  $f = \sum_{n \geq 1} a(n)q^n$  und  $g = \sum_{n \geq 1} b(n)q^n$ . Wegen  $a(1) = b(1) = 1$  ist dann  $f|T(n) = a(n)f$  und  $g|T(n) = b(n)g$ . Daher gilt mit [Satz 4.1.11](#)

$$a(n)\langle f, g \rangle = \langle f|T(n), g \rangle = \langle f, g|T(n) \rangle = \overline{b(n)}\langle f, g \rangle = b(n)\langle f, g \rangle.$$

Aus  $\langle f, g \rangle \neq 0$  folgt damit  $a(n) = b(n)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ , also  $f = g$ .

*g.e.d.*

**Lemma 4.1.14.** Sei  $V$  ein endlich-dimensionaler komplexer Hilbertraum mit Skalarprodukt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  und sei  $\{T_\mu\}_{\mu \in I}$  eine Familie von hermiteschen, miteinander kommutierenden Endomorphismen von  $V$ . Dann besitzt  $V$  eine orthogonale Basis bestehend aus gemeinsamen Eigenvektoren aller Operatoren  $T_\mu$  mit  $\mu \in I$ .

**Beweis.** Sei  $W$  die Menge der  $\mathbb{C}$ -linearen Endomorphismen von  $V$ , aufgefasst als reeller Vektorraum. Wegen  $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$  ist auch  $\dim_{\mathbb{R}} W < \infty$ . Die  $T_\mu$  erzeugen daher einen endlich-dimensionalen Unterraum von  $W$ , sodass es genügt, die Aussage für endlich viele Operatoren  $T_1, \dots, T_m$  zu zeigen.

Wir zeigen zunächst durch Induktion nach  $m$ , dass  $V$  einen gemeinsamen nichttrivialen Eigenvektor von  $T_1, \dots, T_m$  enthält. Für  $m = 1$  ist dies klar, da  $V$  wegen  $T_1$  hermitesch einen nichttrivialen Eigenvektor von  $T_1$  enthält. Sei nun  $m \geq 2$  und  $\lambda$  ein Eigenwert von  $T_1$  mit zugehörigem Eigenraum  $V_\lambda := \{v \in V \mid T_1 v = \lambda v\}$ . Für alle  $\mu \in \{2, \dots, m\}$  besteht nach Voraussetzung die Kommutativität  $T_\mu T_1 = T_1 T_\mu$  und daher gilt  $T_\mu V_\lambda \subseteq V_\lambda$ . Nach Induktionsvoraussetzung besitzt nun  $V_\lambda$  einen nichttrivialen gemeinsamen Eigenvektor von  $T_2, \dots, T_m$ . Dieser ist nach Definition von  $V_\lambda$  auch Eigenvektor von  $T_1$ .

Wir zeigen abschließend die Aussage des Lemmas durch Induktion nach  $\dim_{\mathbb{C}} V$ . Für  $\dim_{\mathbb{C}} V = 1$  ist die Aussage klar. Sei also  $m = \dim_{\mathbb{C}} V \geq 2$ . Man schreibe  $V = \mathbb{C}v \oplus (\mathbb{C}v)^\perp$ , wobei  $v$  ein Eigenvektor aller  $T_\mu$  mit  $\mu \in \{1, \dots, m\}$  ist. Da die  $T_\mu$  hermitesch sind und  $\mathbb{C}v$  invariant lassen, lassen sie auch  $(\mathbb{C}v)^\perp$  invariant. Nach Induktionsvoraussetzung besitzt  $(\mathbb{C}v)^\perp$  bereits eine orthogonale Basis von Eigenvektoren für alle  $T_\mu$ . Hieraus folgt die Behauptung.

*g.e.d.*

**Korollar 4.1.15.** Der Raum  $S_k$  besitzt eine orthogonale Basis von gemeinsamen Eigenfunktionen für alle  $T(n)$  mit  $n \in \mathbb{N}$ .

**Beweis.** Folgt direkt aus dem obigen Lemma mit  $V = S_k$  und  $\{T_\mu\}_{\mu \in I} = \{T(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

*g.e.d.*

**Bemerkung 4.1.16.** Nach [Korollar 4.1.13](#) ist diese orthogonale Basis bis auf Permutation und Multiplikation mit Skalaren in  $\mathbb{C}^\times$  eindeutig bestimmt.

## 5. Die Eichler-Selberg-Spurformel auf $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Sei von nun an stets  $k \geq 4$  gerade und wie üblich  $T(m)$  mit  $m \geq 1$  der  $m$ -te Hecke-Operator auf  $M_k(\Gamma(1))$ . Wir wissen bereits, dass wir  $T(m)$  zu einem Endomorphismus auf  $S_k$  einschränken können.

*Ziel:* Bestimmung einer analytischen (einfach) und arithmetischen (schwer) Formel für die Spur  $\mathrm{Tr} T(m)$  für alle  $m \in \mathbb{N}$ .

Sei  $\mathbb{H}$  wie üblich die obere Halbebene und  $h$  eine Funktion  $h : \mathbb{H} \times \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $(z, z') \mapsto h(z, z')$ , welche in beiden Variablen eine Spitzenform von Gewicht  $k$  darstellt, d.h.

$$h(\cdot, z') \in S_k \quad \forall z' \in \mathbb{H} \quad \text{und} \quad h(z, \cdot) \in S_k \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

Für  $f \in S_k$  definieren wir dann  $f * h$  als die Funktion

$$f * h : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}, z' \mapsto (f * h)(z') := \int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{h(z, -z')} y^{k-2} dx dy \quad (z = x + iy). \quad (5.1)$$

Dies ist im Wesentlichen das Petersson-Skalarprodukt  $\langle f, h(\cdot, -z') \rangle$ . Wir wollen zunächst zeigen, dass  $T(m) : S_k \rightarrow S_k$  als ein Integral dieses Typs geschrieben werden kann mit einem bestimmten Kern  $h = h_m$  (bis auf eine Konstante). Aus diesen Überlegungen folgt dann auch sogleich eine analytische Formel für  $\mathrm{Tr} T(m)$ .

Sei  $f_1, \dots, f_r$  eine Basis von normierten, simultanen, orthogonalen Eigenformen für die  $T(m)$ , d.h.

$$f_i = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^i q^n$$

$$a_1^i = 1$$

$$T(m)f_i = a_m^i f_i$$

$$\langle f_i, f_j \rangle = 0 \iff i \neq j.$$

Für  $m \geq 1$  definieren wir

$$h_m(z, z') = \sum_{ad-bc=m} (cz' + dz' + az + b)^{-k},$$

dabei erstreckt sich die Summe über alle ganzzahligen Matrizen  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  mit Determinante  $m$ . Offenbar gilt ebenso

$$h_m(z, z') = \sum_{ad-bc=m} (cz + d)^{-k} \left( z' + \frac{az + b}{cz + d} \right)^{-k} = \sum_{M \in \mathcal{M}(m)} (z' + z)^{-k}|_{k,z} M$$

Man zeigt schnell wegen  $k \geq 4$ , dass die Reihe auf kompakten Teilmengen  $K \subseteq \mathbb{H} \times \mathbb{H}$  absolut und gleichmäßig konvergiert und dort in beiden Variablen holomorphe Funktionen darstellt. Da  $\mathcal{M}(m) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}(m)$ ,  $M \mapsto ML$  mit  $L \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ , folgt  $h(z, z')|_{k,z} L = h(z, z')$ .

Da weiter

$$\lim_{z \rightarrow i\infty} \sum_{M \in \mathcal{M}(m)} (z + z')^{-k}|_{k,z} M = \sum_{M \in \mathcal{M}(m)} \lim_{z \rightarrow i\infty} (z' + z)^{-k}|_{k,z} M = 0,$$

folgt  $h_m(-, z') \in S_k$  und  $h_m(z, -) \in S_k$  aus Symmetriegründen.

**Satz 5.0.1.** Sei

$$C_k = \frac{(-1)^{\frac{k}{2}} \pi}{2^{(k-3)}(k-1)}. \quad (5.2)$$

Dann gilt

- (i) Die Funktion  $C_k^{-1} m^{k-1} h_m(z, z')$  ist ein Kern für den Operator  $T(m): S_k \rightarrow S_k$ , das heißt:

$$(f * h_m)(z') = C_k m^{-k+1} (T(m)f)(z') \quad (5.3)$$

- (ii) Es gilt die Identität

$$C_k^{-1} m^{k-1} h_m(z, z') = \sum_{i=1}^r a_m^i \frac{f_i(z) \cdot f_i(z')}{\langle f_i, f_i \rangle} \quad (5.4)$$

- (iii) Die Spur  $\mathrm{Tr} T(m)$  ist gegeben durch

$$\mathrm{Tr} T(m) = C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} h_m(z, -\bar{z}) y^{k-2} dx dy \quad (5.5)$$

**Beweis.** Sei zunächst  $m = 1$ . Falls  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ , dann gilt

$$(c\bar{z} + d)^{-k} f(z) y^k = f(\gamma z) \cdot \mathrm{Im}(\gamma z)^k$$

Aus der Definition von  $h_m$  erhalten wir demnach

$$f(z)\overline{h_1(z, z')}y^k = \sum_{\gamma \in \Gamma(1)} (\overline{z'} + \gamma\overline{z})^{-k} f(\gamma z) \mathrm{Im}(\gamma z)^k$$

und demnach

$$\begin{aligned} (f * h_1)(z') &= \int_{\mathcal{F}} \sum_{\gamma \in \Gamma(1)} (-z' + \gamma\overline{z})^{-k} f(\gamma z) \mathrm{Im}(\gamma z)^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \sum_{\gamma \in \Gamma} \int_{\partial \mathcal{F}} (-z' + \overline{z})^{-k} f(z) y^{k-2} dx dy \\ &= 2 \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (x - iy - z')^{-k} f(x + iy) y^{k-2} dx dy \end{aligned} \tag{5.6}$$

Nach Cauchy's Formel (und da  $f$  Spitzenform) gilt

$$\int_{-\infty}^\infty (x - iy - z')^{-k} f(x + iy) dx = \frac{2\pi i}{(k-1)!} f^{(k-1)}(2iy + z')$$

Daraus folgt, dass die rechte Seite von (5.6) wie folgt umgeformt werden kann

$$\begin{aligned} (f * h_1)(z') &= \frac{4\pi i}{(k-1)!} \int_0^\infty y^{k-2} f^{(k-1)}(2iy + z') dy \\ &= \frac{4\pi i}{(k-1)!} \int_0^\infty \frac{1}{(2i)^{k-2}} \frac{d^{k-2}}{dt^{k-2}} f'(2ity + z') \Big|_{t=1} dy \\ &= \frac{4\pi i}{(k-1)!} \frac{1}{(2i)^{k-2}} \frac{d^{k-2}}{dt^{k-2}} \int_0^\infty f'(2ity + z') dy \Big|_{t=1} \\ &= \frac{4\pi i}{(k-1)!} \frac{1}{(2i)^{k-2}} \frac{d^{k-2}}{dt^{k-2}} \left( 0 - \frac{f(z')}{2it} \right) \Big|_{t=1} \\ &= C_k f(z') \end{aligned}$$

Das beweist (5.3) im Fall  $m = 1$ . Für den allgemeinen Fall beachte

$$\begin{aligned}
T(m)h_1(z, z') &= T(m) \sum_{\gamma \in \Gamma(1)} (z' + z)^{-k}|_{k,z}\gamma \\
&= m^{k-1} \sum_{\substack{M \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}(m) \\ \gamma \in \Gamma(1)}} (z' + z)^{-k}|_{k,z}\gamma M \\
&= m^{k-1} \sum_{R \in \mathcal{M}(m)} (z' + z)^{-k}|_{k,z}R \\
&= m^{k-1}h_m
\end{aligned}$$

Damit folgt (i).

Für (ii) beachte, dass wir  $h_m$  schreiben können mit  $z_1, \dots, z_r$  paarweise verschieden und  $z_\nu \not\equiv i, \rho \pmod{\Gamma(1)}$  als

$$h_m(z, z') = \sum_{i,j=1}^r c_{ij} f_i(z) f_j(z')$$

Denn wir können  $h_m(z, z') = h_1(z) f_1(z') + \dots + h_r(z) f_r(z')$ , da  $f_1, \dots, f_r$  eine Basis der Spitzenformen sind, mit Funktionen  $h_j: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ . Diese sind auch Spitzenformen, denn die Matrix in

$$\begin{pmatrix} h_1(z, z_1) \\ \vdots \\ h_m(z, z_r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(z_1) & \dots & f_r(z_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(z_r) & \dots & f_r(z_r) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1(z) \\ \vdots \\ h_r(z) \end{pmatrix}$$

ist invertierbar, sonst würden  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{C}$  existieren, so dass  $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_r f_r = 0$  ist und dies steht im Widerspruch dazu, dass die  $f_j$  eine Basis bilden. Somit sind die  $h_j$  Linearkombination von Spitzenformen und somit selbst Spitzenformen und als Linearkombination von den  $f_j$  darstellbar.

Wende nun (5.1) auf die Funktion  $f = f_\mu$  mit  $1 \leq \mu \leq r$ , an:

$$\begin{aligned}
(f_\mu * h_m)(z') &= \int_{\mathcal{F}} f_\mu(z) \sum_{i,j}^r \overline{c_{ij} f_i(z) f_j(-\overline{z'})} y^{k-2} dx dy \\
&= \sum_{i,j}^r \overline{c_{ij} f_j(z')} \int_{\mathcal{F}} f_\mu(z) \overline{f_i(z)} dx dy \\
&= \sum_{j=1}^r \overline{c_{\mu j} f_j(z')} \langle f_\mu, f_\mu \rangle \stackrel{(i)}{=} C_k m^{1-k} a_m^\mu f_\mu(z')
\end{aligned}$$

Da  $f_1, \dots, f_r$  eine Basis, folgt

$$c_{\mu j} = \begin{cases} 0 & \text{falls } j \neq \mu \\ C_k m^{1-k} \langle f_\mu, f_\mu \rangle^{-1} & \text{falls } j = \mu \end{cases}$$

Damit folgt (ii).

Für (iii) beachte

$$\begin{aligned} C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} h_m(z, -\bar{z}) y^{k-2} dx dy &= \int_{\mathcal{F}} \sum_{i=1}^r a_m^i \frac{f_i(z) \overline{f_i(-\bar{z})}}{\langle f_i, f_i \rangle} y^{k-2} dx dy \\ &= \sum_{i=1}^r a_m^i \int_F \frac{f_i(z) \overline{f_i(z)}}{\langle f_i, f_i \rangle} y^{k-2} dx dy \\ &= \sum_{i=1}^r a_m^i = \mathrm{Tr} T(m) \end{aligned}$$

*g.e.d.*

Die zweite arithmetische Darstellung liefert eine explizite Beschreibung der Spur. Dafür müssen wir etwas ausholen.

**Definition 5.0.2.** Ein Polynom  $q \in \mathbb{Z}[X, Y]$  mit  $q(X, Y) = aX^2 + bXY + cY^2$  heißt ganze, binäre QUADRATISCHE FORM. Diese ist induziert von der Matrix

$$Q = \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix}$$

via  $q(x, y) = (x, y) \cdot Q \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ .

$q$  heißt positiv definit, falls  $q(x, y) > 0$  für alle  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

Wir bezeichnen  $D = b^2 - 4ac$  als die DISKRIMINANTE von  $q$ .

Zwei quadratische Formen  $q$  und  $q'$  heißen äquivalent, falls es eine Matrix  $U \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  gibt mit  $Q' = U^t Q U$ , man kann zeigen, dass  $Q$  eine Klasseninvariante ist. Die Rückrichtung ist im Allgemeinen falsch.

Definiere eine Abbildung

$$H: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

durch

- 
- (i)  $H(n) = 0$  für  $n < 0$ ,
  - (ii)  $H(0) = -\frac{1}{12}$ ,
  - (iii)  $H(n)$  ist für  $n > 0$  die Zahl der Äquivalenzklassen positiv definiter binärer ganzer quadratischen Formen mit Diskriminante  $D = b^2 - 4ac = -n < 0$ , wobei Klassen mit Repräsentanten der Form  $d \cdot (X^2 + Y^2)$  respektive  $e \cdot (X^2 + XY + Y^2)$  mit Vielfachheit  $\frac{1}{2}$  beziehungsweise  $\frac{1}{3}$  gezählt werden sollen.

Man kann zeigen, dass  $H(n)$  wohldefiniert ist. Definiere zudem Polynome via

$$(1 - tx + Nx^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{k+2}(t, N)x^k$$

Mit diesen Werkzeugen gilt nun folgende arithmetische Spurformel:

**Theorem 5.0.3 (SPURFORMEL, EICHLER-SELBERG).** Sei  $k \geq 4$  gerade und  $m > 0$  beliebig. Dann gilt

$$\mathrm{Tr} T(m) = -\frac{1}{2} \sum_{t=-\infty}^{\infty} P_k(t, m) H(4m - t^2) - \frac{1}{2} \sum_{d|m} \min\left(d, \frac{m}{d}\right)^{k-1}. \quad (5.7)$$

**Beweis.** Wir werden den Beweis im Folgenden skizzieren, jedoch stellenweise auf Serge Lang: „Introduction to Modular Forms“ verweisen. Für eine Einführung in die Theorie der quadratischen Formen, welche im Beweis eine wichtige Rolle spielt, verweisen wir auf Don Zagier: „Zetafunktionen und quadratische Körper“. Natürlich ist dieses Hintergrundwissen nicht klausurrelevant.

In [Satz 5.0.1](#) haben wir die Identität

$$\mathrm{Tr} T(m) = C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{ad-bc=m} \frac{y^k}{\left(c|z|^2 + d\bar{z} - az - b\right)^k} \frac{dx dy}{y^2}$$

gezeigt. Die innere Summe ist hierbei invariant unter  $\Gamma(1)$ , da das Integral ansonsten nicht unabhängig von der Wahl des Fundamentalbereiches  $\mathcal{F}$  wäre. Genauer behaupten wir: Ersetzt man  $z$  durch  $\gamma z$  mit  $\gamma \in \Gamma(1)$  in den Summanden, so ist dies äquivalent dazu, die Matrix  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  in der Summation durch  $\gamma^{-1} M \gamma$  zu ersetzen. Denn:

Sei  $\gamma = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \delta & \varepsilon \end{pmatrix} \in \Gamma(1)$  und  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(m)$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \gamma^{-1} M \gamma &= \begin{pmatrix} \varepsilon & -\beta \\ -\delta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \delta & \varepsilon \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varepsilon a - \beta c & \varepsilon b - \beta d \\ -\delta a + \alpha c & -\delta b + \alpha d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \delta & \varepsilon \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$= \begin{pmatrix} \varepsilon a \alpha - \beta c \alpha + \varepsilon b \delta - \beta d \delta & \varepsilon a \beta - \beta^2 c + \varepsilon^2 b - \beta d \varepsilon \\ -\delta a \alpha + \alpha^2 c - \delta^2 b + \alpha d \delta & -\delta a \beta + \alpha c \beta - \delta b \varepsilon + \alpha d \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned} & \frac{\operatorname{Im}(\gamma \circ z)}{c|\gamma \circ z|^2 + d \cdot (\overline{\gamma \circ z}) - a \cdot (\gamma \circ z) - b} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{Im} z}{|\delta z + \varepsilon|^2}}{c \left| \frac{\alpha z + \beta}{\delta z + \varepsilon} \right|^2 + d \frac{\alpha \bar{z} + \beta}{\delta \bar{z} + \varepsilon} - a \frac{\alpha z + \beta}{\delta z + \varepsilon} - b} \\ &= \frac{\operatorname{Im} z}{c(\alpha \bar{z} + \beta)(\alpha z + \beta) + d(\alpha \bar{z} + \beta)(\delta z + \varepsilon) - a(\alpha z + \beta)(\delta \bar{z} + \varepsilon) - b(\delta \bar{z} + \varepsilon)(\delta z + \varepsilon)} \\ &= \frac{\operatorname{Im} z}{|z|^2(c\alpha^2 + d\alpha\delta - a\alpha\delta - b\delta^2) + \bar{z}(c\alpha\beta + d\alpha\varepsilon - a\beta\delta - b\delta\varepsilon) + z(\dots) + \dots}. \end{aligned}$$

Multipliziert man, wie im letzten Schritt angedeutet, den Nenner vollständig aus, sortiert die Summanden nach dem Auftreten von  $z, \bar{z}$  und vergleicht abschließend die Koeffizienten mit den Einträgen von  $\gamma^{-1}M\gamma$ , so ist die Behauptung klar.

Da die Matrizen  $M$  und  $\gamma^{-1}M\gamma$  nicht nur dieselbe Determinante, sondern auch dieselbe Spur haben (rechne nach und beachte  $\alpha\varepsilon - \beta\delta = 1$ ), lässt sich die Summe sogar nach der Spur der Matrizen in  $\Gamma(1)$ -invariante Teile der Form

$$I(m, t) := C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{\substack{ad-bc=m \\ a+d=t}} \frac{y^k}{\left(c|z|^2 + d\bar{z} - az - b\right)^k} \frac{dx dy}{y^2}$$

zerlegen, sodass

$$\operatorname{Tr} T(m) = \sum_{t=-\infty}^{\infty} I(m, t).$$

Wir werden im Folgenden beweisen:

$$\frac{1}{2}(I(m, t) + I(m, -t)) = \begin{cases} -\frac{1}{2}P_k(t, m)H(4m - t^2) & , \text{ falls } t^2 - 4m < 0 \\ \frac{k-1}{24}m^{\frac{k-2}{2}} - \frac{1}{4}m^{\frac{k-1}{2}} & , \text{ falls } t^2 - 4m = 0 \\ -\frac{1}{2}\left(\frac{|t|-u}{2}\right)^{k-1} & , \text{ falls } t^2 - 4m = u^2, u \in \mathbb{N} \\ 0 & , \text{ falls } t^2 - 4m > 0 \text{ kein Quadrat.} \end{cases} \quad (5.8)$$

Wie man durch eine Rechnung einsieht, impliziert dies die Aussage des Theorems: Hierbei nutzt man aus, dass  $H$  für negative Argumente verschwindet und  $H(0) := -\frac{1}{12}$  ist, um

die linke Summe in (5.7) von solchen  $t$  mit  $t^2 - 4m < 0$  auf alle  $t \in \mathbb{Z}$  auszudehnen. Die rechte Summe kommt durch die Fälle  $t^2 - 4m = u^2$  mit  $u \in \mathbb{N}$  zustande, denn: Es gilt

$$m = \frac{t^2 - u^2}{4} = \frac{t+u}{2} \cdot \frac{t-u}{2} = \left| \frac{t+u}{2} \right| \cdot \left| \frac{t-u}{2} \right|,$$

wobei  $t, u$  wegen  $t^2 - 4m = u^2$  entweder beide gerade oder beide ungerade sind. Damit sind die beiden Faktoren rechts immer ganzzahlig und wegen des Absolutbetrages positiv. Da über alle  $t \in \mathbb{Z}$  summiert wird, trifft  $\left| \frac{t+u}{2} \right|$  jeden Teiler  $d$  von  $m$ . Gleichzeitig trifft  $\left| \frac{t-u}{2} \right|$  den Teiler  $\frac{m}{d}$ . Und wie man sich leicht überzeugt, ist

$$\frac{|t| - u}{2} = \min \left( \left| \frac{t+u}{2} \right|, \left| \frac{t-u}{2} \right| \right) = \min \left( d, \frac{m}{d} \right).$$

Wir müssen im Folgenden also „nur“ noch das Integral  $I(m, t)$  studieren. Dazu bemerken wir zunächst folgendes Lemma:

**Lemma 5.0.4.** Es seien  $\mathcal{M}_t(m)$  die Menge der ganzzahligen Matrizen mit Determinante  $m$  und Spur  $t$  sowie  $Q_D$  die Menge der binären quadratischen Formen mit Diskriminante  $D = t^2 - 4m$ . Dann sind die beiden Mengen gleichmächtig.

**Beweis.** Wir konstruieren eine konkrete Bijektion

$$\varphi: \mathcal{M}_t(m) \rightarrow Q_D, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto g(u, v) = cu^2 + (d-a)uv - bv^2.$$

Diese ist wegen

$$\begin{aligned} D_g &= (d-a)^2 + 4bc = d^2 - 2ad + a^2 + 4ad + 4(bc - ad) \\ &= (d+a)^2 - 4(ad - bc) = t^2 - 4m \end{aligned}$$

wohldefiniert. Betrachte nun einen Kandidaten für die Umkehrabbildung

$$\varphi^{-1}: Q_D \rightarrow \mathcal{M}_t(m), g(u, v) = \alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2 \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(t - \beta) & -\gamma \\ \alpha & \frac{1}{2}(t + \beta) \end{pmatrix}.$$

Für die Wohldefiniertheit dieser Abbildung rechnet man nach, dass die angegebene Matrix Determinante  $\frac{1}{4}(t^2 - \beta^2) + \alpha\gamma = \frac{1}{4}(t^2 - D_g) = m$ , Spur  $t$  sowie ganzzahlige Einträge besitzt. Letzteres folgt aus  $\alpha, \gamma, \beta, t$  ganzzahlig und

$$D_g = t^2 - 4m = \beta^2 - 4\alpha\gamma \implies t^2 \equiv \beta^2 \pmod{2} \implies t \equiv \beta \pmod{2}.$$

Wendet man nun auf  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_t(m)$  die Abbildungen  $\varphi$  und  $\varphi^{-1}$  an, so erhält man mit  $\alpha = c$ ,  $\beta = d - a$  und  $\gamma = -b$  nach Definition von  $\varphi$  sowie mit  $t = a + d$  die Matrix

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}(t - \beta) & -\gamma \\ \alpha & \frac{1}{2}(t + \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(a + d - (d - a)) & b \\ c & \frac{1}{2}(a + d + (d - a)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

und es folgt  $\varphi^{-1} \circ \varphi = \mathrm{id}_{\mathcal{M}_t(m)}$ . Analog lässt sich auch  $\varphi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{id}_{Q_D}$  zeigen. Damit ist das Lemma bewiesen. *g.e.s.*

Für jede binäre quadratische Form  $g(u, v) = \alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2$  und  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ ,  $t \in \mathbb{R}$  beliebig definieren wir nun

$$R_g(z, t) := \frac{y^k}{(\alpha(x^2 + y^2) + \beta x + \gamma - ity)^k}.$$

Beachte, dass  $g$  von der Matrix  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  herrührt via der Bijektion  $\varphi$  aus Lemma 5.0.4 durch  $\alpha = c$ ,  $\beta = d - a$  und  $\gamma = -b$ . Damit gilt

$$I(m, t) = C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g = D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2},$$

wobei sich die Summe über alle binären quadratischen Formen  $g \in Q_D$ , also mit Diskriminante  $D_g = D := t^2 - 4m$ , erstreckt.

Ein beliebiges Element  $\gamma \in \Gamma(1)$  liefert, angewendet auf  $g$  durch

$$\gamma g(u, v) := g\left(\gamma \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}\right),$$

wieder eine quadratische Form  $\gamma g$ . Es gilt zudem  $R_{\gamma g}(z, t) = R_g(\gamma z, t)$ . Daher können wir für jede Diskriminante  $D = t^2 - 4m \equiv 0, 1 \pmod{4}$  (Übung!) die Summe über alle quadratischen Formen mit dieser Diskriminante wie folgt aufteilen:

$$\sum_{g, D_g = D} R_g(z, t) = \sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \sum_{\gamma \in \Gamma(1)/\Gamma_g} R_{\gamma g}(z, t) = \sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \sum_{\gamma \in \Gamma(1)/\Gamma_g} R_g(\gamma z, t).$$

Hierbei erstreckt sich die erste Summe nur noch über ein Vertretersystem aller Klassen modulo  $\Gamma(1)$  von binären quadratischen Formen  $g$  mit Diskriminante  $D_g = D$ . Die zweite Summe erstreckt sich über alle Nebenklassen  $\Gamma(1)/\Gamma_g$ , wobei  $\Gamma_g$  die Fixgruppe von  $g$  ist.

Für  $D \neq 0$  gibt es nur endlich viele Klassen modulo  $\Gamma(1)$ , sodass die erste Summe endlich ist und wir schreiben können:

$$\int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g = D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} = \sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \quad (5.9)$$

mit

$$\mathcal{F}_g = \bigcup_{\gamma \in \Gamma(1)/\Gamma_g} \gamma \mathcal{F}$$

einem Fundamentalbereich für die Operation von  $\Gamma_g$  auf  $\mathbb{H}$ .

Für  $D = 0$  ist dagegen ein (unendliches) System von Repräsentanten gegeben durch die Formen  $\{g_r(u, v) = rv^2 \mid r \in \mathbb{Z}\}$ . Die Fixgruppe eines solchen  $g_r$  ist gegeben durch

$$\Gamma_{g_r} = \begin{cases} \Gamma(1) & , \text{ falls } r = 0 \\ \Gamma(1)_\infty & , \text{ falls } r \neq 0. \end{cases}$$

Damit finden wir

$$\int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=0} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} = \int_{\mathcal{F}} R_{g_0}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + \int_{\mathcal{F}_\infty} \sum_{\substack{r \in \mathbb{Z} \\ r \neq 0}} R_{g_r}(z, t) \frac{dx dy}{y^2}, \quad (5.10)$$

wobei  $\mathcal{F}_\infty$  ein Fundamentalbereich für die Operation von  $\Gamma(1)_\infty$  auf  $\mathbb{H}$  ist. Ein Beispiel hierfür ist der Vertikalstreifen  $\{z \in \mathbb{H} \mid 0 < \operatorname{Re}(z) < 1\}$ .

Wir zeigen nun die in (5.8) behaupteten Formeln für den Mittelwert der Integrale

$$\frac{1}{2} (I(m, t) + I(m, -t))$$

abhängig von  $D := t^2 - 4m$  und unterscheiden dieselben vier Fälle:

*Fall 1:*  $D < 0$ . In diesem Fall ist  $\Gamma_g$  endlich (genau genommen von Ordnung  $1 \leq |\Gamma_g| \leq 3$ , Beweis entfällt aus Zeitgründen). Für eine quadratische Form  $g(u, v) = \alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2$  mit Diskriminante  $D_g = D = t^2 - 4m$  erhalten wir demnach:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} &= \frac{1}{|\Gamma_g|} \int_{\mathbb{H}} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \frac{1}{|\Gamma_g|} \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{(\alpha(x^2 + y^2) + \beta x + \gamma - ity)^k} dx dy. \end{aligned}$$

Fasse nun die obere Halbebene  $\mathbb{H}$  als Teilmenge des  $\mathbb{R}^2$  auf und nutze den Diffeomorphismus

$$\Phi : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}, (x, y) \mapsto \left( \frac{2x - \beta}{2\alpha}, \frac{y}{\alpha} \right)$$

mit Jacobi-Matrix

$$D\Phi = \begin{pmatrix} \alpha^{-1} & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \implies \det D\Phi = \frac{1}{\alpha^2}$$

zur Substitution per Transformationssatz:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} &= \frac{1}{|\Gamma_g|} \int_{\mathbb{H}} \frac{1}{\alpha^2} \frac{\left(\frac{y}{\alpha}\right)^{k-2}}{\left(\alpha \left(\left(\frac{2x-\beta}{2\alpha}\right)^2 + \left(\frac{y}{\alpha}\right)^2\right) + \beta \left(\frac{2x-\beta}{2\alpha}\right) + \gamma - it \frac{y}{\alpha}\right)^k} dx dy \\ &= \frac{1}{|\Gamma_g|} \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{\left((x^2 + y^2) - \frac{\beta^2}{4} + \gamma\alpha - ity\right)^k} dx dy \\ &= \frac{1}{|\Gamma_g|} \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{\left(|z|^2 - \frac{1}{4}D_g - ity\right)^k} dx dy. \end{aligned}$$

Im letzten Schritt geht hierbei ein, dass  $D_g = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ , also  $-\frac{\beta^2}{4} + \alpha\gamma = -\frac{1}{4}D_g$ . Das Integral hängt somit nicht von den konkreten Parametern  $\alpha, \beta, \gamma$  der Form  $g$  ab, sondern nur von ihrer Diskriminante  $D_g$ . Da wir nur Formen  $g$  mit Diskriminante  $D_g = D = t^2 - 4m$  betrachten, können wir mit

$$I(D, t) := \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{\left(|z|^2 - \frac{1}{4}D - ity\right)^k} dx dy$$

schreiben:

$$\sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} = \sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \frac{1}{|\Gamma_g|} I(D, t) = 2H(-D) \cdot I(D, t)$$

Die letzte Umformung liefert einen derart einfachen Term, da die Definition von  $H$  wegen

$$|\Gamma_g| = \begin{cases} 2 & , \text{ falls } g \sim d \cdot (X^2 + Y^2) \text{ für ein } d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ 3 & , \text{ falls } g \sim e \cdot (X^2 + XY + Y^2) \text{ für ein } e \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ 1 & , \text{ sonst} \end{cases}$$

bereits den Vorfaktor  $\frac{1}{|\Gamma_g|}$  beinhaltet. Der Faktor 2 rührt von der Tatsache her, dass in der Definition von  $H$  nur Klassen positiv definiter quadratischer Formen gezählt werden. Die obige Summe berücksichtigt jedoch Klassen aller Formen  $g$  mit geeigneter Diskriminante  $D_g = D$ . Da alle diese Formen wegen  $D_g = D < 0$  definit (also entweder positiv oder negativ definit) sind, besteht die Summe aus genau doppelt so vielen Summanden wie durch  $H$  angegeben (zu jeder positiv definiten Form erhält man eine negativ definite Form gleicher Diskriminante durch Multiplikation mit  $-1$  und umgekehrt).

Nutzt man nun die für beliebiges  $A \in \mathbb{C}_-$  gültige Formel

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + A)^{-k} dx = \frac{\pi}{(k-1)!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdots \left(k - \frac{3}{2}\right) \cdot A^{\frac{1}{2}-k},$$

---

erhält man mit  $A = y^2 - ity - \frac{1}{4}D$  schließlich

$$\begin{aligned}
I(D, t) &= \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{\left(|z|^2 - \frac{1}{4}D - ity\right)^k} dx dy \\
&= \int_0^\infty y^{k-2} \int_{-\infty}^\infty (x^2 + y^2 - ity - \frac{1}{4}D)^{-k} dx dy && \left| \text{siehe oben} \right. \\
&= \frac{\pi}{(k-1)!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdots \left(k - \frac{3}{2}\right) \int_0^\infty (y^2 - ity - \frac{1}{4}D)^{\frac{1}{2}-k} y^{k-2} dy && \left| \text{Leibniz} \right. \\
&= \frac{\pi}{(k-1)!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{i^{k-2}} \left(\frac{d}{dt}\right)^{k-2} \int_0^\infty (y^2 - ity - \frac{1}{4}D)^{-\frac{3}{2}} dy \\
&= \frac{\pi i^{k-2}}{2(k-1)!} \left(\frac{d}{dt}\right)^{k-2} \left[ \frac{4}{t^2 - D} \cdot \frac{y - \frac{1}{2}it}{\sqrt{y^2 - ity - \frac{1}{4}D}} \right]_0^\infty && \left| \text{nachrechnen!} \right. \\
&= \frac{\pi i^{k-2}}{2(k-1)!} \left(\frac{d}{dt}\right)^{k-2} \left( \frac{4}{\sqrt{|D|}} \cdot \frac{1}{\sqrt{|D|} - it} \right) \\
&= \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{|D|}} \cdot \frac{i^{k-2}}{(k-2)!} \left(\frac{d}{dt}\right)^{k-2} \left( \frac{1}{\sqrt{|D|} - it} \right) \\
&= \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{|D|}} \cdot \frac{1}{\left(\sqrt{|D|} - it\right)^{k-1}}.
\end{aligned}$$

Zusammengefasst gilt also (unter Beachtung von  $D = t^2 - 4m < 0$ ), dass

$$\begin{aligned}
I(m, t) &= C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g = D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\
&\stackrel{(5.9)}{=} C_k^{-1} m^{k-1} \sum_{\substack{g, D_g = D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\
&= C_k^{-1} m^{k-1} \cdot 2H(-D) \cdot I(D, t) \\
&= C_k^{-1} m^{k-1} \cdot 2H(4m - t^2) \cdot \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{4m - t^2}} \cdot \frac{1}{\left(\sqrt{4m - t^2} - it\right)^{k-1}},
\end{aligned}$$

was sich mit  $\rho := \frac{1}{2}(t + i\sqrt{4m - t^2})$  nach kurzer Rechnung vereinfachen lässt zu:

$$I(m, t) = \frac{\bar{\rho}^{k-1}}{\rho - \bar{\rho}} H(4m - t^2).$$

Beachtet man nun, dass

$$\rho + \bar{\rho} = \frac{1}{2} \left( t + i\sqrt{4m - t^2} \right) + \frac{1}{2} \left( t - i\sqrt{4m - t^2} \right) = t$$

und

$$\rho\bar{\rho} = |\rho|^2 = \frac{1}{4}|t^2 + 4m - t^2| = m,$$

so kann man für die per

$$(1 - tx + Nx^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{k+2}(t, N)x^k = P_2(t, N) + P_3(t, N)x + P_4(t, N)x^2 + \dots$$

definierten Polynome  $P_k(t, N)$  mithilfe von Partialbruchzerlegung und der geometrischen Reihe die Beziehung

$$P_k(t, m) = \frac{\rho^{k-1} - \bar{\rho}^{k-1}}{\rho - \bar{\rho}}$$

zeigen.

Daraus folgt in der Tat wie in (5.8) behauptet

$$\frac{1}{2} (I(m, t) + I(m, -t)) = -\frac{1}{2} \left( \frac{\rho^{k-1}}{\rho - \bar{\rho}} + \frac{-\bar{\rho}^{k-1}}{\rho - \bar{\rho}} \right) H(4m - t^2) = -\frac{1}{2} P_k(t, m) H(4m - t^2).$$

Fall 2:  $D = 0$ . Wir benutzen hierfür die oben hergeleitete Formel (5.10)

$$\int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=0} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} = \int_{\mathcal{F}} R_{g_0}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + \int_{\mathcal{F}^\infty} \sum_{\substack{r \in \mathbb{Z} \\ r \neq 0}} R_{g_r}(z, t) \frac{dx dy}{y^2}.$$

Wegen  $g_0(u, v) \equiv 0$  sind alle Parameter  $\alpha, \beta, \gamma$  der quadratischen Form  $g_0$  gleich 0, sodass sich  $R_{g_0}$  und damit der erste Summand leicht berechnen lassen:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{F}} R_{g_0}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} &= \int_{\mathcal{F}} \left( \frac{y}{-ity} \right)^k \frac{dx dy}{y^2} = \int_{\mathcal{F}} \left( \frac{i}{t} \right)^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \left( \frac{i}{t} \right)^k \int_{\mathcal{F}} \frac{dx dy}{y^2} = \frac{(-1)^{\frac{k}{2}}}{t^k} \cdot \frac{\pi}{3} = (-1)^{\frac{k}{2}} \frac{\pi}{3t^k}. \end{aligned}$$

Für den zweiten Term finden wir mit  $g_r(u, v) = rv^2$ , dass

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{F}_\infty} \sum_{\substack{r \in \mathbb{Z} \\ r \neq 0}} R_{g_r}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} &= \int_0^\infty \int_0^1 y^{k-2} \sum_{\substack{r \in \mathbb{Z} \\ r \neq 0}} (r - ity)^{-k} dx dy && \left| \text{PBZ des cot} \right. \\
&= \frac{i^{k-2}}{(k-2)!} \left( \frac{d}{dt} \right)^{k-2} \int_0^\infty \frac{1}{t^2 y^2} - \frac{\pi^2}{\sinh^2(\pi ty)} dy \\
&= \frac{i^{k-2}}{(k-1)!} \left( \frac{d}{dt} \right)^{k-2} \frac{\pi}{|t|} \\
&= (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{\pi}{k-1} |t|^{-k+1}.
\end{aligned}$$

Für  $t = \pm 2\sqrt{m}$  (da  $D := t^2 - 4m = 0$ ) bekommen wir damit nach kurzer Rechnung

$$\begin{aligned}
I(m, t) &= C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=0} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^{k-2}} \\
&= C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} R_{g_0}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}_\infty} \sum_{\substack{r \in \mathbb{Z} \\ r \neq 0}} R_{g_r}(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\
&= C_k^{-1} m^{k-1} (-1)^{\frac{k}{2}} \frac{\pi}{3t^k} + C_k^{-1} m^{k-1} (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{\pi}{k-1} |t|^{-k+1} \\
&= \frac{k-1}{24} m^{\frac{k-2}{2}} - \frac{1}{4} m^{\frac{k-1}{2}}.
\end{aligned}$$

*Fall 3:*  $D = u^2$  mit  $u \in \mathbb{N}$ . Wie in Fall 1 ( $D < 0$ ) gibt es hier nur eine endliche Anzahl von Klassen mit Diskriminante  $D$  und  $\Gamma_g$  ist eine endliche Gruppe. Es folgt damit ähnlich wie in Fall 1

$$\int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} = H_D \cdot I(D, t)$$

mit

$$H_D := \sum_{\substack{g, D_g=D \\ g \pmod{\Gamma(1)}}} \frac{1}{|\Gamma_g|}$$

und (vergleiche Fall 1)

$$I(D, t) := \int_{\mathbb{H}} \frac{y^{k-2}}{\left( |z|^2 - \frac{1}{4}D - ity \right)^k} dx dy.$$



Man kann nun zeigen, dass in Fall 3 alle Fixgruppen  $\Gamma_g$  trivial sind (d.h.  $|\Gamma_g| = 1$ ) und es darüber hinaus genau  $u$  Klassen quadratischer Formen  $g$  mit Diskriminante  $D_g = u^2$  gibt. Hieraus folgt  $H_D = u$ .

Analog zu Fall 1 können wir zudem wieder das Integral umformen zu

$$I(D, t) = \frac{\pi i^{k-2}}{2(k-1)!} \left( \frac{d}{dt} \right)^{k-2} \left[ \frac{4}{t^2 - D} \frac{y - \frac{1}{2}it}{\sqrt{y^2 - ity - \frac{1}{4}D}} \right]_0^\infty,$$

wobei der ausgewertete Term rechts diesmal unter Beachtung von  $D = t^2 - 4m > 0$  zu

$$\frac{-4}{\sqrt{D}} \frac{1}{\sqrt{D} + |t|}$$

wird. Es folgt wegen  $\sqrt{D} = \sqrt{u^2} = u$ , dass

$$I(D, t) = (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{D} + |t|)^{k-1}} = (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{(u + |t|)^{k-1}},$$

und somit nach kurzer Rechnung

$$\begin{aligned} I(m, t) &= C_k^{-1} m^{k-1} \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\ &= C_k^{-1} m^{k-1} H_D \cdot I(D, t) \\ &= C_k^{-1} m^{k-1} (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{2\pi}{k-1} \cdot \frac{1}{(u + |t|)^{k-1}} \\ &= -\frac{1}{2} \left( \frac{|t| - u}{2} \right)^{k-1}. \end{aligned}$$

*Fall 4:*  $D > 0$ , aber keine Quadratzahl. Wir zeigen in diesem Fall wie in (5.8) behauptet, dass

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (I(m, t) + I(m, -t)) &= \frac{1}{2} C_k^{-1} m^{k-1} \cdot \left( \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=D} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + \int_{\mathcal{F}} \sum_{g, D_g=D} R_g(z, -t) \frac{dx dy}{y^2} \right) \\ &\stackrel{(5.9)}{=} \frac{1}{2} C_k^{-1} m^{k-1} \cdot \sum_{\substack{g, D_g=D \\ g(\bmod \Gamma(1))}} \left( \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, -t) \frac{dx dy}{y^2} \right) = 0, \end{aligned}$$

indem wir für alle Formen  $g$  mit  $D_g = D$  zeigen, dass

$$\int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} + \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, -t) \frac{dx dy}{y^2} = 0.$$

Sei hierfür  $g(u, v) = \alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2$  eine quadratische Form mit Diskriminante  $D > 0$  kein Quadrat und seien außerdem  $w > w'$  die Lösungen der Gleichung  $\alpha u^2 + \beta u + \gamma = 0$  (wegen  $D_g = D > 0$  gibt es zwei verschiedene reelle Lösungen). Dann transformiert die Matrix

$$M = (w - w')^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} w' & w \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$$

$g$  in  $Mg$  mit

$$Mg(u, v) = \sqrt{D}uv.$$

In der Tat: Ist  $T = \sqrt{w - w'}$ , so gilt

$$\begin{aligned} M^t \begin{pmatrix} \alpha & \frac{\beta}{2} \\ \frac{\beta}{2} & \gamma \end{pmatrix} M &= \frac{1}{T^2} \begin{pmatrix} w' & 1 \\ w & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \frac{\beta}{2} \\ \frac{\beta}{2} & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w' & w \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{T^2} \begin{pmatrix} \alpha w' + \frac{\beta}{2} & \frac{\beta}{2} w' + \gamma \\ \alpha w + \frac{\beta}{2} & \frac{\beta}{2} w + \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w' & w \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{T^2} \begin{pmatrix} \alpha w'^2 + \frac{\beta}{2} w' + \frac{\beta}{2} w' + \gamma & \alpha w w' + \frac{\beta}{2} w + \frac{\beta}{2} w' + \gamma \\ \alpha w w' + \frac{\beta}{2} w' + \frac{\beta}{2} w + \gamma & \alpha w^2 + \frac{\beta}{2} w + \frac{\beta}{2} w + \gamma \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{T^2} \begin{pmatrix} \alpha w'^2 + \beta w' + \gamma & \alpha w w' + \frac{\beta}{2}(w + w') + \gamma \\ \alpha w w' + \frac{\beta}{2}(w' + w) + \gamma & \alpha w^2 + \beta w + \gamma \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wegen  $\det M = \det M^t = \pm 1$  bleibt die Determinante der Matrix (und somit auch die Diskriminante der von der Matrix induzierten quadratischen Form) trotz Transformation unverändert. Da sowohl  $w$  als auch  $w'$  die Gleichung  $\alpha u^2 + \beta u + \gamma = 0$  lösen, verschwinden beide Diagonaleinträge und die Form  $Mg$  lässt sich schreiben als  $Mg(u, v) = buv$  für ein  $b \in \mathbb{R}$ . Hieraus erhält man nach kurzer Rechnung wie behauptet  $Mg(u, v) = \sqrt{D}uv$ .

Nach nichttrivialen Überlegungen weiß man: Die Gruppe  $M^{-1}\Gamma_g M$  ist zyklisch und kann durch  $\begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \frac{1}{\varepsilon} \end{pmatrix}$  erzeugt werden, wobei  $\varepsilon > 1$  die Fundamenteleinheit des Ganzheitsrings  $R$  in  $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$  ist (hier geht auch ein, dass  $D$  keine Quadratzahl ist, sonst wäre  $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q}$ ). Daher können wir den Fundamentalbereich  $\mathcal{F}_g$  so wählen, dass  $M^{-1}\mathcal{F}_g$  ein Kreisring  $M^{-1}\mathcal{F}_g = \{z \in \mathbb{H} \mid r_0 \leq |z| \leq \varepsilon^2 r_0\}$  in der oberen Halbebene ist. Es gilt somit

$$\begin{aligned} I_+ &:= \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, t) \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \int_{\mathcal{F}_g} R_{Mg}(M^{-1}z, t) \frac{dx dy}{y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{M^{-1}\mathcal{F}_g} R_{Mg}(z, t) \frac{dx \, dy}{y^2} \quad \left| Mg(u, v) = \sqrt{D}uv \right. \\
 &= \int_{\substack{y>0 \\ r_0 \leq |z| \leq \varepsilon^2 r_0}} \left( \sqrt{D}x - ity \right)^{-k} y^{k-2} \, dx \, dy.
 \end{aligned}$$

Erhalte nun mit Polarkoordinaten  $z = x + iy = re^{i\vartheta}$ , dass

$$\begin{aligned}
 I_+ &= \int_0^\pi \int_{r_0}^{r_0 \varepsilon^2} \left( \sqrt{D} \cos \vartheta - it \sin \vartheta \right)^{-k} (\sin \vartheta)^{k-2} \frac{dr \, d\vartheta}{r} \\
 &= \log(\varepsilon^2) \int_0^\pi \left( \sqrt{D} \cos \vartheta - it \sin \vartheta \right)^{-k} (\sin \vartheta)^{k-2} \, d\vartheta
 \end{aligned}$$

und wegen der Symmetrieeigenschaften von  $\sin$  und  $\cos$  analog

$$\begin{aligned}
 I_- &:= \int_{\mathcal{F}_g} R_g(z, -t) \frac{dx \, dy}{y^2} \\
 &= \log(\varepsilon^2) \int_0^\pi \left( \sqrt{D} \cos \vartheta + it \sin \vartheta \right)^{-k} (\sin \vartheta)^{k-2} \, d\vartheta \\
 &= \log(\varepsilon^2) \int_{-\pi}^0 \left( \sqrt{D} \cos \vartheta - it \sin \vartheta \right)^{-k} (\sin \vartheta)^{k-2} \, d\vartheta.
 \end{aligned}$$

Wir sind also fertig, wenn wir

$$I := \frac{I_+ + I_-}{\log(\varepsilon^2)} = \int_{-\pi}^\pi \left( \sqrt{D} \cos \vartheta - it \sin \vartheta \right)^{-k} (\sin \vartheta)^{k-2} \, d\vartheta = 0$$

zeigen können. Schreibe hierfür das Integral um zum Kurvenintegral

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\pi}^\pi \left( \sqrt{D} \frac{e^{i\vartheta} + e^{-i\vartheta}}{2} - it \frac{e^{i\vartheta} - e^{-i\vartheta}}{2i} \right)^{-k} \left( \frac{e^{i\vartheta} - e^{-i\vartheta}}{2i} \right)^{k-2} \, d\vartheta \\
 &= \int_{-\pi}^\pi \left( \sqrt{D} i \frac{e^{i\vartheta} + e^{-i\vartheta}}{e^{i\vartheta} - e^{-i\vartheta}} - it \right)^{-k} \left( \frac{e^{i\vartheta} - e^{-i\vartheta}}{2i} \right)^{-2} \, d\vartheta \\
 &= \int_{-\pi}^\pi \left( \sqrt{D} i \frac{e^{2i\vartheta} + 1}{e^{2i\vartheta} - 1} - it \right)^{-k} \left( \frac{e^{2i\vartheta} - 1}{2i} \cdot e^{-i\vartheta} \right)^{-2} \, d\vartheta \\
 &= \frac{1}{2i} \int_{-\pi}^\pi \left( \sqrt{D} i \frac{e^{2i\vartheta} + 1}{e^{2i\vartheta} - 1} - it \right)^{-k} \left( \frac{e^{2i\vartheta} - 1}{2i} \right)^{-2} 2i e^{2i\vartheta} \, d\vartheta
 \end{aligned}$$

---


$$= \frac{1}{2i} \int_{\mathcal{C}} \left( \sqrt{D}i \frac{z+1}{z-1} - it \right)^{-k} \left( \frac{z-1}{2i} \right)^{-2} dz$$

mit  $\mathcal{C}: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}, \vartheta \mapsto e^{2i\vartheta}$  geschlossen. Wegen  $k \geq 4 > 2$  hebt der linke Faktor die Polstelle des rechten Faktors bei  $z = 1$ . Die Polstelle des linken Terms liegt bei

$$\sqrt{D}i \frac{z+1}{z-1} - it \stackrel{!}{=} 0 \quad \implies \quad z \stackrel{!}{=} \frac{\frac{t}{\sqrt{D}} + 1}{\frac{t}{\sqrt{D}} - 1} > 1,$$

sodass der Integrand für  $\delta > 0$  klein genug auf der Kreisscheibe  $U_{1+\delta}(0) \supset \overline{\mathbb{E}}$  holomorph ist. Nach dem Residuensatz ist das Integral entlang  $\mathcal{C} = \partial\mathbb{E}$  daher 0. Damit folgt für  $D = t^2 - 4m > 0$  kein Quadrat, dass tatsächlich  $\frac{1}{2} (I(m, t) + I(m, -t)) = 0$  gilt.

Hiermit haben wir (5.8) vollständig verifiziert und damit die in (5.7) behauptete arithmetische Spurformel bewiesen.

*q.e.d.*

## 6. L-Reihen zu Modulformen

### 6.1. Dirichletreihen

*Ziel:* Angabe elementarer Eigenschaften von „Dirichletreihen“, welche eine besondere Stellung in der analytischen Theorie der Zahlen einnehmen.

**Definition 6.1.1.** Formell ist eine DIRICHLETREIHE eine Reihe der Form

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(n) e^{-\lambda_n s},$$

wobei die  $\lambda_n$  reelle Zahlen sind mit  $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$  und  $s = \sigma + it$  eine komplexe Zahl ist.

**Bemerkung 6.1.2.**

- (i)  $\lambda_n = n$  ist naheliegend führt aber mit  $z = e^{-s}$  zur Theorie der Potenzreihen, die wir schon ausgiebig in der Funktionentheorie I studiert haben.
- (ii)  $\lambda_n = \log(n)$ : Mit dieser Wahl lässt sich die obere Reihe „schöner“ schreiben als

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(n) n^{-s}. \tag{6.1}$$

Das ist der für die Zahlentheorie relevante Fall. Eine Reihe der Gestalt (6.1) heißt GEWÖHNLICHE DIRICHLETREIHE.

- (iii) Im Gegensatz zu Potenzreihen weisen Dirichletreihen ein anderes Konvergenzverhalten auf als das „auf Kreisscheiben“ auf. Während also für eine Potenzreihe  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a(n) z^n$  stets ein  $0 \leq R \leq \infty$  existiert, so dass  $f$  für  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z| < R$  konvergiert und für  $|z| > R$  divergiert, „konvergieren Dirichletreihen auf Halbebenen statt Kreisscheiben“. Dies präzisiert der nächste Satz

## 6.1. Dirichletreihen

---

**Satz 6.1.3.** Es sei  $F(s) := \sum_{n=1}^{\infty} a(n)e^{-\lambda_n s}$  eine Dirichletreihe wie in [Definition 6.1.1](#) definiert. Ist diese für ein  $s = s_0$  konvergent, so konvergiert sie auch für alle  $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0 (= \operatorname{Re}(s_0))$  und gleichmäßig auf Kompakten Mengen.

Somit existiert eine reelle Zahl  $\sigma_0$ , so dass die Reihe für alle  $s$  mit  $\operatorname{Re} s > \sigma_0$  konvergiert und für alle  $\operatorname{Re}(s) < \sigma_0$  divergiert (falls überall konvergent, setze  $\sigma_0 = -\infty$ , falls überall divergent setze  $\sigma_0 = \infty$ ).

Die in dem Gebiet  $\{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > \sigma_0\}$  durch  $F(s)$  definierte Funktion ist dort holomorph, die Ableitungen sind gegeben durch

$$F^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^k a(n) e^{-\lambda_n s},$$

wobei die rechts stehende Dirichletreihe auch für  $\sigma > \sigma_0$  konvergiert.

Die Zahl  $\sigma_0$  heißt KONVERGENZABSZISSE der Dirichletreihe  $F(s)$ .

**Beweis.** Es genügt die gleichmäßige Konvergenz im gesamten Bereich zu zeigen, da damit die Existenz eines  $\sigma_0$  folgt und die Holomorphieaussagen aus der gleichmäßigen Konvergenz über den Satz von Weierstraß ersichtlich sind.

Wir zeigen, dass die Reihe in jedem Gebiet (siehe [Abbildung 6.1](#))

$$|\operatorname{Arg}(s - s_0)| \leq \frac{\pi}{2} - \varepsilon < \frac{\pi}{2} \tag{6.2}$$

gleichmäßig konvergiert. Das ist stärker als die Aussage des Satzes, da jede kompakte Menge  $K \subseteq \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > \sigma_0\}$  in einem solchen Gebiet liegt.

Wir führen die Bezeichnungen

$$A(N) = \sum_{n=1}^N a(n), \quad A(M, N) = \sum_{n=M}^N a(n), \quad A(M, M-1) = 0$$

ein, die in diesem Paragraphen mehrmals benutzt werden. Ohne Einschränkung können wir  $s_0 = 0$  voraussetzen (indem wir  $s$  durch  $s + s_0$  und  $a(n)$  durch  $a(n)e^{-\lambda_n s_0}$  ersetzen). Dann ist  $\sum_{n=1}^{\infty} a(n)$  konvergent und es gibt zu vorgegebenen  $\varepsilon > 0$  ein  $N_0$ , so dass




Abbildung 6.1.: Das Gebiet aus (6.2)

$|A(M, N)| \leq \varepsilon$  für alle  $N_0 \leq M < N$ . Dann gilt für  $N > M \geq N_0$ :<sup>1</sup>

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=M}^N a(n)e^{-\lambda_n s} &= \sum_{n=M}^N (A(M, n) - A(M, n-1))e^{-\lambda_n s} \\
 &= A(M, M)e^{-\lambda_M s} - A(M, M)e^{-\lambda_{M+1} s} + A(M, M+1)e^{-\lambda_{M+1} s} \\
 &\quad + \dots + A(M, N-1)e^{-\lambda_{N-1} s} - A(M, N-1)e^{-\lambda_N s} + A(M, N)e^{-\lambda_N s} \\
 &= \sum_{n=M}^{N-1} A(M, n)(e^{-\lambda_n s} - e^{-\lambda_{n+1} s}) + A(M, N)e^{-\lambda_N s}.
 \end{aligned}$$

<sup>1</sup>dieses Verfahren wir auch als abelsche Summation bezeichnet

## 6.1. Dirichletreihen

---

Es ist

$$\begin{aligned}
 \left| e^{-\lambda s} - e^{-\lambda_{n+1}s} \right| &= \left| s \int_{\lambda_n}^{\lambda_{n+1}} e^{-sn} \, dn \right| \\
 &\leq |s| \int_{\lambda_n}^{\lambda_{n+1}} |e^{-sn}| \, dn \\
 &= \frac{|s|}{\sigma} (e^{-\lambda\sigma} - e^{-\lambda_{n+1}\sigma}) \quad (\sigma = \operatorname{Re} s).
 \end{aligned}$$

Die Größe  $\frac{|s|}{\sigma}$  ist in den Bereichen  $|\operatorname{Arg}(s)| \leq \frac{\pi}{2} - \delta$  durch eine Konstante  $C_\delta > 0$  beschränkt. Somit ist für  $\sigma > 0$ :

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{n=M}^N a(n) e^{-\lambda_n s} \right| &\leq \sum_{n=M}^{N-1} |A(M, n)| \cdot |e^{-\lambda_n s} - e^{-\lambda_{n+1}s}| + |A(M, N)| \cdot |e^{-\lambda_N s}| \\
 &\leq C_\delta \varepsilon \sum_{n=M}^{N-1} (e^{-\lambda_n \sigma} - e^{-\lambda_{n+1}\sigma}) + \varepsilon e^{-\lambda_N \sigma} \\
 &\leq C_\delta \varepsilon e^{-\lambda_M \sigma} + \varepsilon e^{-\lambda_N \sigma} \\
 &\leq (C_\delta + 1) e^{-\lambda_{N_0} \sigma} \varepsilon,
 \end{aligned}$$

womit die gleichmäßige Konvergenz in diesem Bereich folgt.

*g.e.d.*

Analog zur bedingten Konvergenzabszissen kann man (bei gewöhnlichen Dirichletreihen) die absoluten Konvergenzabszisse definieren als die bedingten Abszisse von

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a(n)| n^{-s}.$$

Wir bezeichnen  $\sigma_a$  als die absoluten und  $\sigma_c$  als die bedingten Konvergenzabszisse.

**Satz 6.1.4.** Ist  $F$  eine gewöhnliche Dirichletreihe mit  $\sigma_c \in \mathbb{R}$ , so gilt

$$\sigma_c \leq \sigma_a \leq \sigma_c + 1$$

**Beweis.** Übung!

*g.e.d.*



**Bemerkung 6.1.5.** Wie in der Theorie der Potenzreihen gibt es auch in der Theorie der Dirichletreihen eine Methode zur Berechnung der Konvergenzabszisse. Ist  $\sum_{n=1}^{\infty} a(n)$  divergent, so folgt für  $F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)e^{-\lambda_n s}$  die Formel

$$\sigma_c = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log A(n)}{\lambda_n}.$$

Es gibt einen noch viel wichtigeren Unterschied zwischen Dirichletreihen und den uns geläufigen Potenzreihen. Bei den Potenzreihen kann man den Konvergenzradius nicht nur in Abhängigkeit der Koeffizienten, sondern auch durch das Verhalten der durch die Reihe dargestellte lokal analytische Funktion bestimmen, nämlich als kleinster Absolutbetrag der singulären Punkte (ohne Einschränkung ist der Entwicklungspunkt  $z_0 = 0$ ): stellt die Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a(n)z^n$  eine Funktion dar, die sich auf eine Kreisscheibe  $|z| < r$  holomorph fortsetzen lässt, so ist sie in diesem Bereich auch absolut konvergent.

Für Dirichletreihen stimmt das nicht. Beispielsweise hat die Funktion

$$F(s) = 1 - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \frac{1}{4^s} + \dots$$

eine Fortsetzung zu einer ganzen Funktion (wie wir noch sehen werden!), aber die Reihe konvergiert nur für Werte  $s \in \mathbb{C}$  mit  $\operatorname{Re} s > 0$ .

Nur in Spezialfällen können wir auf die Existenz von singulären Punkten auf dem Rand der Konvergenzhalbebene schließen.

**Satz 6.1.6 (LANDAU).** Sei  $\sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s}$  eine gewöhnliche Dirichletreihe mit nicht-negativen Koeffizienten und Konvergenzabszisse  $\sigma_c$ . Dann hat die durch  $F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s}$  definierte Funktion in  $s = \sigma_c$  einen singulären Punkt.

**Beweis.** Ohne Einschränkung sei  $\sigma_c = 0$ . Nehmen wir an, die Funktion  $F(s)$  wäre in einer Umgebung  $U_\varepsilon(0)$  holomorph fortsetzbar. Dann würde sie um  $s = 1$  eine Taylorentwicklung haben mit Konvergenzradius  $R > 1$ , da kein Punkt in  $\partial U_1(1)$  singulär ist. Also wäre für geeignetes  $\delta > 0$  die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1-\delta)^k}{k!} F^{(k)}(1)$  konvergent und gleich  $F(-\delta)$ . Nach Satz 6.1.3 ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1-\delta)^k}{k!} F^{(k)}(1) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1+\delta)^k}{k!} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log n)^k a(n)}{n} \\ &\stackrel{a(n) \geq 0}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\log n)^k (1+\delta)^k}{k!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n} e^{(1+\delta) \log(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a(n) n^\delta. \end{aligned}$$

Damit gilt  $\sigma_c \leq -\delta < \sigma_c$ .  $\nmid$

*g.e.d.*

## 6.2. Formale Eigenschaften von Dirichletreihen

**Satz 6.1.7.** Seien  $\sum_{n=1}^{\infty} a(n)e^{-\lambda_n s}$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} b(n)n^{-\lambda_n s}$  zwei Dirichletreihen, die in einem Gebiet  $U \subseteq \mathbb{C}$  konvergieren und dort die selbe analytische Funktion darstellen. Dann ist  $a(n) = b(n)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

**Beweis.** Nehmen wir an, dies sei nicht der Fall. Sei  $m$  der kleinste Index mit  $a(m) \neq b(m)$ . Dann gilt für  $\sigma$  groß genug (Identitätssatz)

$$\begin{aligned} 0 &= e^{\lambda_m \sigma} \left( \sum_{n=m}^{\infty} a(n)e^{-\lambda_n \sigma} - \sum_{n=m}^{\infty} b(n)e^{-\lambda_n \sigma} \right) \\ &= a(m) - b(m) + \sum_{n=m+1}^{\infty} (a(n) - b(n))e^{-(\lambda_n - \lambda_m)\sigma} \end{aligned}$$

In der Tat hat jedes Glied in der Reihe wegen  $\lambda_n > \lambda_m$  den Limes 0 und die gleichmäßige Konvergenz impliziert, dass die Reihe für  $\sigma \rightarrow \infty$  gegen 0 strebt, was  $a(m) \neq b(m)$  widerspricht. *g.e.d.*

## 6.2. Formale Eigenschaften von Dirichletreihen

Ab jetzt bezeichnen wir gewöhnliche Dirichletreihen als Dirichletreihen. Die Regeln für die Handhabung von Dirichletreihen sind anders als die bei Potenzreihen, daher wollen wir diese jetzt näher erläutern.

Es ist klar, dass die Summe zweier Dirichletreihen die Reihe ist, deren allgemeiner Koeffizient die Summe der Koeffizienten der einzelnen Reihen ist. Aber wie bildet man das Produkt?

Seien

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n)n^{-s}, \quad G(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b(n)n^{-s}$$

zwei in einer offenen Menge  $U \subseteq \mathbb{C}$  durch absolut konvergente Dirichletreihen gegebene Funktionen, dann ist in  $U$ :

$$\begin{aligned} F(s)G(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a(n)b(m)n^{-s}m^{-s} \\ &= \sum_{n,m=1}^{\infty} a(n)b(m)(nm)^{-s} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\left( \sum_{d|k} a(d)b\left(\frac{k}{d}\right) \right)}_{=:c(k)} k^{-s}. \end{aligned}$$

Das heißt die additive Faltung  $\sum_{n+m=k} a(n)b(m)$ , die die Multiplikation von Potenzreihen beschreibt, wird durch die multiplikative Faltung  $\sum_{d|k} a(d)b(\frac{k}{d})$  bei Dirichletreihen ersetzt. Diese Tatsache ist für große Bedeutung der Dirichletreihen in der Zahlentheorie verantwortlich.



# A. Exkurs: Produktdarstellung der Diskriminantenfunktion

**Satz A.0.1.** Für die Diskriminantenfunktion  $\Delta$  gilt die Produktentwicklung

$$\Delta(z) := \frac{1}{1728} (E_4^3(z) - E_6^2(z)) = q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24},$$

wobei wie üblich  $q := \exp(2\pi iz)$  ist.

**Beweis.** Ein erster Beweis dieser Identität stammt von Jacobi; ein weiterer Beweis, der allein mit elementaren Mitteln auskommt, wird auf Übungsblatt 4 geführt werden. Im Folgenden soll ein vergleichsweise einfacher Beweis von Professor Kohnen selbst vorgestellt werden, der unter anderem auf die Hecke-Operatoren zurückgreift.

1. Schritt: Wir leiten eine zur Behauptung äquivalente Aussage her. Nehme also an, die Produktdarstellung gelte, dann können wir die logarithmische Ableitung bilden (verifiziere durch Nachrechnen unter Beachtung der Produktregel):

$$\begin{aligned} \frac{\Delta'}{\Delta} &= 2\pi i - 2\pi i \cdot 24 \sum_{m=1}^{\infty} m \frac{q^m}{1 - q^m} \\ &= 2\pi i \left( 1 - 24 \sum_{m=1}^{\infty} m \sum_{a=1}^{\infty} q^{ma} \right) \\ &= 2\pi i \left( 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n \right). \end{aligned}$$

Es genügt also, folgende Aussage zu zeigen:

$$\frac{\Delta'}{\Delta} = 2\pi i E_2,$$

wobei  $E_2(z) := 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n$ . Dies ist der ...

2.Schritt: Für  $n \in \mathbb{N}$  betrachte nun wie in [Definition 2.2.1](#)

$$\mathcal{M}(n) := \{ M \in \mathbb{Z}^{2 \times 2} \mid \det(M) = n \}.$$

Wohl bekannt ist aus [Lemma 2.2.2](#), dass

$$\mathcal{M}(n) = \bigcup_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b(\bmod d)}} \Gamma(1) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

und damit  $\# \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}(n) = \sigma_1(n)$ . Definiere nun einen „multiplikativen Hecke-Operator“  $\mathfrak{M}_n$ , der eine Modulform  $f$  vom Gewicht  $k$  bezüglich  $\Gamma(1)$  auf eine solche von Gewicht  $\sigma_1(n) \cdot k$  abbildet durch

$$\mathfrak{M}_n(f) := \prod_{\gamma \in \Gamma(1) \backslash \mathcal{M}(n)} f|_k \gamma = \prod_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b(\bmod d)}} f|_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}. \quad (\text{A.1})$$

Dies ist wohldefiniert (argumentiere dazu wie bei  $T(n)$  in [Abschnitt 2.1](#)). Wendet man dies nun auf  $f = \Delta$  an, dann ist  $\mathfrak{M}_n(f) = \mathfrak{M}_n(\Delta)$  eine Modulform vom Gewicht  $12\sigma_1(n)$  ohne Nullstellen in  $\mathbb{H}$  und mit  $\text{ord}_\infty(\mathfrak{M}_n(\Delta)) = \sigma_1(n)$ .

Aus der Valenzformel folgt jetzt  $\mathfrak{M}_n(\Delta) = c \cdot \Delta^{\sigma_1(n)}$  für ein  $c \in \mathbb{C}^\times$ . Durch logarithmisches Ableiten beider Seiten von [Gleichung A.1](#) erhalten wir mit  $f = \Delta$  und  $\mathfrak{M}_n(\Delta) = c \cdot \Delta^{\sigma_1(n)}$ , dass

$$\sigma_1(n) \frac{\Delta'}{\Delta} = \sum_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b(\bmod d)}} d^{-2} n \frac{\Delta'}{\Delta} \left( \frac{az+b}{d} \right) = \sum_{\substack{ad=n \\ d>0 \\ b(\bmod d)}} \frac{\Delta'}{\Delta} \Big|_2 \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad (\text{A.2})$$

denn die Ableitung von

$$f|_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = n^{\frac{k}{2}} d^{-k} f \left( \frac{az+b}{d} \right)$$

ist für beliebiges  $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$  gegeben durch

$$\left( f|_k \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \right)' = n^{\frac{k}{2}} d^{-k} \frac{a}{d} f' \left( \frac{az+b}{d} \right) = n^{\frac{k}{2}} d^{-k-2} n f' \left( \frac{az+b}{d} \right).$$

Setzt man  $\frac{\Delta'}{\Delta} = 2\pi i \sum_{m=0}^{\infty} a(m) q^m$ , so ergibt sich aus [Gleichung A.2](#) unter formaler Anwendung der Hecke-Operatoren (siehe Beweis von [Satz 2.2.4](#), ii)) für beliebige  $m, n \in \mathbb{N}$

$$\sigma_1(n) a(m) = \sum_{d|(m,n)} d a \left( \frac{mn}{d^2} \right).$$

Einsetzen von  $m = 1$  liefert

$$\sigma_1(n) a(1) = a(n)$$

und garantiert damit, dass  $\frac{\Delta'}{\Delta}$  von der Form

$$\frac{\Delta'}{\Delta}(z) = 2\pi i \left( a(0) + a(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n \right)$$

ist. Multipliziert man nun beide Seiten mit  $\Delta(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \tau(m) q^m$  und beachtet dabei  $\tau(1) = 1$  sowie  $\tau(2) = -24$ , ergibt sich durch Koeffizientenvergleich

$$a(0) = 1 \quad \text{und} \quad a(1) = -24,$$

womit alles gezeigt ist.

*g.e.d.*





# Index

- Dedekindische  $\eta$ -Funktion, 12
- Dirichletreihe, 63
  - Gewöhnliche Dirichletreihe, 63
- Diskriminantenfunktion, 6
- Eisensteinreihe, 5
- Fundamentalebereich, 1
- Hecke-Eigenform, 22
- Hecke-Operator, 17
- Konvergenzabszisse, 64
- Modulfigur, 2
- Modulform, 3
- Modulfunktion, 3
- normalisierte Eisensteinreihe, 5
- Peterssonsscher Strichoperator, 3
- quadratische Form, 49
  - Diskriminante einer quadratischen Form, 49
- Ramanujan-Funktion, 6
- Thetareihe, 4



# Liste der Sätze

1.1.1.Satz (Valenzformel) . . . . .	6
6.1.6.Satz (Landau) . . . . .	67