
쇼츠를 보지 마 — 숏폼 영상은 무엇을,
어떤 경로로, 어디까지 해치는가

연구에서 말하는 숏폼은 몇 초에서 몇 분 길이의 짧은 동영상으로, 틱톡·유튜브 쇼츠·인스타그램 릴스처럼 영상이 끊김 없이 이어지는 피드형 서비스를 가리킨다.⁹ 2025년 국가승인통계 기준으로 한국의 10세 이상 인구 열 명 가운데 여섯 명 가까이가 최근 1년 사이 이런 영상을 봤다.¹ 이만큼 흔한 습관이라면 "보지 마"라는 경고에는 이유가 따라야 한다.

답해야 할 물음은 세 가지다. 숏폼의 어떤 설계가 시청을 길게 끄는가, 그 시청이 주의·기분·수면·학습과 어떻게 이어지는가, 그리고 각 연결이 실험으로 확인된 것인지 함께 나타나는 상관에 그치는 것인지다. 마지막 장에서는 연구 결과가 허용하는 범위에서 시청을 조절하는 방법을 권한다.

핵심 요약


- 짧은 길이, 끊김 없는 공급, 관심사를 예측하는 추천이 결합하면 다음 영상을 고르는 부담과 자연스럽게 멈출 지점이 줄어들 수 있다(작성자 해석).
- 숏폼을 많이 볼수록 주의·충동 억제 과제 수행이 낮게 나타나는 상관이 71개 연구 메타분석에서 확인됐다. 다만 연구 대부분이 한 시점의 조사이고, 빠른 영상 전환의 영향을 본 실험은 45명 규모의 단기 실험이다.
- 우울·불안·스트레스·나쁜 수면과 가장 뚜렷하게 얽힌 것은 멈추지 못하고 일상이 흔들리는 '문제적 사용'이다. 시청 시간만으로 본 연관은 약하고 흔들린다.
- '숏폼 중독'은 연구용 설문척도의 개념이며, 미국정신의학회 공식 진단 범주에는 없다.
- 소셜미디어를 1주 끊거나 모바일 인터넷을 2주 막은 실험에서는 웰빙·정신건강이 나아졌지만, 하루 30분 제한은 차이를 만들지 못했다. 시간 조절은 스스로 시험하고 결과를 점검하는 도구로 쓰는 편이 근거에 맞는다.

1. 얼마나, 왜 보는가

한국콘텐츠진흥원이 2025년 전국 10세 이상 6,554명을 대면 면접한 조사에서 최근 1년 숏폼 이용률은 58.6%였다. 이용자가 쓰는 플랫폼은 유튜브 쇼츠가 93.4%로 가장 많았고 인스타그램 릴스 30.9%, 틱톡 21.1%가 뒤를 이었다.¹ 한국에서 숏폼을 본다는 것은 대부분 쇼츠를 본다는 뜻이다. 이 점은 3장에서 해외 연구 결과를 읽을 때 다시 중요해진다.

숏폼 이용자의 플랫폼별 이용률 (2025, 복수 응답)

단위: %



문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원, 2025 콘텐츠 이용행태 조사 (2025-12-17)

자료: 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원, 2025 콘텐츠 이용행태 조사(전국 10세 이상 6,554명 중 숏폼 이용자 기준). ¹

이용은 특정 세대에 몰려 있지 않다. 2025년 방송매체 이용행태조사에서 OTT 이용자 7,648명 가운데 숏폼형 서비스를 쓰는 비율은 86.5%였고, 연령대별로는 20대 94.7%와 30대 94.1%가 가장 높았지만 10세 미만(76.4%)과 70세 이상(76.6%)도 열에 일곱을 넘었다. ² 한 번 컷을 때 머무는 시간도 짧지 않다. 2025년 상반기 14세 이상 휴대전화 사용자 3,151명 온라인 조사에서 숏폼 1회 연속 시청시간은 평균 21분이었고, 10대의 26%는 한 번에 1시간 이상 본다고 답했다. ³ 영상 하나는 짧은데 한 번의 시청은 길어지는 셈이다.

58.6% 최근 1년 숏폼 이용률 2025, 전국 10세 이상 6,554명	86.5% OTT 이용자 중 숏폼형 서비스 이용률 2025, OTT 이용자 7,648명	21분 1회 연속 시청시간 평균 2025 상반기, 14세 이상 3,151명 온라인	26% 한 번에 1시간 이상 보는 10대 같은 조사의 10대 응답자
--	--	---	---

자료: 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원(2025-12-17), 방송통신위원회·정보통신정책연구원(2025), 컨슈머인사이트(2025-08-14). ^{1,2,3}

왜 보는지에 대한 답은 설계를 가리킨다. 같은 진흥원 조사에서 시청 이유로 "짧아서 부담이 없어서"를 고른 사람이 76.0%, "재미있는 부분만 보려고"가 51.4%, "추천 알고리즘 때문"이 47.0%였다. ¹ 이 세 이유 가운데 둘이 콘텐츠의 내용보다 형식, 곧 짧은 길이와 알아서 골라 주는 추천에 닿아 있다. 이용자 스스로도 숏폼의 구조를 시청 이유로 꼽고 있다는 점에서, 해로움을 따지는 일도 그 구조에서 시작하는 것이 자연스럽다.

2. 멈출 지점이 줄어드는 설계

틱톡은 자사 추천 시스템이 이용자의 상호작용과 콘텐츠 정보 등을 바탕으로 이용자가 관심을 가질 가능성을 예측해 콘텐츠의 순위를 매긴다고 설명한다.⁴ 다음에 볼 영상은 시스템이 예측해 이용자 앞에 놓는다.

여기에 1장의 시청 이유를 겹쳐 보면 하나의 그림이 그려진다. 영상 하나가 짧으니 시작하는 데 부담이 없고, 끝나면 관심 있을 법한 영상이 곧바로 이어진다. 텔레비전 프로그램이나 긴 영상에는 한 편이 끝나는 지점이 있고 그때마다 계속 볼지 정해야 하지만, 짧은 단위와 연속 공급과 맞춤 추천이 결합하면 다음 영상을 직접 고르는 부담도, 자연스럽게 멈출 지점도 줄어들 수 있다. 추천 방식에 대한 기업 설명과 이용자 응답을 이은 작성자의 해석이다.^{1,4}

이 해석에 가장 가까운 연구는 중국 대학생 2,646명을 한 시점에 설문한 경로모형 분석이다. 학생들이 체감한 추천의 개인화 정도는 문제적 스포츠 사용 성향과 두 갈래로 이어졌다. 하나는 직접 연결이고, 다른 하나는 몰입(flow), 즉 영상에 깊이 빠져드는 경험을 거치는 연결이었다. 눈에 띄는 대목은 자기통제의 역할이다. 몰입과 문제적 사용 성향 사이의 관계는 자기통제가 낮은 학생에게서 $\beta=.45$, 높은 학생에게서 $\beta=.21$ 로 약해졌고, 추천에서 몰입을 거쳐 문제적 사용으로 이어지는 간접효과도 자기통제가 높아질수록 .18, .13, .08로 작아졌다. 측정한 것은 이용자가 지각한 개인화다.⁵



자료: 틱톡 추천 방식 설명, 중국 대학생 2,646명 횡단면 경로모형(2026)을 바탕으로 구성. 단계 사이 연결은 한 시점 설문의 통계적 경로다.^{4,5}

이 결과가 말해 주는 것은 설계의 힘이 모든 사람에게 같은 크기로 작용하지는 않는다는 점이다. 같은 추천을 받아도 자기통제가 약한 사람에게는 몰입이 문제적 사용으로 더 강하게 번진다면, 스포츠의 위험은 영상 자체만큼이나 그 영상을 대하는 사람의 상태에 따라 달라진다고 볼 수 있다. 5장에서 다룰 조절 방법이 결국 외부 장치로 자기통제를 보강하는 시도라는 점도 여기서 이어진다.

3. 무엇이 어떻게 영향을 받는가

주의와 인지

스포츠와 주의의 관계를 가장 넓게 묶은 연구는 2025년 *Psychological Bulletin*에 실린 메타분석이다. 71개 연구, 참여자 98,299명을 종합한 결과 스포츠 이용이 많을수록 인지 과제 수행이 낮게 나타났고, 그 상관은 평균 $r=-0.34$ 였다.⁶ 상관계수 r 은 두 값이 함께 움직이는 정도를 -1에서 1 사이로 나타낸 값으로, 0이면 함께 움직이지 않는다는 뜻이고 음수는 한쪽이 늘 때 다른 쪽이 줄어드는 관계를 뜻한다. 세부 영역 가운데서는 주의 수행($r=-0.38$)과 억제 통제($r=-0.41$)가 두드러졌다.⁶ 억제 통제를란 떠오르는 충동이나 습관적 반응을 누르고 해야 할 일에 머무는 능력이다. 다음 영상으로 넘기고 싶은 충동과 가장 직접 맞닿은 능력에서 연관이 가장 크게 나왔다는 점이 의미심장하다.

측정 영역	평균 상관(r)
인지 수행 전체	-0.34
주의 수행	-0.38
억제 통제	-0.41

자료: *Psychological Bulletin* 메타분석(2025-09, 71개 연구·98,299명). 연구 대부분은 횡단면·상관 설계. ⁶

이 연관은 성인과 청소년에게서 비슷했다. 성인 연구의 평균 상관은 $r=-0.32$, 청소년은 $r=-0.36$ 으로 둘의 차이는 유의하지 않았다. 같은 분석에서 자존감·신체상과는 유의한 연관이 나타나지 않아, 스마트폰 얹힌 영향이 모든 심리 영역에 고르게 퍼져 있지는 않다는 점도 드러났다. ⁶

한국 독자가 짚어야 할 점이 하나 있다. 이 메타분석의 플랫폼 비교는 일반 스마트폰 연구(12개, $r=-0.35$)와 틱톡 연구(2개, $r=-0.26$)에 한정됐고, 유튜브 쇼츠·인스타그램 릴스·페이스북 릴스 연구는 포함되지 않았다. ⁶ 한국 이용자 대부분이 쓰는 쇼츠에 이 결과를 적용하려면 특정 플랫폼을 가리지 않은 일반 스마트폰 연구의 결과에 기대야 한다는 뜻이다.

더 근본적인 제약은 연구 설계에 있다. 포함된 연구 대부분은 한 시점에 이용량과 수행을 함께 켜 횡단면·상관 설계였다. ⁶ 이런 설계에서는 스마트폰이 주의를 떨어뜨렸는지, 원래 주위가 쉽게 흐트러지는 사람이 스마트폰을 더 많이 보는지 가를 수 없다. 방향에 대한 단서는 실험에서 나온다. 참여자 45명을 대상으로 한 실험에서 영상을 마음대로 빠르게 넘기게 한 집단은 시청 뒤 미래기억 수행, 곧 나중에 해야 할 일을 기억했다가 제때 실행하는 능력이 나빠졌고, 넘기는 속도를 제한한 집단은 오히려 나아졌다. ⁷ 집단을 나눠 조건을 비교한 실험이라 '빠른 전환이 기억 수행을 떨어뜨린다'는 방향의 단서를 주지만, 45명이 짧은 시간 겪은 변화라 일상에서 몇 달, 몇 년 쌓였을 때의 결과까지 말해 주지는 못한다.

수면

수면 연구는 아직 규모가 작다. 중국 허난성의 한 대학에서 17~25세 학생 337명이 스스로 답한 설문을 보면, 문제적 스마트폰 사용 점수가 높을수록 피츠버그 수면의 질 지수(PSQI)로 켜 수면 문제 점수도 높았고 그 상관은 $r=0.456$ 이었다. 응답자의 25.2%는 PSQI 8점 이상이었다. ⁸ 주의 메타분석의 상관보다 큰 값이지만 한 대학, 한 시점, 자기보고라는 범위를 함께 봐야 한다.

수면은 다른 영향과 연결되는 고리이기도 하다. 스마트폰과 정신건강을 다룬 문헌고찰은 문제적 사용이 잠잘 시간을 대신 차지하거나 남과 자신을 비교하게 만들어 정서를 악화하는 경로를 가능한 방향의 하나로 논의한다. ⁹ 잠이 줄어드는 일은 그 자체로도 문제지만, 다음 절의 기분 문제로 넘어가는 통로일 수 있다는 점에서 따로 살필 가치가 있다.

기분: 우울·불안·스트레스

2026년 1월까지의 문헌을 검색해 고른 58개 연구, 96,676명을 검토한 체계적 문헌고찰(53개 연구는 메타분석으로 종합)에서 스마트폰 사용은 우울($r=0.24$), 불안($r=0.26$)과 양의 상관을 보였다. ⁹ 스마트폰을 더 쓰는 사람일수록 우울·불안 점수도 높게 나타났다는 뜻이다. 그런데 이 결과를 '어떻게 쓰느냐'로 나눠 보면 그림이 크게 달라진다.

사용을 정의한 방식	우울	불안	스트레스
숏폼 사용 전체	0.24 (0.15~0.33)	0.26 (0.17~0.35)	0.41
문제적 사용	0.34 (0.28~0.39)	0.38 (0.33~0.43)	0.44 (0.36~0.51)
일상적 이용(시간·빈도)	0.09 (0.01~0.17)	-0.02, 유의하지 않음	1개 연구

자료: *Journal of Medical Internet Research* 체계적 문헌고찰·메타분석(2026, 58개 연구·96,676명). 괄호는 95% 신뢰구간. 58개 중 52개가 횡단면, 55개가 중국 연구. ⁹

문제적 사용, 곧 통제 실패와 일상 기능 손상으로 정의한 사용은 우울·불안·스트레스 모두와 뚜렷한 상관을 보였다. 반면 하루 몇 시간, 며칠에 한 번처럼 이용시간·빈도로만 정의한 일상적 이용은 우울과의 상관이 $r=0.09$ 로 작았고, 연구를 하나씩 빼고 다시 계산하면 여러 번 유의하지 않은 결과로 바뀌었다. 불안과는 유의한 연관이 없었다. ⁹

이 차이는 일상에서 바로 쓸 수 있다. 정서·수면 문제와 연관되게 얽힌 것이 시청 시간보다 멈추지 못하는 사용 방식이라면, 위험 신호도 시청 시간 자체보다 통제 실패, 일상 기능 손상, 잠이나 과제를 숏폼이 대신하는 장면에서 찾는 것이 근거와 맞는다고 판단한다. ^{8,9} 같은 시간을 보더라도 쉬는 틈에 보고 끄는 시청과, 끄려 했는데 끄지 못해 잠자리가 밀린 시청은 다른 사용이라는 뜻이다. 다만 이 판단 역시 상관 근거 위에 서 있다.

방향의 문제는 여기서 더 분명해진다. 같은 문헌고찰은 우울·불안을 견디려는 대처 행동으로 숏폼 사용이 늘어나는 방향, 문제적 사용이 수면을 밀어내고 사회 비교를 부추겨 정서를 악화하는 방향, 그리고 둘이 서로를 강화하는 순환이 모두 가능하다고 논의한다. ⁹ 기분이 가라앉은 사람이 숏폼으로 도피하는지, 숏폼이 기분을 가라앉히는지는 현재 연구로 가를 수 없고, 실제로는 둘이 맞물려 돌 가능성도 있다. 어느 쪽이든 멈추지 못하는 사용이 정서 문제와 함께 나타난다는 사실은 같으므로, 그 신호를 알아차리는 일의 쓸모는 방향과 상관없이 남는다.

학업

중국 초등학생 1,052명을 설문한 연구에서 숏폼 사용은 학업 수행($\beta=-0.205$), 주의($\beta=-0.211$)와 음의 관계를 보였다. 주의를 거쳐 학업 수행으로 이어지는 간접효과는 -0.043 이었다. ¹⁰ 숏폼 사용이 많은 아이일수록 주의가 낮고, 낮은 주의가 다시 낮은 학업 수행과 이어지는 몫이 일부 있다는 뜻으로, 앞 절의 주의 연관이 학업이라는 일상의 결과로 이어지는 경로를 보여 준다. 이 연구도 한 시점 설문이다.

짧은 영상이라는 형식만으로 해를 설명하기 어렵게 만드는 사례도 있다. 의대생 167명을 대상으로 90초짜리 신경해부학 교육용 릴스 50개를 2개월 동안 보조자료로 제공한 연구에서, 릴스를 받은 집단의 단기 사후점수는 20점 만점에 9.9점으로 비교 집단의 7.5점보다 높았다($p<.001$). 최종시험에서는 17.2점 대 16.5점으로 차이가 유의하지 않았다. ¹¹ 집단을 무작위로 나누지 않은 연구라는 조건이 불지만, 오락 피드를 끝없이 넘기는 시청과 목적을 갖고 구성된 학습용 짧은 영상은 노출의 맥락이 다른 사례로 보는 것이 맞다. 해로움의 중심이 영상의 길이보다 소비의 방식에 있을 가능성을 보여 주는 대목이다.

'숏폼 중독'이라는 말

연구에서 문제적 사용은 통제 실패, 과도한 몰입, 줄이려 해도 줄이지 못함, 일상·학업·사회 기능의 손상 같은 증상을 설문적으로 재서 정의한다.¹³ 제목에 '중독'이 붙은 연구라도 실제로 켜진 것은 대개 이런 증상 점수다. 한 대학생 연구(354명 중 틱톡 이용자 173명)는 변형된 Bergen 척도와 잠재계층분석으로 전체 표본의 6.4%를 위험군으로 분류했는데, 이는 대학생 한 표본에서 나온 연구상 분류다. 여러 연구가 기존 소셜미디어·스마트폰 척도의 문구만 틱톡으로 바꿔 쓰고 있어, 진단기준과 측정도구도 통일돼 있지 않다.¹³

미국정신의학회도 기술 중독이 DSM-5-TR의 공식 장애에 포함되지 않으며, 인터넷 게임장애도 추가 연구가 필요한 상태라고 설명한다. 소셜미디어는 공식 진단 범주에 없다.¹² 그러니 '숏폼 중독'은 의학적 진단명으로 쓸 말이 못 된다. 통제 실패와 일상 손상은 앞 절들이 보여 준 정서·수면 연관 중심에 있는 증상이며, 스스로 점검할 수 있는 구체적인 신호다.

4. 어디까지 확인됐나: 근거의 세 층

지금까지의 연구를 근거의 힘에 따라 나누면 세 층이 된다. 가장 얇지만 방향을 말해 주는 층은 실험이고, 가장 두껍지만 방향을 말해 주지 못하는 층은 상관 연구이며, 그 바깥에는 아직 연구가 닿지 않은 영역이 있다.

근거 수준	보여 주는 것	범위와 조건
실험	빠른 영상 전환 뒤 미래기억 수행 악화 ⁷	45명, 단기
실험(개입)	소셜미디어 중단·모바일 인터넷 차단 뒤 웰빙·정신건강 개선 ^{14,16}	숏폼 외 인터넷 전반까지 차단
상관(다수 연구)	주의·억제 통제 저하 ⁶ , 우울·불안·스트레스 ⁹	대부분 횡단면
상관(단일 연구)	나쁜 수면 ⁸ , 학업 수행 저하 ¹⁰	중국 한 대학·초등학교 표본

자료: 각 행의 출처. 상관 연구 다수는 중국 표본. ^{6,8,9,10}

한국 이용자에게서 나타나는 효과의 크기와 수년에 걸친 장기 영향은 아직 확인되지 않았다.

이 구분이 중요한 이유는 같은 숫자라도 담는 의미가 다르기 때문이다. 상관 연구의 r 값은 숏폼을 많이 쓰는 사람과 주의·기분 문제가 함께 나타난다는 사실을 말해 줄 뿐, 숏폼을 줄이면 문제가 그만큼 줄어든다고 약속하지 않는다. 그 약속에 가까운 것은 실험인데, 숏폼 시청 방식을 조작한 실험은 45명 단기 실험이고, 개입 실험은 숏폼보다 넓은 범위를 막았다.

이 층들을 하나로 이으면 연구가 그리는 경로를 한 문단으로 말할 수 있다. 숏폼은 짧은 단위와 관심사를 예측하는 추천으로 영상을 끊김 없이 공급해 멈출 지점을 줄이고(기업 설명과 이용자 응답에 기반 해석), 그 개인화를 강하게 느낄수록 몰입을 거쳐 멈추지 못하는 사용으로 이어지기 쉬우며 자기통제가 이 연결을 약하게 한다(대학생 설문 경로모형). 그렇게 굳어진 문제적 사용은 주의·충동 억제 저하, 우울·불안·스트레스, 나쁜 수면, 낮은 학업 수행과 함께 나타나는데 이는 주로 상관 근거이고, 빠른 전환이 기억 수행을 떨어뜨린다는 방향은 단기 소표본 실험에서만 확인됐다. 이 문단을 자기 말로 다시 할 수 있다면 숏폼의 해로움에 관해 연구가 실제로 말하는 내용과 그 한계를 함께 켜 켜 써야 한다.

5. 시청을 조절하려면

조절의 효과를 시험한 연구들은 결과가 엇갈린다. 엇갈림의 방향은 개입의 강도와 겹친다.

연구	대상·기간	개입	결과
1주 중단 RCT ¹⁴	성인 154명, 1주	페이스북·인스타그램·트위터·틱톡 동시 중단	웰빙·우울·불안 개선
모바일 인터넷 차단 RCT ¹⁶	2주	스마트폰 모바일 인터넷 차단	웰빙·정신건강·지속주의 개선
하루 30분 제한 RCT ¹⁵	평균 21.4세 67명, 2주	소셜미디어 하루 30분	자존감·수면·정서 효과 없음
앱 한도 알림 RCT ¹⁸	70명	개인 한도 도달 시 중단 권고 화면	시간×집단 효과 없음, 추적 시점 웰빙·스트레스는 개입 집단이 나음

자료: 각 행의 출처. RCT는 무작위 대조 시험. ^{14,15,16,18}

가장 강한 개입부터 보자. 성인 154명을 무작위로 나눈 시험에서 네 플랫폼을 1주일 동시에 끊은 집단은 통제 집단보다 웰빙 점수가 평균 4.9점(95% 신뢰구간 3.0~6.8) 높았고, 우울 점수는 2.2점(1.1~3.3), 불안 점수는 1.7점(0.6~2.8) 낮았다. ¹⁴ 스마트폰의 모바일 인터넷을 2주 막은 시험에서도 순응 여부와 관계없이 배정된 전원을 기준으로 본 전후 효과크기(d_z)가 웰빙 0.45, 정신건강 0.56, 객관적으로 잤 지속주의 0.23이었다. 다만 이 시험은 통화·문자와 데스크톱 인터넷을 허용한 채 스마트폰을 포함한 모바일 인터넷 전체를 막았고, 참여를 약속한 467명 가운데 차단 앱을 설치한 사람은 266명, 14일 중 10일 이상 차단을 지킨 사람은 119명이었다. ¹⁶ 끝까지 지키기 어려운 개입이라는 점도 결과의 일부다.

가벼운 개입은 결과가 약했다. 평균 21.4세 67명이 2주 동안 소셜미디어를 하루 30분으로 제한한 시험에서는 자존감·마음챙김·수면·정서적 웰빙 어디에서도 제한에 따른 변화가 나타나지 않았다. ¹⁵ 스스로 정한 앱 사용 한도에 닿으면 그만두라는 화면을 띄운 70명 시험에서는 시간에 따른 집단 간 변화 차이가 나타나지 않았고, 마지막 추적 시점에서야 개입 집단의 웰빙이 높고 부정 정서와 스트레스가 낮았다. 스트레스 감소는 문제적 스마트폰 사용 수준이 평균 이상인 사람에게서 나타났고 낮은 사람에게서는 유의하지 않았다. 표본이 작아 작은 효과는 걸러지지 않았을 수 있다. ¹⁸

이 네 연구는 개입의 강도와 기간, 지킨 정도, 막은 범위가 모두 달라 하나의 결론으로 합치기 어렵다. 그래도 겹쳐 보면 방향은 보인다. 여러 플랫폼을 함께 끊거나 인터넷을 막은 강한 개입에서는 정서와 주의가 나아졌고, 시간을 조금 줄이는 정도로는 차이가 잘 드러나지 않았으며, 알림형 한도는 결과가 같았고 스트레스 효과가 문제적 사용 수준이 높은 사람에게서 나타났다. 또 시험된 개입은 모두 소셜미디어 전체나 모바일 인터넷 단위였다. 그래서 시간 제한은 효과가 정해진 처방으로 받아들이기보다, 스스로 결과를 점검하며 시험해 보는 도구로 쓰는 편이 근거에 맞다고 판단한다. ^{14,15,16,18} 3장에서 위험 신호가 시청 시간보다 통제 실패와 일상 손상에 있었다는 점, 2장에서 자기통제가 몰입과 문제적 사용의 연결을 약하게 했다는 점을 함께 놓으면, 조절의 목표도 시간을 몇 분 줄이는 것보다 멈추는 힘이 되찾고 앓은 시간대를 돌려받는 데 두는 것이 자연스럽다.

이런 판단에서 다음 순서를 권한다. 앞의 시험 결과가 허용하는 범위에서 끌어낸 작성자의 제안이다.

01**사용기록 확인**

기기의 사용기록으로 스마트폰에 쓰는 시간과 시간대를 확인한다

→ 02**손실이 큰 시간대부터**

취침 전·공부 중처럼 잃는 것이 큰 시간에 앱 한도나 차단을 시험한다

→ 03**결과 점검**

시험한 뒤 잠·기분·집중이 어떻게 달라졌는지 스스로 비교한다

→ 04**상담**

통제 실패가 되풀이되거나 일상 기능이 손상되면 상담을 받는다

자료: 중단·차단·제한·한도 알림 시험 결과에 근거한 작성자 권고. **14,15,16,18**

한국 기관의 안내도 같은 방향을 가리킨다. 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원의 2021년 스마트폰 과의존 가이드라인은 사용습관 자가점검과 연령별 바른 사용 실천, 필요할 때 스마트쉼센터 상담을 안내한다. **17** 성평등가족부 어린이 페이지는 사용시간과 내용을 기록하고, 시간관리 도구와 가족 규칙을 쓰고, 운동·취미로 시간을 바꾸되 스스로 조절이 안 되면 전문상담과 청소년상담 1388을 이용하라고 권한다. **19** 두 안내는 스마트폰·인터넷 과의존 일반 권고이지만, 기록으로 시작해 스스로 점검하고 안 될 때 도움을 구하라는 골격은 위의 순서와 겹친다. 청소년 자녀를 둔 보호자라면 가족 규칙과 1388을, 성인이라면 스마트쉼센터를 기억해 둘 만하다.

"쇼츠를 보지 마"라는 경고를 연구가 받쳐 주는 만큼 고쳐 쓰면, 멈추지 못하는 시청이 잠과 공부와 기분을 밀어내고 있는지 살피라는 말이 된다. 그 신호는 시청 시간보다 끄려다 끄지 못한 경험과 밀려난 일에서 먼저 드러나고, 이를 알아보는 첫걸음은 오늘 밤 휴대전화의 사용기록을 열어 잠들기 전 스마트폰에 쓴 시간을 확인하는 일이다.

출처

- 1 2025 콘텐츠 이용행태 조사 보도자료 · 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원 · 2025-12-17 · [원문](#)
- 2 2025 방송매체 이용행태조사 · 방송통신위원회·정보통신정책연구원 · 2025 · [원문](#)
- 3 '숏폼' 한번 보면 평균 21분 · 컨슈머인사이트 · 2025-08-14 · [원문](#)
- 4 How TikTok recommends content · TikTok · 미상 · [원문](#)
- 5 Personalized recommendation and short-form video addiction tendency · BMC Psychology 수록 연구 · 2026 · [원문](#)
- 6 Feeds, feelings, and focus · Psychological Bulletin · 2025-09 · [원문](#)
- 7 Context-switching in short-form videos · Behaviour & Information Technology 수록 연구 · 2025 · [원문](#)
- 8 Effect of short video addiction on the sleep quality of college students · Frontiers in Psychology · 2024-01-11 · [원문](#)
- 9 Association Between Short-Form Video Use and Mental Health · Journal of Medical Internet Research · 2026 · [원문](#)
- 10 The relationship between short video usage and academic achievement · PLOS ONE · 2024-11-25 · [원문](#)
- 11 Short Social Media Videos as a Supplementary Educational Resource in Neuroanatomy · JAMA Network Open 수록 연구 · 2025 · [원문](#)
- 12 What is Technology Addiction? · 미국정신의학회 · 2024-02 · [원문](#)
- 13 Exploring Problematic TikTok Use and Mental Health Issues · Neuropsychiatric Disease and Treatment · 2025 · [원문](#)
- 14 Taking a One-Week Break from Social Media · Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking · 2022-05-03 · [원문](#)
- 15 Causal effects of social media use on self-esteem, mindfulness, sleep and emotional well-being · Frontiers in Public Health · 2025-05-30 · [원문](#)
- 16 Blocking mobile internet on smartphones improves sustained attention, mental health, and subjective well-being · PNAS Nexus · 2025-02-18 · [원문](#)
- 17 스마트폰 과의존 예방·해소 가이드라인 보급 · 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원 · 2021-06-09 · [원문](#)
- 18 Effects of an intervention targeting social media app use · Applied Psychology: Health and Well-Being · 2025 · [원문](#)
- 19 과의존은 위험해요 · 성평등가족부 · 미상 · [원문](#)