

JEONGJIN PHARMA · 원내 실무자를 위한 빠른 안내서

원내 주문 용어 가이드

수액 · 주사 투여 경로 · 영양주사 핵심 정리

업무 중 자주 접하는 약어와 통칭을 정리한 참고 자료입니다.

실제 처방·투여 경로·용량·급여 여부는 환자 상태와 최신 기준에 따라 의료진이 판단합니다.

빠른 찾아보기

약어·통칭을 클릭하면 해당 주제로 바로 이동합니다.

찾는 용어	수록 주제
NS · Normal Saline	01 생리식염수
IV · IM	02 주사 투여 경로
아미노산 · TPN	03 아미노산 수액
DW · 5DW · 10DW	04 포도당 수액
IVNT	05 정맥영양주사요법
3-Chamber · 3챔버	06 3챔버 영양수액
Thymosin Alpha 1 · 자탁신	07 싸이모신 알파 1
비타민 D	08 비타민 D 주사
비타민 C	09 비타민 C 주사
비타민 B	10 비타민 B 주사
글루타치온 · 백옥주사	11 백옥주사
치옥트산 · 알파리포산	12 신데렐라주사
Placenta · 라이넥 · 멜스몬	13 태반주사
푸르셀티아민 · 마늘주사	14 마늘주사

NS는 Normal Saline(0.9% 생리식염수)를 뜻하며, 우리 몸의 체액과 염분 농도가 같아 주입해도 세포 변형을 일으키지 않는 가장 기본적인 수액입니다.

NS 100ml — 주사제 섞는 용도

100ml 짜리 작은 수액은 환자에게 수분을 대량 공급하는 목적이 아닙니다.

- **물 희석 및 투여** — 항생제·소화제·진통제 등 정맥주사(IV)로 천천히 주입할 약물을 섞는 '매개체' 역할
- **투여 시간** — 약물 종류에 따라 다르지만 보통 15~30분 이내로 빠르게 투여
- **수분 제한 환자** — 심장·신장 기능이 떨어져 잘 붓는 환자에게 최소한의 수액에만 약을 섞어 투여

NS 200ml~250ml — 소량 수분 보충 + 약물 투여

100ml보다 용량이 2배 이상 많아 목적이 확장됩니다.

- **완만한 약물 투여** — 자극성이 강하거나 속도 조절이 필요한 약물(일부 항암제, 전해질 교정제 등)을 1시간 이상 천천히 투여
- **가벼운 탈수 교정** — 금식 중이거나 약간의 탈수가 있으나 대량 수액이 부담스러울 때 기초 수분·염분 공급

한 줄 요약

NS 100ml — "주사약 섞어서 빨리 맞고 끝내는 용도"

NS 200/250ml — "약을 안전하게 천천히 주거나, 약간의 수분을 함께 보충"

급여 여부

NS 100ml

급여

NS 200~250ml

비급여

※ 환자의 나이·체중·심장·신장 기능, 그리고 무엇보다 '어떤 주사약을 섞을 것인가'에 따라 의사가 용량을 결정합니다.

흔히 사용하는 IV와 IM은 주사를 놓는 부위와 방법(투여 경로)을 뜻하는 의학 용어입니다. 가장 큰 차이는 **약물이 들어가는 속도와 위치**입니다.

IV (Intravenous Injection) · 정맥 주사

- **의미** — 정맥(핏줄)에 바늘을 찔러 약물을 혈관 속으로 직접 주입
- **특징** — 약물이 혈액을 타고 온몸으로 바로 퍼져 효과가 가장 빠름
- **용도** — 응급 상황의 빠른 효과, 지속적 수액·다량 약물 투여, 수혈
- **예시** — 손등이나 팔에 맞는 링거, 응급실 진통제 주사

IM (Intramuscular Injection) · 근육 주사

- **의미** — 피부 아래 깊은 근육 조직(엉덩이·팔뚝)에 약물을 주입
- **특징** — 혈관이 풍부해 비교적 빠르게 흡수되지만 IV보다는 느리고 지속적. 주입 시 근육이 빠근할 수 있음
- **용도** — 약물의 양이 적고 IV 시 부작용 위험이 있는 약물, 몸속에서 서서히 오래 흡수되어야 할 때
- **예시** — 엉덩이 진통제·소염제 주사, 독감 예방접종(어깨 삼각근)

한눈에 비교하기

구분	IV · 정맥 주사	IM · 근육 주사
주사 부위	팔꿈치 안쪽, 손등, 발등의 정맥	엉덩이(둔부) 또는 위팔(삼각근)
흡수 속도	가장 빠름 (주입 즉시 효과)	빠름 (정맥보다는 느림)
투여 양	대용량 가능 (수액 등)	소량만 가능 (보통 1~5cc 이내)
주사 후 관리	멍이 들지 않게 문지르지 말고 꺾 눌러줌	약물이 잘 퍼지도록 문질러 주는 것이 좋음

병원에서 처방·투여하는 아미노산은 주로 수액(정맥주사) 형태로 공급됩니다. 환자의 상태·투여 목적·질환에 따라 아미노산 수액의 종류와 성분 배합이 완전히 달라집니다.

1. 영양 공급용 기본 아미노산 수액

스스로 음식 섭취가 어렵거나 수술 전후로 영양 보충이 필요한 환자에게 사용하는 가장 일반적인 수액입니다.

- **성분 구성** — 체내에서 합성되지 않는 필수 아미노산 8종을 중심으로 비필수 아미노산이 골고루 포함
- **주요 목적** — 신체 조직 회복, 단백질 합성 유도, 영양 불량 상태 개선
- **단독 아미노산 주사** — 영양 결핍 환자에게 아미노산만 공급
- **TPN(총정맥영양) 수액** — 하나의 팩에 [아미노산 + 포도당 + 지질 + 비타민/전해질]이 모두 담긴 3-Chamber(3구획) 종합 영양 수액

2. 특정 질환 치료용 특수 아미노산

특정 장기의 기능이 떨어진 환자에게 일반 아미노산을 고용량으로 투여하면 오히려 독이 될 수 있어, 특정 질환 전용으로 배합된 특수 수액을 사용합니다.

① 간 질환 전용 (간부전·간경변)

- **특징** — 간 기능이 떨어지면 체내 암모니아가 쌓여 간성혼수가 올 수 있음. 이를 막기 위해 BCAA(분지쇄 아미노산: 로이신·이소로이신·발린)의 함량을 높이고, 간에 부담을 주는 아미노산(메티오닌·페닐알라닌 등)은 줄인 배합을 사용
- **효과** — 간성 뇌증(혼수)의 예방·치료, 간 대사 개선

② 신장(콩팥) 질환 전용 (신부전 환자)

- **특징** — 신장 기능이 망가지면 단백질 대사 노폐물(요소 질소)을 배출하지 못함. 따라서 노폐물 발생을 최소화하기 위해 필수 아미노산 위주로만 구성하거나 투석 환자 특성에 맞춘 비율로 조절

3. 기능의학·미용·피로 회복용 (외래 처방)

'영양 주사'나 '태반 주사' 등으로 불리며, 외래 환자가 피로 회복이나 면역력 증진을 위해 맞습니다.

- **글루타치온(Glutathione) 주사** — 글루타메이트·시스테인·글리신 3가지 아미노산 결합체. 강력한 항산화, 간 해독, 피부 미백 (백옥주사) 목적
- **아르기닌(Arginine) 주사** — 혈관 확장 물질(NO) 생성으로 혈액 순환·피로 물질 배출·체지방 분해 대사 촉진
- **마늘주사·태반주사 등** — 아미노산과 비타민 B군·미네랄을 배합해 만성 피로 환자의 활력 충전용

병원 아미노산 처방의 핵심

입원 환자 — '단백질 소모 방지와 장기 기능 유지'가 목적

외래 환자 — '대사 촉진과 피로 물질 해독'에 초점

04

포도당 수액 (DW)

병원에서 **DW**는 **Dextrose in Water(포도당 수액)**를 의미합니다. 앞에 숫자가 붙어 농도를 나타내는 경우가 많습니다.

5% DW (5DW)

5% 포도당 수액

가장 일반적. 탈수 예방이나 약물을 섞어 주사할 때(믹스용) 기본 수액으로 사용

10% DW (10DW)

10% 포도당 수액

당뇨 저혈당 쇼크 환자에게 급하게 당을 올리거나, 고칼륨혈증 치료 등 특수 목적

수분 공급과 함께 **칼로리(에너지)**를 공급하는 역할을 합니다.

IVNT는 Intravenous Nutrient Therapy의 약자로, 우리말로 '정맥 영양 주사 요법'이라고 합니다. 몸에 필요한 비타민·미네랄·항산화제·아미노산 등의 영양소를 먹는 약 대신 정맥주사(링거)를 통해 혈관으로 직접 투여하는 치료입니다.

왜 먹지 않고 주사로 맞나?

영양제를 입으로 먹으면 위장관을 거쳐 소화·흡수되는 과정에서 상당량이 손실되고 시간이 걸립니다. 반면 IVNT는 혈관으로 세포에 직접 공급하기 때문에 **흡수율이 100%에 가깝고 효과가 빠르게** 나타납니다.

주요 대상

- **만성 피로** — 아무리 쉬어도 피로가 풀리지 않고 기력이 없을 때
- **면역력 저하** — 감기에 자주 걸리거나 대상포진 등 면역 질환 예방·회복
- **피부 개선·노화 방지** — 피부 탄력, 미백, 항산화 효과가 필요할 때
- **영양 불균형** — 수술 후 또는 위장 기능 저하로 음식·알약 섭취가 어려울 때
- **숙취 해소·디톡스** — 빠른 체내 독소 배출과 수분 공급이 필요할 때

대표적인 IVNT 주사 종류

- **마이애스 카테일** — IVNT의 시초. 비타민 C·B군·마그네슘 등을 섞어 만성 피로·근육통에 효과
- **신데렐라 주사(치옥트산)** — 강력한 항산화 작용, 체지방 감소·피부 노화 방지
- **백옥 주사(글루타치온)** — 간 해독을 돕고 멜라닌 색소 억제로 피부 톤 개선
- **마늘 주사(푸르셀티아민)** — 비타민 B1으로 젖산을 분해해 빠른 피로 회복. 주사 시 마늘 냄새가 나서 붙은 이름

참고

IVNT는 개인의 건강 상태나 혈액 검사 결과에 따라 필요한 성분을 조합하여 맞춤형으로 진행되는 경우가 많습니다. 지병(신장·심장 질환 등)이 있거나 특이 체질이라면 반드시 의사와 충분히 상담 후 본인에게 맞는 성분·용량으로 안전하게 진행해야 합니다.

병원에서 사용하는 **3챔버스(3-Chamber)**는 환자에게 수분과 영양을 공급하기 위해 사용하는 3구획 영양 수액(총정맥영양, TPN)입니다. 하나의 수액 백(Bag)이 세 개의 방(Chamber)으로 나뉘어 있어 핵심 영양소가 따로 분리되어 담겨 있는 것이 특징입니다.

왜 3개로 나눠 놓았을까?

가장 큰 이유는 '**보관 안정성**' 때문입니다. 포도당·아미노산·지방 유제를 미리 섞어놓으면 시간이 지나면서 침전물이 생기거나 성분이 변질될 위험이 큼니다. 따라서 평소에는 분리해 두었다가, 환자에게 투여하기 직전에 구획 사이 개방선을 터뜨려 주입선 안에서 혼합 되도록 설계되어 있습니다.

주요 구성 성분

첫 번째 방

포도당

에너지 공급

두 번째 방

아미노산 · 전해질

단백질 합성 · 신체 기능 유지

세 번째 방

지방 유제

고농도 에너지 · 필수 지방산

주요 특징 및 장점

- **감염 위험 감소** — 밀폐 상태로 바로 터뜨려 쓰기 때문에 원내 감염 위험이 획기적으로 감소
- **편의성** — 의료진이 간편하고 빠르게 균형 잡힌 영양 수액을 준비 가능
- **맞춤형 투여** — 환자 상태(중심정맥용·말초정맥용)에 따라 농도가 다르게 출시

싸이모신 알파 1(Thymosin Alpha 1)은 면역 기능이 저하된 환자의 면역력 회복 및 항암 보조 요법으로 널리 사용되는 주사제입니다. 대표적인 오리지널 제품으로 **자탁신(Zadaxin)**이 있으며, 여러 제약사에서 제네릭이 출시되어 있습니다.

주요 효능·효과

- **면역 조절 작용** — T세포, NK세포(자연살해세포) 등 면역계 거대세포를 활성화하여 저하된 면역 기능 강화
- **항암 치료 보조** — 화학요법(항암제)·방사선 치료 시 면역 결핍 개선 및 치료 부작용 경감 목적으로 병용 투여
- **바이러스성 질환 보조** — 만성 B형·C형 간염 치료의 보조제로 사용

작용 기전

우리 몸의 면역 기관인 **흉선(Thymus)**에서 분비되는 면역 조절 물질을 인공적으로 합성한 물질입니다. 체내에 본래 존재하는 성분 이므로 인위적인 면역 과다 자극 없이, 저하된 면역 밸런스를 정상화하는 유기적인 역할을 합니다.

용법 및 용량

- **투여 방법** — 주로 피하 주사(SC)로 투여
- **투여 주기** — 환자의 상태·치료 목적에 따라 주 2~3회 등 처방이 달라지며, 전문의의 진단에 따라 결정

주요 장점 및 부작용

- **높은 안전성** — 체내 성분과 유사하여 오심·구토·탈모 같은 전신적 부작용이 거의 없음
- **부작용** — 주사 부위의 일시적인 발적·통증·부종 등이 나타날 수 있으나 대개 자연스럽게 소실

주의사항

면역증강제이므로 자가면역질환 환자나 장기 이식 후 면역억제제를 복용 중인 환자는 투여 시 주의가 필요하며, 반드시 담당 의사와 상의해야 합니다.

현대인들에게 가장 흔한 결핍 영양소 중 하나인 비타민 D를 고용량으로 한 번에 체내에 보충해 주는 주사 치료입니다. 주로 **엉덩이 근육 주사(IM)** 형태로 투여됩니다.

주요 특징 및 장점

- **성분·용량** — 대부분 비타민 D3(콜레칼시페롤) 성분이며, 보통 10만 IU~30만 IU 사이의 고용량
- **지속 기간** — 한 번 맞으면 체내 지방 조직에 저장되어 약 **3개월(2~4개월)** 동안 서서히 방출되며 혈중 농도를 유지
- **편의성** — 매일 챙겨 먹기 번거롭거나 알약 삼키기 힘든 분, 위장 장애로 경구 흡수율이 떨어지는 분에게 효과적

권장 대상

- 혈액 검사에서 비타민 D 결핍(20 ng/mL 미만) 또는 심한 결핍(10 ng/mL 미만)으로 나온 분
- 골다공증 예방·치료가 필요한 중장년층 및 갱년기 여성
- 실내 활동이 많아 햇빛 받을 기회가 거의 없는 직장인·학생
- 면역력이 쉽게 떨어지거나 만성 피로감을 느끼는 분

혈중 비타민 D 수치 등급

1단계 · 결핍
0~20 ng/mL 미만

2단계 · 부족
20~30 ng/mL 미만

3단계 · 충분
30~100 ng/mL 이상

주의사항 및 부작용

- **과다 투여 주의** — 비타민 D는 지용성이라 몸에 축적됨. 과다 투여 시 고칼슘혈증(구토·설사·신장 결석) 발생 가능
- **사전 검사 필수** — 반드시 혈액 검사로 현재 혈중 비타민 D 수치를 확인하고 의사 진단에 따라 주기·용량 결정

비타민 C 주사(고용량 비타민 C 정맥 주사, IVNT)는 구강 섭취 대비 혈중 농도를 빠르게 높일 수 있어 피로 회복이나 면역력 강화 목적으로 자주 활용되는 영양 주사요법입니다.

주요 기대 효과

- **강력한 항산화·피로 회복** — 만성 피로를 유발하는 활성산소를 제거하고 에너지 대사를 도와 지친 몸을 빠르게 회복
- **면역 기능 강화** — 면역 세포(백혈구 등)의 활성을 도와 감기 예방·면역력 저하 개선
- **피부 개선·콜라겐 합성** — 멜라닌 색소 생성을 억제해 잡티·기미 완화, 콜라겐 합성 촉진으로 피부 탄력 개선

고용량 주사 시 반드시 알아야 할 점

비타민 C는 수용성이라 대개 안전하게 배출되지만, 주사(정맥 투여)로 고용량을 맞을 때는 다음을 주의해야 합니다.

- **혈관통(통증)** — 고농도 수액이 들어갈 때 혈관 삼투압 차이나 pH 때문에 찌릿하거나 빠근한 통증 발생 가능. 투여 속도 조절로 대부분 완화
- **수분 섭취 필수** — 이뇨 작용 자극. 주사 전후로 물을 충분히 마셔 탈수·어지러움 예방
- **G6PD 결핍증 확인** — 유전 질환인 'G6PD 결핍증' 환자가 고용량 비타민 C를 맞으면 급성 용혈성 빈혈 같은 심각한 부작용 가능. 사전 확인 필수
- **신장 결석 내력** — 비타민 C 대사 과정에서 수산(Oxalate) 생성. 신장 결석 병력이 있는 분은 용량 설정 시 의료진과 상의 필수

요약

피로도가 높거나 면역력이 떨어졌을 때 빠른 컨디션 회복을 돕는 유용한 요법. 다만 개인의 신장 기능·체질에 따라 적정 용량·속도를 맞춰야 하므로 반드시 전문 의료진의 진료·처방을 통해 진행해야 합니다.

비타민 B 주사(마늘주사·활력주사)는 피로 회복과 체력 증진을 위해 병원에서 자주 찾는 대표적인 정맥주사(IV) 요법입니다. 주로 비타민 B1(티아민)·B6(피리독신)·B12(코발라민) 등 세포 대사와 신경 기능에 필수적인 성분들이 고용량으로 포함되어 있습니다.

주요 성분 및 기대 효과

- **비타민 B1(티아민·활성형)** — 탄수화물을 에너지로 전환. 체내 젖산 등 피로 물질이 쌓이는 것을 막아 육체 피로·근육통·관절통 완화 (주사 시 특유의 마늘 냄새로 마늘주사라는 별명)
- **비타민 B6 & B12** — 신경 세포 보호와 적혈구 생성을 도와 신경통·손발 저림·만성 무기력증·빈혈 증상 완화
- **만성 피로 회복** — 정맥을 통해 고농도의 영양소를 직접 공급하여 흡수 속도가 빠르고 효과를 신속하게 체감

권장 대상

- 과도한 업무·스트레스로 만성 피로에 시달리는 분
- 부족한 수면으로 집중력이 떨어지고 무기력한 분
- 격렬한 운동·활동 후 근육통·신체 피로가 심한 분
- 구내염이 자주 발생하거나 피부 거칠어짐이 고민인 분

주의사항 및 부작용

대부분 수용성 비타민이라 필요 이상의 양은 소변으로 안전하게 배출되지만, 몇 가지 주의점이 있습니다.

- **혈관통 및 일시적 증상** — 투여 속도가 빠르면 혈관 통증·메스꺼움·홍조·어지러움이 일시적으로 나타날 수 있으므로 천천히 맞는 것이 좋음
- **기저질환자 주의** — 신장 기능 저하, 특정 성분 알레르기, 당뇨·고혈압 등 만성 질환자는 투여 전 의료진과 상세 상담 필요

피부 미백과 피로 회복 목적으로 많이 찾는 영양 주사입니다.

주요 성분 및 원리

- **주성분** — 글루타치온(Glutathione)
- **원리** — 체내에서 생성되는 강력한 항산화 물질. 피부를 어둡게 만드는 유멜라닌 활성을 억제하고 피부를 밝게 만드는 페오멜라닌 생성을 유도하여 피부톤을 맑게 개선

기대 효과

- **피부 미백·톤 개선** — 잡티 완화, 전반적 안색 개선
- **항산화·노화 방지** — 유해한 활성산소 제거로 세포 노화 억제
- **간 기능 개선·피로 회복** — 간의 해독 작용을 도와 만성 피로 완화
- **면역력 강화** — 면역 세포 활성화 도움

시술 주기 및 주의사항

- **일반적 주기** — 보통 주 1~2회씩, 최소 5회~10회 이상 꾸준히 투여했을 때 눈에 띄는 효과 기대 (개인차 있음)
- **부작용·유의점** — 드물게 식욕부진·구토·발진 등이 나타날 수 있음. 유허 성분 알레르기가 있는 경우 시술이 제한될 수 있으므로 사전 상담 필요

본래 백옥주사는 **간 기능 개선 치료제**로 허가된 의약품이며, 미백 목적으로는 비급여(미용) 시술로 분류됩니다.

백옥주사와 함께 대표적인 항산화·미용 영양 주사로 꼽히는 시술입니다.

주요 성분 및 원리

- **주성분** — 치옥트산(Thioctic acid) 또는 알파리포산(α -Lipoic acid)
- **원리** — 체내에서 생성되는 강력한 항산화 물질로 비타민 C·E의 수싯 배에 달하는 항산화력을 가짐. 세포 내 에너지 대사를 촉진하여 체지방 증가 억제·노화 방지

기대 효과

- **체지방 감소·다이어트 보조** — 당질 대사 및 에너지 소비를 촉진하여 체지방 축적 방지, 식욕 억제 도움
- **피로 회복·활력 증진** — 만성 피로와 몸이 무거운 증상을 완화하고 활력 회복
- **피부 탄력·노화 방지** — 강한 항산화 작용으로 활성산소 제거, 피부 탄력 개선 및 톤 개선
- **냉한 체질 개선** — 혈액 순환을 도와 체온 상승·부종 완화

시술 주기 및 주의사항

- **일반적 주기** — 보통 주 1~2회, 총 10회 내외로 진행하며 개인의 피로도·목적에 따라 조절 (백옥주사·감초주사와 병행 가능)
- **부작용·유의점** — 드물게 발진·가려움·구토·어지러움 등이 나타날 수 있음

당뇨 환자 주의

혈당을 낮추는 경향이 있어 당뇨 약을 복용 중이거나 저혈당 증세가 있는 분들은 시술 전 반드시 의료진과 상담해야 합니다.

본래 이 주사는 **심한 피로·독성 물질 해독·당뇨병성 다발성 신경염 치료**로 허가된 의약품이며, 미용 목적으로는 비급여 시술입니다.

※ 백옥주사와 신데렐라주사는 서로 보완적인 효과가 있어 병원에서 연계 마케팅이나 패키지로 많이 활용됩니다.

태반주사(Placenta Injection)는 사람의 태반에서 추출한 영양 성분(아미노산·비타민·미네랄·효소 등)을 정제하여 만든 주사제입니다. 주로 항노화·피로 해소·피부 개선 등을 목적으로 사용됩니다.

주요 효능·기대 효과

- 갱년기 증상 완화 — 안면홍조·불면증·우울증 등 여성 갱년기 증상 개선 (식약처 허가 효능)
- 만성 간 기능 개선 — 간 세포 재생 도움, 독소 해독 (식약처 허가 효능)
- 피로 해소·활력 증진 — 풍부한 아미노산·비타민이 체내 대사 촉진, 만성 피로 감소
- 피부 개선·항노화 — 멜라닌 색소 형성 억제로 기미 완화, 콜라겐 합성 촉진으로 피부 탄력 향상
- 통증·염증 완화 — 항염증 작용으로 만성 통증·관절염 증상 완화 목적으로 병행

태반주사의 종류

구분	라이넥 (Laennec)	멜스몬 (Melsmon)
주요 성분	태반 가수분해물 (영양 성분 중심)	태반 추출물 (자궁내막 증식 성분 등 포함)
주요 목적	간 기능 개선, 만성 피로 해소, 항염증	갱년기 증상 개선, 피부 미용
투여 방법	피하 또는 근육 주사	주로 피하 주사

부작용 및 주의사항

안전한 주사제이지만 개인 체질에 따라 부작용이 나타날 수 있으므로 전문의 상담이 필수입니다.

- 일시적 반응 — 주사 부위 통증·발적·부종·멍 등이 나타날 수 있으나 보통 수일 내 소실
- 알레르기 반응 — 체질에 따라 발진·가려움증·두드러기 발생 가능

주의해야 할 분

암 환자(특히 유방암·자궁암 등 호르몬성 질환), 임신부·수유부는 투여 전 반드시 의사와 상의해야 합니다.

안전성 참고

국내에서 사용되는 태반주사는 엄격한 감염병 검사(HIV·간염 등)와 고온 고압 멸균 공정을 거쳐 생산되므로 바이러스·감염병 감염 우려가 매우 낮습니다. 전문 의료기관에서 정품을 투여받는 것이 가장 중요합니다.

14

마늘주사 (푸르셀티아민)

마늘주사(Alinamin Injection)는 마늘 성분이 직접 들어있는 것이 아니라, 비타민 B1(티아민) 유도체인 '**푸르셀티아민 (Fursultiamine)**'이 주성분인 영양 주사입니다. 주사를 맞을 때 목구멍과 코끝에서 마늘 냄새가 은은하게 올라온다고 해서 '마늘주사'라는 별명이 붙었습니다.

피로 해소와 활력 충전을 위해 직장인·운동선수들이 자주 찾는 대표적인 정맥주사 요법입니다.

주요 효능·효과

- **만성 피로 해소** — 비타민 B1은 체내 탄수화물 대사를 도와 에너지를 생성하는 핵심 역할. 젖산 등 피로 물질이 쌓이는 것을 막아 체력 회복
- **신경통·근육통 완화** — 근육과 신경에 쌓인 피로를 풀어주어 근육통·관절통·신경통 증상 완화
- **면역력·대사 증진** — 신진대사 촉진으로 면역력 향상, 병후 회복기·체력 저하 시 빠른 영양 공급

일반 비타민 B1과의 차이

일반 비타민 B1은 수용성이라 몸에 잘 흡수되지 않고 쉽게 배출되는 경향이 있습니다. 반면 마늘주사의 성분인 '**푸르셀티아민**'은 **지용성 유도체**로 변형되어 있어 체내 흡수율이 매우 높고 조직에 오래 머무르며 효과를 발휘합니다. **뇌장벽(BBB)**을 통과해 뇌의 피로를 풀어주는 데도 탁월합니다.

부작용 및 주의사항

대체로 안전한 주사제이지만, 개인 체질에 따라 주의가 필요합니다.

- **마늘 냄새** — 주사 중 마늘 향이 나며, 보통 주사가 끝난 후 얼마 지나지 않아 자연스럽게 사라짐 (본인만 느끼는 경우가 많음)
- **혈관통** — 약물 주입 시 주사 부위가 빠근하거나 통증이 느껴질 수 있으므로 투여 속도를 천천히 조절
- **알레르기 반응** — 드물게 발진·가려움증·구역질·오한 등의 과민 반응 가능

본 자료는 원내 실무자의 용어 이해를 돕기 위한 참고용 안내서입니다.
실제 처방·투여 경로·용량 및 급여 여부는 환자 상태와 최신 기준에 따라 의료진이 판단합니다.

JEONGJIN PHARMA · 주사제 전문 도매