




발 표

정신증을 위한 인지행동치료(CBTp)의 이해

발 표 자

현진희(대구대학교 사회복지학과 교수)



현 진 희
대구대학교 사회복지학과 교수
국제트라우마스트레스학회(ISTSS) 이사
경북소방공무원 찾아가는 상담실 단장
(前)한국정신건강사회복지학회 회장
(前)한국트라우마스트레스학회 회장

What is Psychosis? 정신증이란 무엇인가?

신증은 '현실과의 접촉 상실'이 특징인 일시적인 정신 기능의 손상 상태로,
일상 기능 저하를 초래

또한, 정신증은 현실과의 접촉 상실이 두드러지는 다양한 경험들을 포함하는
포괄적인 개념

* 본 발표자료는 Grace Eun Lee, PhD 교수(Stanford University)의 CBTp 훈련자료를 수정 보완하였음.



Positive Symptoms: Unusual Thinking/Delusions

- 무엇이 현실이고 무엇이 상상인지 혼란스러움
- 관계사고
- 초자연적인 것에 대한 집착 (예: 텔레파시, 유령, UFO)
- 기타 비정상적인 생각:
사고 조작, 신체 관련 생각, 과대평가된 믿음, 조종망상
- 의심이 많아짐




Photo: NAMI, 2021

양성 증상: 지각 이상 / 환각

- 빛과 소리에 대한 민감도가 증가함
- 다른 사람은 듣지 못하는 소리를 들음
- 다른 사람은 보지 못하는 것을 봄
- 다른 사람은 경험하지 않는
냄새, 맛, 촉감 등의 이상 감각을 느낌




Image generated with DALL-E in ChatGPT



양성 증상: 와해된 의사소통


- 요점을 전달하기 어렵고, 문장을 목표에 맞게 정리하는 데 어려움이 있음
- 대화 중에 주제가 벗어나거나 말이 길어짐
- 부적절한 단어 사용, 관련 없는 주제 이야기
- 이상하거나 어색한 말하기



Photo: Victorium: www.shutterstock.com

음성 증상

- 사회적 위축: 혼자 있는 시간을 더 선호함
- 무의욕: 무언가를 할 동기가 없음
- 무쾌감증: 즐거움을 느끼기 어려움
- 정서 둔마: 감정 표현과 강도가 감소함
- 빈약한 사고/언어말과 생각이 줄어들음






CBT의 목표

- **Identify** unhelpful patterns of thoughts and behaviors 도움이 되지 않는 사고와 행동 패턴을 확인하기 (Identify)
 - 도움되는 것: 클라이언트의 가치, 목표, 원하는 결과와 일치함
 - 도움이 되지 않는 것: 클라이언트의 가치, 목표, 원하는 결과와 일치하지 않음
 - 단기 및 장기 목표에 대한 이해가 필요함
 - 행동에 영향을 주는 자동적 사고에 대한 인식이 필요함
- **Change** unhelpful patterns by: 도움이 되지 않는 패턴을 변화시키기 (Change)
 - 더 균형 잡히고 현실적인 생각을 통해 자동적 사고에 도전하기
 - 고통스러운 생각과 감정을 다루기 위한 더 건강한 행동 찾기
- **Strengthen** new, more positive core beliefs 새로운 긍정적인 핵심 믿음을 강화하기 (Strengthen)
 - 과거 경험(증거)을 다시 평가하기
 - 더 건강한 행동을 연습하기
 - 현재 상황에서 새로운 믿음을 지지하는 증거 찾기
 - 나는 가치 있는 사람이다” “사람들은 믿을 수 있다” “미래에는 좋은 일이 있을 것이다”

CBTp의 목표





CBTp의 근거 기반

- 서비스 이용자들에게 높은 수용도를 보임(Morrison et al., 2004)
- 양성 증상과 음성 증상을 감소시키고 기능적 결과를 향상시킴(Wykes et al., 2008)
- 입원 기간을 감소시킴(Jolley et al., 2003)
- 정신증 위험군에서 CBT는 12개월 시점에서 정신증으로의 전환을 예방함 (Stafford et al., 2013)
CBTp는 지연된 효과를 보이며, 추적 관찰 시 가장 큰 호전을 보임 (Sarin et al., 2011)
- CBTp는 임상적으로 유의미한 호전을 보이며, 위협 지각과 관련된 뇌 영역의 활성화 감소와 관련됨(Kumari et al., 2011)
- 항정신병 약물 없이 시행한 CBTp에서도, TAU 대비 CBTp 집단의 평균 PANSS 점수가 유의하게 더 낮음 (Morrison et al., 2014)

추가 연구가 필요한 영역:

- CBTp의 핵심 작용 요소
- 치료 반응을 예측하는 클라이언트 특성의 확인
- 필요한 치료 회기 수

CBTp의 역사

1952년 Beck에 의해 처음 소개됨

However...

정신증 치료 개입으로는 대체로 간과됨

- 생물학적/의학적 모델의 우세
- 1980년대 연구에서 대화 치료가 정신증 환자에게 해롭다고 보고됨
- '정신증은 '정상적인 심리적 기능'의 범위를 벗어난다는 오랜 가정



CBTp 기반 FIRST 기술

- **F**orming a relationship 관계 형성
 - 공동의 목표를 설정하기
 - 경험을 정상화하기
- **I**nquire Curiously 호기심을 가지고 탐구하기
 - 가정을 내려놓고 질문하기
- **R**ewind the information and put it together 정보를 검토하고 통합하기
 - 공동의 이해를 통해 경험을 의미 있게 정리하기
- **S**kill development 기술 개발
 - 목표 달성을 돕는 기술과 도구를 개발하기
- **T**ry out the skill and elicit feedback 기술을 시도하고 피드백을 이끌어내기
 - 클라이언트가 스스로 기술을 연습하도록 격려하고, 그 결과에 대해 피드백을 나누기

Forming a relationship 관계 형성




Image generated by ChatGPT



Normalization: Psychoeducation

정상화: 심리교육

- “정상화는 낙인에 대한 해독제이다”
- 파국화하지 않기
 - 정신질환은 흔한 경험임 (4명 중 1명)
 - 정신증은 나이, 인종, 성별, 사회경제적 수준과 관계없이 누구에게나 발생할 수 있음
 - 많은 사람들이 증상을 극복할 수 있음
 - 문화에 따라 증상이 긍정적으로 해석될 수도 있음

정상화: CBT

- CBT는 본질적으로 정상화를 포함함
 - 우리는 모두 부정적인 생각을 경험함
- 우리는 모두 도움이 되지 않는 사고를 함
 - 우리는 항상 건강하지는 않은 방식으로 대처하기도 함

CBT는 정신병적 증상 역시 정상화할 수 있도록 도움을 줌



Biopsychosocial Model of Psychosis 정신증의 생물심리사회적 모델

Biological factors 생물학적 요인

- 유전/가족력
- 정신증에 대한 특정 단일 유전자는 없음

Psychological factors 심리적 요인

- 부정적인 핵심 믿음, 성급한 결론 내리기, 외부 귀인 편향

Socio-environmental factors 사회환경적 요인

- 초기/현재의 외상 경험
- 삶의 사건 및 일상 스트레스
- 낙인, 인종차별, 차별, 괴롭힘
- 낙인, 인종차별, 차별, 괴롭힘
- 가족 관계
- 물질 사용

Cooke, 2017; Kingdon & Turkington, 2008; Mullen, 2021; Rethink Mental Illness, 2022

Stress-Vulnerability Model 스트레스-취약성 모델





Figure 1. Stress-vulnerability model (Zubin & Spring, 1977)



Psychosis Exists on a Continuum

정신증은 연속선상에 존재합니다



Vulnerability Factors 취약 요인:

- Stress 스트레스
- Drugs 약물
- Trauma외상
- Life experiences 삶의 경험
- Sleep deprivation 수면 부족

No psychosis

Psychosis

정신증 없음 → 정신증 있음

Normalization: Lived Experience

정상화: 당사자 경험

- Research and read personal recovery stories
연구 자료를 참고하고 개인의 회복 경험 이야기를 읽기
 - Elyn Saks
 - John Nash
 - Eleanor Longden
 - Rufus May
 - OnTrack NY, [Voices of Recovery](#)




Inquire Curiously 호기심을 가지고 탐구하기

How to inquire curiously 호기심을 가지고 탐구하는 방법

- 진심으로 호기심을 가지기
 - 질문하기
 - 경청하기
- 정신증을 직접적으로 반박하거나 동의하지 않기
- 추측하지 않기
 - 질문하기
- 다양한 설명과 경험에 열려 있기
 - 하나 이상의 관점이 있을 수 있음
 - “정답”은 없음
- 모든 가능성을 탐색하기



Review the Information and Put it Together (Formulation) 정보를 검토하고 종합하기 (개념화)




What is a formulation? 개념화란 무엇인가?

- 평가를 통해 수집된 정보를 조직화하는 방법
- 현재의 어려움과 초기 경험 간의 연결을 제시함
- 증상의 발생 시점과 유지 요인을 설명하려고 함
 - 클라이언트의 상황에 대한 이해와 관심을 보여 치료적 관계를 강화할 수 있음
- 정신증을 하나의 모델로 설명하기보다 이해를 탐색하도록 도움
- 개입을 위한 방향을 설정함
- 협력적으로 개발됨



Essential ingredients of CBTp case conceptualization CBTp 사례 개념화의 핵심 요소

- 사례 개념화는 지나치게 복잡하지 않아야 함
 - (클라이언트의 필요와 치료 단계에 맞게 적절한 수준의 복잡성이 필요함)
- 문제를 유지시키는 요인에 초점을 맞추기 – 변화에 도움을 줌
 - 클라이언트의 해석과 증상 경험에 초점을 두는 것이 중요함
 - 개념화는 클라이언트와 협력적으로 개발되어야 함



Spencer et al., 2020

개념화는 CBTp 역량 개발의 핵심

- 인지치료 척도-개정판(Cognitive Therapy Scale – Revised)으로 측정됨
- 항목 10: 개념적 통합
 - 클라이언트가 자신의 문제의 역사, 촉발 요인, 유지 요인을 이해하도록 도와 현재와 미래의 변화를 이끌어야 함
 - 치료자는 클라이언트가 자신의 지각, 해석, 믿음, 태도, 규칙이 문제와 어떻게 관련되어 있는지 이해하도록 도와야 함 또한 과거와 현재의 인지와 대처 전략을 함께 탐색해야 함
 - 이러한 이론적 이해는 잘 통합되어 치료 방향을 이끄는 데 활용되어야 함

Blackburn et al., 2001



Formulation Considerations 개념화시 고려사항

- 위험 요인
- 급성 고통 상태
- 치료 참여에 대한 위협 요소
- 개념화 공유에 대한 고려
- 개념화가 미치는 영향에 대한 고려

Formulations we will focus on today 오늘 다룰 개념화

정신증에 대한 다양한 사례 개념화 모델

- Stress Bucket 스트레스 버킷
- Maintenance Formulation 유지 개념화
- Longitudinal Formulation 종단적 개념화
- Team Formulation 팀기반 개념화



The Stress Bucket 스트레스 버킷

스트레스 버킷이란 무엇인가

- 스트레스-취약성 가설에 기반함
- 스트레스의 영향을 시각적으로 보여주고, 스트레스가 가득 찼을 때 우리가 하는 행동이 도움이 되는지(또는 방해가 되는지) 이해하도록 돕는 방법

언제 스트레스 버킷을 사용하는가

- 치료 초기의 좋은 사례 개념화 도구
- 스트레스 요인 탐색
- 도움되지 않는 대처 방식 탐색
- 도움이 되는 대처 방식 확인

언제 사용하지 않는가

- 과거 경험을 설명할 때는 적절하지 않을 수 있음 (필요시 적용할 수는 있음)
- 클라이언트가 도움이 되지 않거나 너무 단순하다고 느낄 경우




Stress Bucket 스트레스 버킷



Adapted from UNSW Counseling Services & Carver et al., 1989

Stress Bucket 스트레스 버킷



The Maintenance Formulation 유지 개념화

유지 요인 개념화란 무엇인가?


- 개인이 목표를 향해 나아가는 것을 방해하는 문제를 유지시키는 요인을 파악하는 방법


언제 유지 요인 개념화를 사용하는가?

- 치료 초기 단계에서 유용함
- 문제를 유지시키는 요인에 대한 이해를 높임
- 목표에 맞는 개입을 설정하는 데 도움

언제 사용하지 않는가


- 명확한 목표가 없을 때
- 명확한 문제가 정의되지 않았을 때






Maintenance Formulation 유지 개념화

유지 개념화 - 00씨 사례





Longitudinal Formulation 종단적 개념화

종단적 개념화란 무엇인가?

- 초기 경험과 핵심 믿음이 현재 문제의 발생과 유지에 어떤 역할을 하는지 이해하는 방법


언제 종단적 개념화를 사용하는가?

- 초기 경험의 역할에 대한 이해를 돕기 위해
- 정신증을 극단적인 상황에 대한 이해 가능한 반응으로 정상화하기 위해
- 경험을 함께 탐색하고 의미를 이해하도록 돕기 위해

언제 사용하지 않는가


- 치료 목표와 맞지 않을 때
- 치료 지속 여부가 불확실할 때






(Morrison, 2001)

Longitudinal Formulation





Team Based Formulation 팀 기반 개념화

팀 기반 개념화란 무엇인가?

- 여러 출처에서 정보를 종합하여 팀의 이해와 치료 계획을 지원하는 방법


언제 팀 기반 개념화를 사용하는가?

- 팀 내 다양한 역할 간의 공통된 이해를 형성하기 위해
- 팀 구성원들의 다양한 관점을 고려하기 위해
- 팀 기반의 폭넓은 치료 계획을 지원하기 위해

언제 사용하지 않는가

- 평가 과정에서 충분한 정보가 수집되지 않았을 때






Cognitive and Behavioral Interventions


인지 및 행동 개입

변화 기법의 적용은 CBTp 역량 개발에 핵심적

- Measured by the Cognitive Therapy Scale – Revised
- Item 11: Application of change methods 항목 11: 변화 기법의 적용
 - 치료자는 개념화에 맞는 적절한 인지적·행동적 기법을 능숙하게 사용하고, 클라이언트가 이를 사용할 수 있도록 돕는다
 - 치료자는 클라이언트가 고통과 관련된 핵심 사고와 행동을 평가할 수 있도록 적절한 인지적·행동적 방법을 함께 개발하도록 돕는다
 - 이러한 기법들은 클라이언트가 사고를 실제로 검증하고, 강한 감정을 다루는 경험을 쌓도록 돕는다
 - 개입의 적절성을 고려한다
 - 다양한 기법을 고려한다
 - Cognitive methods: 사고 변화 기록지, 연속선 기법, 거리두기, 책임 분배표, 대안 평가, 장단점 분석, 의미 탐색
 - Behavioral methods: 행동 기록지, 행동 실험, 단계적 과제, 역할극, 모델링, 이완 훈련, 대처 기술

Blackburn et al., 2001





사고기록지 검토							
Date & Time 날짜 및 시간	Situation 상황	Automatic Thoughts 자동적 사고	Emotions 감정	Behaviors 행동	Unhelpful Thinking Pattern 비도움적인 사고 패턴	Alternative Thoughts 대안적 사고	Outcome 결과
When did this event happen? 이 사건은 언제 발생했나요?	Describe the difficult event as objectively as you can 가능한 한 객관적으로 어려운 상황을 설명해 보세요	What thoughts came to your mind? Rate belief in automatic thought (0-100%) 어떤 생각이 떠올랐나요? 그 생각을 얼마나 믿는지 (0-100%) 평가해 보세요	What emotions did you feel (Sad, angry, afraid, anxious, disgust, etc)? Rate the intensity of the emotion (0-100%) 어떤 감정을 느꼈나요? (슬픔, 분노, 두려움, 불안 등) 감정의 강도를 (0-100%)로 평가해 보세요	What action urges did you notice? 어떤 행동 충동이나 행동을 하게 되었나요?	All-or-nothing thinking; Overgeneralization; Disqualifying the positive; Jumping to conclusion; Magnification; Minimization; Emotional reasoning; "Should" statement; Labelling; Personalization 흑백논리적 사고; 과잉 일반화; 긍정 무시하기; 성급한 결론 내리기; 확대 해석; 축소 해석; 감정적 추론; 당위적 사고; 낙인찍기; 개인화	Are the automatic thoughts unhelpful and/or unrealistic? If so, what are more helpful and/or realistic thoughts? 자동적 사고가 비현실적이거나 도움이 되지 않나요? 그렇다면 더 도움이 되고 현실적인 생각은 무엇일까요?	How might you respond/act differently given the alternative thought? What changed in response to the alternative thought? 대안적 사고를 바탕으로 어떻게 다르게 반응하거나 행동할 수 있을까요? 무엇이 달라졌나요?



Automatic Thoughts 자동적 사고	Unhelpful Thinking Pattern 비도움적인 사고 패턴	사고기록지 검토
What the voices (auditory hallucinations) say about me "Nobody likes you" and "You're strange" are true 80% 목소리(환청)가 나에 대해 하는 말, "아무도 너를 좋아하지 않아", "너는 이상해"는 사실인 것 같다 (80%)	흑백논리적 사고 - 아무도 나를 좋아하지 않는다고 말하는 것은 극단적인 생각이다. 어떤 사람들은 나를 좋아할 수도 있다. 과잉 일반화 - "이상하다"는 매우 일반적인 표현으로, 나의 모든 모습을 설명하지는 않는다. 긍정 무시하기 - 나에게도 좋은 점들이 있다.	감정적 추론 - 지금 내가 불안하고 사회적으로 긴장되어 있어서, 그 목소리가 더 사실처럼 느껴지는 것일 수 있다. 당위적 사고 ("~해야 한다") - 나는 절대 창피해지면 안 된다고 생각하기 때문에 스스로에게 더 엄격하게 대하고 있는 것 같다.

Alternative Thoughts 대안적 사고	Outcome 결과	사고기록지 검토
나는 불안하고 자신이 없을 때 목소리가 더 부정적으로 변한다는 것을 알고 있다. 비록 "아무도 나를 좋아하지 않아", "나는 이상해"라는 목소리를 들더라도, 그것이 사실이라는 뜻은 아니다.	나를 좋아하는 사람들도 있다. 나는 친절하고, 배려심 있고, 따뜻한 사람이다 사회불안을 느낄 때 대처 기술을 사용하기 (심호흡하기, 잠시 쉬기, 천천히 하기) 부정적인 생각에 대한 반대 근거를 스스로 떠올리기 (수진이는 나를 좋아한다, 이웃도 나를 좋아한다) 자기연민적인 말과 긍정적인 자기확언을 스스로에게 말해주기 (“나는 최선을 다하고 있다”)	



Evidence For/Against 근거 탐색 (찬성/반대)

인지적 재구조화

Thought: The team leader likely doesn't like me 팀장님은 나를 별로 좋아하지 않는 것 같다 (75 %)

Evidence For 근거 (찬성)	Evidence Against 근거 (반대)
I asked an embarrassing question 당황스러운 질문을 했다 He seemed annoyed 짜증난 것처럼 보였다 He didn't return my email right away 이메일을 바로 답장하지 않았다	The team leader told me I did a good job on my report yesterday 어제 팀장님이 내 보고서를 잘했다고 말씀해주셨다 The team leader was sick yesterday so maybe he is tired today 팀장님이 어제 아프셨다고 하셨으니까 오늘은 피곤하실 수도 있다 The team leader asked me how my weekend was 팀장님이 주말 잘 보냈냐고 물어보셨다

Belief: The team leader likely doesn't like me 팀장님은 나를 별로 좋아하지 않는 것 같다 (45%)

Alternative possibilities: 다른 가능성

The team leader may have been confused by my response, but that does not mean he doesn't like me anymore 팀장님이 내 답변 때문에 헷갈렸을 수 있지만, 그렇다고 해서 나를 싫어하는 것은 아니다

The team leader is sometimes in a bad mood, so it may not be personal 팀장님도 가끔 기분이 안 좋을 수 있어서 개인적인 문제가 아닐 수도 있다

행동실험

Behavioral Experiment 행동실험

Thought to be tested: 검증할 생각

I am someone who ruins the atmosphere 나는 분위기를 망치는 사람이다

Belief in thought (0-100%) 생각에 대한 믿음 (0-100%)		Before 실험 전 experiment :		After 실험 후 experiment:	
		65%		40%	
Experiment 실험 내용	Likely problems 예상되는 어려움	Strategies to deal with problems 어려움에 대처하는 방법	Expected outcome 예상 결과	Actual outcome 실제 결과	Alternative thought 대안적 사고



행동실험

Experiment 실험 내용	Likely problems 예상되는 어려움	Strategies to deal with problems 어려움에 대처하는 방법
I will go to the local cafe, order a latte and sit down at a table. I will observe and note how many people immediately leave the cafe after I sit down 나는 동네 카페에 가서 라떼를 주문하고 자리에 앉을 것이다. 그리고 내가 앉은 후에 얼마나 많은 사람들이 바로 카페를 떠나는지 관찰하고 기록할 것이다. Planned date/time: 3/31/2026, Tuesday at 11:30am 계획된 날짜/시간: 2026년 3월 31일 (화) 오전 11시 30분	I will be too scared to go to the cafe 카페에 가는 것이 너무 무서울 것 같다 The cafe will not have enough people for me to do this experiment 이 실험을 하기에는 카페에 사람이 충분히 없을 것 같다	Use my coping skills to relax, shorten the amount of time I plan to be there from 30 minutes to 15 minutes if I need to 대처 기술을 사용해서 긴장을 완화하고, 필요하면 머무르는 시간을 30분에서 15분으로 줄이기 Stay if there are at least 5 people. If less than 5 people, then try again at a busier time 사람이 최소 5명 이상 있으면 그대로 머무르기. 5명보다 적으면, 더 바쁜 시간에 다시 시도하기.

행동실험

Expected outcome 예상 결과	Actual outcome 실제 결과	Alternative thought 대안적 사고
I will go to the local cafe and everyone around me will get up and leave. They will sense that I am strange and immediately get up to leave. 나는 동네 카페에 가면 주변 사람들이 모두 자리에서 일어나 떠날 것이다. 사람들은 내가 이상하다는 것을 느끼고바로 일어나서 나를 피할 것이다.	(After the experiment is complete) 4 people stayed at their table and continued to work and I don't think they even noticed me. 1 person got up but they went to the restroom. I accidentally dropped my napkin and 1 person picked it up and gave it to me with a smile. (실험 후) 4명은 자리에 그대로 앉아서 일을 계속했고, 나를 알아차린 것 같지도 않았다. 1명은 자리에서 일어났지만 화장실에 간 것이었다. 나는 실수로 냅킨을 떨어뜨렸는데, 한 사람이 그것을 주워주면서 미소를 지어 주었다	Not everyone reacted to me—most people stayed and didn't even notice me 모든 사람이 나에게 반응한 것은 아니고, 대부분은 자리에 그대로 있었고 나를 신경 쓰지 않았다 People are likely focused on themselves, not judging me 사람들은 나를 평가하기보다 자기 일에 더 집중하고 있을 가능성이 크다



행동실험

인지적 개입 : 행동 실험을 통해 비합리적인 생각 검증하기

검증해야 할 생각 : 사람들은 나를 이상하게 볼 거야

실험	예측	생길 수 있는 문제	문제를 극복할 전략	실험의 결과	검증하려고 하는 사고를 결과가 지지하는 정도 (1~100%)
같은 수업을 듣는 사람들에게 먼저 인사하기	내가 인사를 해도 아무도 반응을 안해 줄 것이다	1. 사람들이 나의 인사에 반응을 해도 내가 어떻게 대화를 이어 나갈지 몰라 당황스러울 수 있음 2. 내가 인사를 해도 반응이 없을 수 있음	1. 만났을 때 먼저 인사를 하고 상대방이 받아주면 어떻게 반응할지 미리 연습하고 실행 봄 (예- 인사를 받아주면, 날씨, 과제수행여부, 무엇을 하며 지냈는지 물어보며 대화 이어가기) 2. 그 사람이 못 봤을 수도 있으니 다시 인사를 하거나 다른 아는 사람에게 인사를 한다	수업을 듣는 세사람이 인사를 받아 줌 한사람은 인사를 받아주지 않음(휴대폰을 보느라 인내가 인사하는지 몰랐을 수 있음)	사람들은 나를 이상하게 볼 것이다. 20%

행동적 개입 :

사회기술훈련 : 먼저 인사하기,
상대방의 생각을 알아보기 위해 직접 질문하기 등
대처기술강화 : 대처하는 혼잣말
대인관계기술 : 대화기술훈련
환청 대처 기술
실제 상황 노출 기법 (사회불안
망상의 기저 기능에 대한 행동 중심적 접근

이럴 때는 어떻게 하나요?

사람들의 시선을 회피
혼자 휴대폰만 쳐다 봄
부정적인 목소리에 귀 기울이기



Behavioral Change Methods: Coping Skills

환경 대처 기술

행동 변화 기법: 대처 기술

- 이완 훈련
 - 깊은 호흡 (예: 박스 호흡)
 - 점진적 근육 이완
 - 심상 유도
- 취미 및 관심 활동 참여하기
 - 음악 듣기
 - 재미있는 영상 보기
 - 그림 그리기
 - 기분 좋은 사진 보기
 - 산책하기

Behavioral Change Methods: Coping Skills

환경 대처 기술

행동 변화 기법: 대처 기술

- 귀마개 사용하기
 - 청각적 입력을 변화시킴
 - 한쪽 귀마개를 착용하거나 빼는 것이 도움이 되었다는 보고가 많음
- 현실 검증하기
 - 목소리가 실제인지 확실하지 않을 때 녹음해보기
 - 믿음을 검증하기 (예: 목소리가 친구가 나에게 화났다고 말하면, 실제로 그런지 먼저 친구에게 확인해보기)
- 목소리에 주의 기울이기
 - 목소리의 내용을 기록하고 반복되는 주제 파악하기
 - 유발 요인에 주의하기: 목소리가 나타나기 직전에 일어나는 상황들
 - 목소리에 대한 정보 기록하기 (예: 강도, 빈도, 지속 시간, 크기 평가)



Behavioral Change Methods: Coping Skills

환청 대처 기술

행동 변화 기법: 대처 기술

- Subvocalization
 - 입으로 할 활동을 마음속으로 수행하기 (예: 숫자 세기, 노래하기)
- 목소리와 ‘타임아웃’ 협상하기
 - 목소리에 주의를 기울이는 것을 미루기
 - 나중에 들어주겠다고 하며 지금은 떠나달라고 요청하기
- 목소리 뒤에 있는 감정 이해하기
 - 특정한 감정을 느낄 때 목소리가 나타나는지 살펴보기
 - 목소리를 유발하는 요인은 무엇인지 탐색하기
- 목소리에 친절하게 대응하기
 - 고통을 줄이는 데 도움이 될 수 있음
 - 목소리를 놀라게 할 수도 있음!

Behavioral Change Methods: Coping Skills

환청 대처 기술

행동 변화 기법: 대처 기술

- 대처 카드
 - 도움이 되는 생각과 행동을 정리한 대처 카드를 만들어 항상 가지고 다니기
- 긍정적인 목소리
 - 긍정적이고 건설적인 목소리를 찾아보기
 - 긍정적인 목소리는 어떤 말을 할 수 있을까?
- 긍정적인 생각
 - 목소리가 들릴 때 자신에 대해 긍정적인 생각 하기
 - 자신에게 친절하고 따뜻하게 대하기



In Vivo Exposure Intervention for Social Anxiety 실제 상황 노출 기법 (사회불안)

목표 행동: 시선을 피하고 대신 휴대폰을 사용하는 행동

불안이 낮은 단계부터 높은 단계까지 실제 상황 노출 단계 만들기

For example...


낮은 불안: 동네 카페에 15분 앉아 있기, 60초 동안 휴대폰 내려놓기, 주변을 잠깐 둘러보기

낮은-중간 불안: 고개를 들어 한 사람과 짧게(1-2초) 눈 맞추기, 2분 동안 휴대폰을 주머니에 넣어두기

중간 불안: 눈 맞추고 가볍게 고개를 끄덕이거나 미소 짓기, 5분 동안 휴대폰 사용하지 않기

중간-높은 불안: 눈 맞추고 “안녕하세요”라고 말하기, 간단한 질문하기, 휴대폰을 가방에 넣어두기

높은 불안: 눈 맞추고 짧은 대화 시작하기, 휴대폰을 가방에 넣어두기



망상의 기저 기능을 다루는 행동

Delusion 망상	Underlying Function 기저 기능	Proposed Behaviors 제안된 행동
사람들이 나를 해치려 한다 (피해망상/편집증)	안전하지 않다고 느낌; 위협에 대한 민감도가 높음	안전감을 높이는 행동과 대처 전략을 증가시키기
나는 우리 마을/집단의 지도자이다 (과대망상)	목적감/의미감을 느끼지 못함; 수치심/무력감을 가림	실제적인 역할과 책임을 늘리기; 수치심 다루기
유명인이 광고나 음악을 통해 나에게 메시지를 보낸다 (색정망상/관계망상)	정서적으로 연결되거나 돌봄을 받는 느낌이 없음; 무효화 경험	타인과의 연결을 증가시키고 고립을 줄이기

*가능한 기저 기능은 개인마다 다를 수 있습니다. 이러한 기능이 망상을 완전히 설명하지는 않지만, 고통을 유발하는 요인에 대한 통찰을 제공하며 이는 치료 개입에 도움이 됩니다.



망상의 기저 기능을 다루는 행동

Delusion 망상	Underlying Function 기저 기능	Proposed Behaviors 제안된 행동
나는 수백만 명과 소통할 수 있다 (과대망상)	정서적으로 연결되지 못함; 환청 경험을 이해하려는 시도	타인과의 연결을 증가시키고 고립을 줄이기; 정신증에 대한 심리교육 제공
나는 임신했고 배 속의 아기를 느낄 수 있다 (신체망상)	목적감을 느끼지 못함; 신체적 불편감/불안 가능성	불안을 더 잘 관리하고, 역할과 책임을 늘리며, 사람들과의 연결을 강화하기

*가능한 기저 기능은 개인마다 다를 수 있습니다. 이러한 기능이 망상을 완전히 설명하지는 않지만, 고통을 유발하는 요인에 대한 통찰을 제공하며 이는 치료 개입에 도움이 됩니다.

정서적 개입:

긍정적인 정서 경험 증가:
즐거워 활동 하기
감사일기 쓰기
성취감을 높이기 위해 성취 기록지를 작성하기

기분이 어떨까요?

난처함
부끄러움



정서적 개입 Emotional Intervention

정서적 개입 : 나를 위한 즐거운 활동하기 Pleasant Activities

- Client가 우울, 슬픔, 걱정에서 벗어나 일상에서 긍정적인 감정을 경험 또는 인식할 수 있도록 즐거운 활동하기 과제를 내어주고 점검함
- 즐거운 활동하기는 Client의 반추 사고에서 벗어나는데도 도움을 줄 것이라 기대함

날 짜	내 용
5/27	헤어스타일 바꿈
5/28	돼지고기 사다가 요리해서 엄마랑 같이 먹음
5/30	음악감상. 아이스크림 먹기
6/2	그늘에 서서 신호등 신호 기다리기
6/1	오늘 한 일 잘 완수했고 폭 쉬라고 응원의 문구 적기
날 짜	내 용
6/10	머리집게 사러 시내가기, 쇼핑하기, 저녁에 두끼 먹기 내가 좋아하는 펜으로 과제 하기
6/13	햄버거 먹기
6/14	스티커 정리하기, 쿠키 사먹기, 유튜브 보기
6/15	노래 들으면서 샤워하기,
6/16	볶음밥 해먹기

정서적 개입 Emotional Intervention

정서적 개입 : 매일 매일 감사하기 Gratitude

- Client의 우울, 슬픔 등의 부정적인 정서 감소와 긍정적인 정서 확장을 위해 시행
- 부정적인 자동사고와 주의편향에서 벗어나 균형있게 바라보도록 함
- Client의 긍정적인 변화(사고, 감정, 행동)확인에도 유용

날 짜	내 용
6/10	- 좋아하는 노래를 들을 수 있어 감사하다 - 과제를 잘 채우려고 하는 나에게 감사하다
6/12	- 발이 안 아프다는 것에 감사한다. - 노을 빛이 너무 예쁘고 분위기가 좋고 덜 더운 것에 감사한다.
6/13	- 무사히 집에 도착해서 감사하다 - 관심있는수업을 들을 수 있어서 감사하다.
6/14	- 발목이 많이 나아서 감사하다. - 마음이 진정하잔 대로 잘 진정되어서 감사하다 - 머리가 많이 길어서 기분이 좋다.
6/15	- 허투루 시간을 보내지 않을 거라는 생각을 하는 내 자신에게 감사하다. - 이제는 여름을 싫어하지 않는 것 같아 자신에게 감사하다
6/16	- 오늘 할 일을 무사히 마친 나에게 감사하다 - 노래가 아름다워 감사하다.



정서적 개입 Emotional Intervention

성취감 향상: Boosting Mastery

Win Log (성취 기록지)

오늘 제시간에 일어났다
사람에게 먼저 인사를 했다
수업에 끝까지 참여했다
부정적인 생각이 들었지만 참고 지나갔다
카페에서 15분 동안 앉아 있었다
불안했지만 예정된 활동에 참여했다
새로운 사람과 짧게 대화를 했다
환청이 들렸지만 바로 반응하지 않고 지켜봤다
발표를 끝까지 해냈다
사고기록지를 작성했다

THANK YOU