

약제 요양급여의 적정성 평가결과

mitotane 500mg

(리소드렌정500밀리그램, 비엘엔에이치(주))

☐ **제형, 성분.함량:**

- 1 정 중 mitotane 500mg

☐ **효능 효과:**

- 수술이 불가능한 기능성 및 비기능성 부신피질암종

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제1차 약제급여평가위원회: 2021년 2월 4일

- 암질환심의위원회 심의일: 2020년 11월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “수술이 불가능한 기능성 및 비기능성 부신피질암종”에 허가받은 약제로, 단독 요법 관련 임상적 유용성을 입증할만한 근거수준이 높은 임상연구 결과가 부족하고, 소요 비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “수술이 불가능한 기능성 및 비기능성 부신피질암종”로 허가 받은 약제로, 부신피질암 현행치료에 cisplatin + etoposide 요법이 사용되고 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “수술이 불가능한 기능성 및 비기능성 부신피질암종”에 허가받은 정제로, 1일 2~6g을 3~4회로 분할 경구 투여함.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 부신피질암 치료제로 언급되어 있고, 제외국 가이드라인⁴⁾⁵⁾에서 전이성 부신피질암 단독, 병용요법으로 모두 추천되고 있으며, 부신피질암 수술 후 보조 요법으로도 소개되고 있음.
- 다만, 허가적응증인 단독요법 관련하여 개발 된지 오래된 약제임에도 불구하고 근거 수준이 높은 임상연구결과가 없음.⁶⁾

○ [mitotane 단독 요법, 단일군]⁷⁾ 18세 이상, 진행성 부신피질암 환자를 대상, 단일군 cohort 연구로 1997년부터 2016년 동안 4개월 이상 mitotane 투여를 받은 127명의 환자를 모집하여 분석한 결과, mitotane을 사용한 환자들의 전체생존기간 중앙값은 5개월(range 1.3~220개월), 무진행생존기간 중앙값은 4.1개월(1.0~73개월), 반응률은 20.5%이었음.

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침, 학회 의견, 전문가 자문 등을 참고하여 신청품의 대체약제로 cisplatin + etoposide 병용 요법을 선정함.
- 신청품의 주기 당(3주) 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제 소요비용인 ■■■■■원~■■■■■원 대비 고가임.

○ 재정 영향⁸⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁰⁾ 1차년도와 3차년도 모두 동일하게 약 ■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도와 3차년도 모두 약 ■■■■억원이 증가할 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도와 3차년도 모두 약 ■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 영국, 이탈리아, 프랑스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.¹³⁾

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e (2017)
- 3) Cancer, 11th
- 4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Neuroendocrine and Adrenal Tumors Version 2.2020.
- 5) Martin Fassnacht et al. Adrenocortical carcinomas and malignant pheochromocytomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2020 [in press]
- 6) 2020년 제8차 암질환심의위원회(2020.11.25.)
- 7) Felix Megerle et al. mitotane monotherapy in patients with advanced adrenal cortical carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2018;103:1686-1695
- 8) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 9) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 ■■■정, 2차년도 ■■■정, 3차년도 ■■■정
- 10) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 11) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 ■■■정, 2차년도 ■■■정, 3차년도 ■■■정,
- 12) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액
- 13) 프랑스 약가는 정확한 외국 책자 금액(PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE)을 확인할 수 없는바, 조정평균가 산출시 제외하고 산출함