

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

beroctocog alfa 500IU

(그린진주500단위, 녹십자)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- beroctocog alfa 500IU
- 이 제제는 혈액응고 제8인자를 함유하는 무취의 백색 또는 담황색 분말이 무색 투명한 바이알에 든 주사제로 첨부된 주사용수로 용해하면 무색 또는 담황색의 액상이 된다

☐ **효능 효과 :**

- 혈우병 A 환자의 출혈 증상의 조절과 지혈 및 일상 생활 또는 수술 시 출혈 예방, 이 약은 von Willebrand 인자 결핍증 환자에게는 사용하지 않는다.

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2009년 제10차 약제급여평가위원회: 2009년 9월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “혈우병 A환자의 출혈 증상의 조절과 지혈 및 일상 생활 또는 수술 시 출혈 예방”에 허가받은 혈액응고 제8인자 제제로, 주성분이 동일한 대체약제와 투약비용이 동일하므로 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “혈우병 A 환자의 출혈 증상의 조절과 지혈 및 일상 생활 또는 수술 시 출혈 예방”에 허가받은 제제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하나, 현재 동일 적응증에 허가받은 혈액응고 제8인자제제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성 평가

- 교과서¹⁾나 임상진료지침²⁾에 의하면 혈우병 A 환자 치료시 혈액응고 제8인자 제제의 투여가 권장됨
- 대체약제와의 비교임상시험자료는 없어 제품간 기능적 차이는 판단하기 어려우나³⁾ 대체약제와 주성분이 동일하며, 관련학회에서도 신청품이 기등재된 대체약제와 기능적으로 차이가 없음⁴⁾으로 회신받았음
- 급성출혈 시 치료시험(공개, 비비교, 다기관, 제 3상 임상시험)에 참여한 피험자(n=70)에 대한 시험자의 최종 지혈효과 평가 결과 효과우수(Excellent)가 35명(50%), 효과 좋음(Good)이 26명(37.1%), 효과미흡(Moderate)이 9명(12.9%), 효과없음(None)이 0명(0.0%)이었으며, 유효율은 87.1% (79.3, 95.0)이었음(ITT)⁵⁾
 - 신청품의 허가시 제출한 임상시험자료의 지혈효과에 대한 유효율과 기존 임상문헌의 연구결과 신청품의 경우 시험자의 유효율이 87.1%였고, 시험자와 피험자가 함께 평가한 리팍토와 애드베이트는 96%, 86%였음

○ 비용효과성 평가

- 신청품의 대체약제는 허가사항, 급여기준, 학회의견등을 고려하여 기등재된 유전자 재조합 혈액응고 제8인자제제로 선정함
- 신청품의 1일 투약비용은 []원⁶⁾으로 대체약제의 1일 투약비용인 []원과 동일함

○ 재정 영향 검토

- 신청품 투여 대상환자수는 1차년도(2010년)에 약 ■■■7)명에서 3차년도에 약 ■■■명으로 증가할 것으로 예상되며, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, 신청품의 도입후 기존재원 유전자 재조합 혈액응고 제8인자제제의 대체로 재정소요금액의 증감은 없을것으로 예상됨⁹⁾

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 등재국가는 없음

Reference

- 1) Harrison's Internal Medicine(17th), Cecil Medicine, 23rd ed.
- 2) Guidelines for the Management of Hemophilia : World Federation of Hemophilia(WFH)
- 3) 식약청 회신내용(■■■■■)
- 4) 대한혈전지혈학회 (■■■■■)
- 5) 치료경험이 있는 혈우병 A형 환자를 대상으로 재조합 사람 혈액응고 제8인자(그린진주[®])의 유효성 및 안전성 평가를 위한 공개, 비비교, 다기관, 제 3상 임상시험
- 6) 허가사항 중 용량스케줄에서 언급된 요구되는 제8인자 활성치 20~100IU/dl의 중간값인 60IU/dl와 성인 60kg기준으로 산출한 투여량($60\text{kg} \times 60\text{IU/dl} \div 2 = 1800\text{IU}$)과 1일 투여횟수(1일 8~24시간마다 투여 반복→ 중간값인 1일 2회)로 1일 투약비용산출함
- 7) 2006~2008년 대체약제의 청구환자수를 이용하여 가중이동평균으로 구함
- 8) 제약사 예상사용량×제약사 요구가
- 9) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)