

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

doravirine 0.1g, lamivudine 0.3g, tenofovir disoproxil fumarate (as tenofovir disoproxil 0.245g)
(텔스트리고정, 한국엠에스디(주))

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1정 중 doravirine 0.1g,
lamivudine 0.3g,
tenofovir disoproxil fumarate (as tenofovir disoproxil 0.245g)

☐ **효능 효과 :**

- 이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제5차 약제급여평가위원회: 2021년 6월 3일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2021년 4월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제5차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하나, 소요비용이 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/정) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■원/정) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료.”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 tenofovir 성분, lamivudine 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인 환자들의 HIV-1 감염 치료.”에 허가받은 항레트로바이러스 복합제로, 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NRTI: lamivudine, TDF¹⁾)와 비 뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NNRTI: doravirine)로 구성됨²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 임상진료지침⁷⁾⁸⁾에서 항레트로바이러스요법으로서 신청품을 권고하고 있음.

① 치료 경험이 없는 환자 대상

- [DRIVE-AHEAD, 48주 임상]⁹⁾ ART 경험이 없는 HIV-1 감염 성인 환자(신청품군 n=368, EFV¹⁰⁾/FTC¹¹⁾/TDF군 n=366)¹²⁾를 대상으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 비열등성¹³⁾ 검정 3상 임상시험을 수행하여 대조군(EFV/FTC/TDF군) 대비 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 48주시점에서의 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군 84.3%, 대조군 80.8%이었으며, 사전 지정된 10% 비열등성 마진¹⁴⁾을 충족하여 신청품군이 대조군 대비 비열등한 것으로 나타남(Difference = 3.5% 95% CI: -2.0, 9.0)
 - 2차 유효성 평가지표인 48주시점에서의 HIV-1 RNA<40 copies/mL 환자 비율은 신청품군 83.8%, 대조군 79.7%, HIV-1 RNA<200 copies/mL인 환자 비율은 신청품군에서 86.0%, 대조군에서 82.7%로 나타남.
 - 사전 명시해둔 신경정신계 이상사례 중 어지럼증, 수면장애, 변형된 감각중추 부작용 범주에서는 대조군 대비 신청품군에서 유의한 감소를 보임.
- ✓ 기저치 대비 48주 시점 LDL-C(신청품군 -1.6 vs 대조군 8.7), non HDL-C(신청품군 -3.8 대조군 13.3) 평균 변화량(mg/dL)에서 유의한 차이를 보였음.

- [DRIVE-AHEAD, 96주 연장시험]¹⁵⁾ DRIVE-AHEAD 임상시험 대상 환자군(신청품군 n=368, EFV/FTC/TDF군 n=366)을 대상으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 비열등성¹⁶⁾ 검정 3상 임상시험을 수행하여 대조군(EFV/FTC/TDF군) 대비 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 96주시점에서의 HIV-1 RNA<50 copies/mL달성 환자 비율 또한 48주 시점 결과와 같이 비열등성을 입증함.(Difference = 3.8% 95% CI: -2.4, 10.0)
 - 2차 유효성 평가지표인 HIV-1 RNA<40 copies/mL 환자 비율은 신청품군에서 76.1%, 대조군에서 72.8%, HIV-1 RNA< 200 copies/mL인 환자 비율은 신청품군에서 80.2%, 대조군에서 74.7%로 확인됨.
- ✓ 기저치 대비 96주 시점 공복 저밀도 지단백 콜레스테롤수치 (신청품군 -0.6 vs 대조군 10.8), non-HDL-C 수치(신청품군 -2.1 vs 대조군 15) 평균 변화량(mg/dL) 모두 48주 결과와 유사하게 나타남.

② 치료 경험이 있는 환자 대상

- [기존치료 받던 환자 대상, DRIVE-SHIFT]¹⁷⁾ 기존 치료를 받던 성인 HIV-1 감염 환자¹⁸⁾(신청품군 n=450, 기존 치료군 n=223)를 대상으로 무작위배정, 다기관, 공개라벨, 비열등성 검정 3상 임상시험을 수행하여 신청품군 치료 변경효과 및 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군이 기존 치료군 대비 비열등한 것으로 나타남(Difference 3.8%, 95% CI: -7.9, 0.3)
 - ✓ 24주 시점 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율은 신청품군 93.7%, 기존 치료군 94.6%(Difference = -0.9% ; 95% CI: -4.7, 3.0), 24~48주 HIV-1 RNA<50copies/mL인 환자 비율은 신청품군 90.8% 기존 치료군 94.7%로 나타남.
 - ritonavir-boosted PI를 기존 치료군 대비 신청품의 기저치 대비 24주 시점 공복 LDL-C (신청품군 -16.5 vs 기존치료제군 -1.9, difference -14.7; p<0.0001), non-HDL-C(신청품군 -24.7 vs 기존치료제군 -1.3, difference -23; p<0.0001) 평균 변화량(mg/dL)에서 유의한 차이가 나타남.

○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여, 동일 적응증인 HIV-1 감염 치료에 허가받은 유사 약리기전 약물 조합요법인 rilpivirin(RPV) + TAF¹⁹⁾/FTC, efavirenz(EFV) + TAF/FTC, rilpivirin + TDF/FTC, efavirenz + TDF/FTC, rilpivirin + TDF/3TC²⁰⁾, efavirenz + TDF/3TC, rilpivirin + ABC²¹⁾/3TC, efavirenz + ABC/3TC 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제(요법)와 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 환자 비율 등 효과가 유사하고, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로 대체약제 가중소요비용인 ■■■원²²⁾ 대비 고가임.



- 26) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 27) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 ■정, 2차년도 ■정, 3차년도 ■정
- 28) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액