

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

miconazole 50mg

(로라믹구강정50밀리그램(미코나졸), (주)한독약품)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 miconazole 50mg

☐ 효능 효과 :

- <적응증> 면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료

- <유효균종>

C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. pseudotropicalis

그람양성균(*Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Erysipelothrix insidiosa*)

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2013년 제2차 약제급여평가위원회 : 2013년 2월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2013년 제2차 약제급여평가위원회평가결과: 조건부 비급여

- 신청품은 “면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료”에 허가받은 약제로, 교과서 및 가이드라인에서 1차 치료제로 권장되는 국소제제의 필요성이 인정되나 대체약제 대비 투약비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 잇몸 점막에 부착하여 작용하는 국소제제로 fluconazole 경구제와 함께 구강인두 칸디다증의 일차치료제로 추천됨¹⁾²⁾.
- 구강칸디다의 증상이나 임상 징후를 나타내는 방사선치료를 받는 두경부암환자(282명)를 대상으로 한 3상 임상시험에서 신청품과 miconazole oral gel의 14일째 치료성공율³⁾을 비교한 결과 신청품 56%, miconazole oral gel 48.9%로 비열등하였음(95% CI -19~4.8; 비열등성마진 4.8%; $p < 0.0001$)⁴⁾
- 18세 이상 HIV 양성인 구강인두칸디다환자(578명)를 대상으로 신청품 1일1회와 clotrimazole 10 mg troches 1일 5회를 무작위, 이중맹검⁵⁾으로 14일간 투여하였을 때 1차 변수인 임상적 치료율(clinical cure, days 17-22)⁶⁾은 신청품은 clotrimazole 대비 비열등하였음[ITT군 (신청품 61% vs clotrimazole 65%), PP군 (68% vs 74%)].⁷⁾
- 신청품과 경구 대체약제와의 직접비교 임상시험이 없으며, 각 임상시험의 대상환자군, 동반질환 등과 관련한 이질성이 존재하여 대체약제와의 상대적인 임상적 유용성 비교가 어려움.⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾

○ 비용 효과성

- 현재 급여되고 있는 국소치료제는 없으며, 신청품을 포함한 국소제제 및 fluconazole 경구제가 1차 치료제로 권고되고 itraconazole solution은 대부분 2차 치료제로 권고되므로¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾ 신청품의 대체약제는 “fluconazole 경구제”임.
- 투약비용 비교시, 신청품의 일일소요비용은 ■■■원으로, 대체약제인 fluconazole 경구제(■■■원)보다 고가임.
 - 신청품의 대체약제 가중평균가로 환산한 금액은 ■■■원/정임.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, fluconazole 캡슐의 대체로 인한 재정

소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약■■■원 증가될 것으로 예상됨.¹⁹⁾

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이며, fluconazole 캡슐의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 영국, 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) HIV/AIDS Treatment and Care: Clinical protocols for the WHO European Region 2007
- 2) Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2009
- 3) complete clinical response 또는 partial clinical response를 보이는 환자의 비율
- 4) Bensadoun et al. Comparison of the efficacy and safety of miconazole 50-mg mucoadhesive buccal tablets with miconazole 500-mg gel in the treatment of oropharyngeal candidiasis; Cancer 2008; 112: 204-211
- 5) Randomized, comparative, double-blind, double-dummy, multicenter trial (phase 3)
- 6) The co-primary efficacy endpoints were clinical cure at test of cure (TOC) visit (days 17-22) in the intent-to-treat (ITT) and per protocol (PP) populations. The Murray scale was used to rate extent of lesions (0 = none to 3 = extensive) and symptoms (0 = absent to 3 = severe).
- ※ Clinical cure: Complete resolution of OPC(Oropharyngeal candidiasis) signs (lesions) and symptoms (soreness/burning) (Murray scores of 0)
- 7) Vazquez JA, et al. Randomized, comparative, double-blind, double-dummy, multicenter trial of miconazole buccal tablet and clotrimazole troches for the treatment of oropharyngeal candidiasis: study of miconazole Lauriad® efficacy and safety (SMiLES). HIV Clin Trials. 2010 Jul-Aug;11(4):186-96
- 8) Phillips et al. A double-blind comparison of itraconazole oral solution and fluconazole capsule for the treatment of oropharyngeal candidiasis in patients with AIDS. Clinical Infectious Disease 1998;26:1368-1373
- 9) Bensadoun et al. Comparison of the efficacy and safety of miconazole 50-mg mucoadhesive buccal tablets with miconazole 500-mg gel in the treatment of oropharyngeal candidiasis; Cancer 2008; 112: 204-211
- 10) Vazquez JA, et al. Randomized, comparative, double-blind, double-dummy, multicenter trial of miconazole buccal tablet and clotrimazole troches for the treatment of oropharyngeal candidiasis: study of miconazole Lauriad® efficacy and safety (SMiLES). HIV Clin Trials. 2010 Jul-Aug;11(4):186-96
- 11) Harrison's Internal Medicine 18th (online)
- 12) NCCN Practice Guidelines in oncology v.1.2012
- 13) Clinical Practice Guidelines for the Management of Candidiasis: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America(IDSA guidelines); CID 2009;48 (1 March)
- 14) Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2009
- 15) HIV/AIDS Treatment and Care: Clinical protocols for the WHO European Region 2007
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 절대재정소요금액 = 제약사제시 신청품 예상사용량 × 신청가
- 18) 대체로 인한 재정소요금액 = 제약사제시 신청품예상사용량 × (신청가-대체약제 투약비용)
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20) 절대재정소요금액 = 신청품 예상사용량 × 대체약제 가중평균가