

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Betaine Anhydrous 180g (시스타단, 한국희귀의약품센터)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 병 중 Betaine anhydrous 180g

☐ 효능 효과 :

- CYSTADANE은 호모시스틴뇨증 환자에서 상승된 혈중 homocysteine 수치의 감소에 사용된다. 이는 다음 요소의 결핍증 또는 장애에 따른 호모시스틴뇨증을 포함.
 1. cystathionine beta-synthase (CBS)
 2. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR)
 3. cobalamin cofactor metabolism (cbl)
- CYSTADANE에 대한 환자의 반응 정도는 homocysteine의 혈중농도를 통해 모니터링될 수 있다. (용법용량참조) 반응은 대개 1주안에 나타나며, 1달 안에 항정상상태(steady state)가 됨.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

제7차 약제급여평가위원회 : 2007년 8월 17일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 7월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 급여의 적정성이 있음.
 - 호모시스틴뇨증이 희귀난치성질환에 해당하고 pyridoxine에 반응하지 않는 환자에게 동일 기전의 대체 약제가 없으므로 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제에 해당하여 급여로 평가됨.
- 급여기준(안)
 - 생화학적 검사 또는 유전자 검사로 호모시스틴뇨증이 확진된 환자에게 투여시 요양 급여를 인정함.

나. 평가 내용

- 진료상 반드시 필요한 약제 여부
 - 호모시스틴뇨증(아미노산 대사의 기타장애)는 희귀·난치성질환에 해당하며, pyridoxine에 반응하지 않는 환자에게 동일 기전의 대체가능 약제가 없으므로 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제에 해당함.
- 임상적 유용성 평가
 - 관련 교과서¹⁾²⁾, 임상문헌³⁾ 및 학회의견 등 참고 시 pyridoxine에 반응하지 않는 환자의 homocystine을 감소시키는데 효과적임.
 - 학회의견에 의하면 대체 가능 약품은 없는 실정이므로 생화학적 검사 또는 유전자 검사로 확진된 호모시스틴뇨증(혈증) 환자에게 반드시 필요한 약제라는 의견임.⁴⁾
- 비용효과성 및 재정영향 평가
 - 호모시스틴뇨증 06년 희귀의약품센터 제출 환자수 6명에 [REDACTED] [REDACTED] 해당함.

Reference

- 1) Harrison's PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE Sixteenth Edition, 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 2) 홍창의 소아과학 제8판, 대한교과서
- 3) The American journal of clinical nutrition 2002 Nov76;5:961-7
- 4) 대한의학유전학회(2007-6, 2007. 4. 10)