

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

L-asparaginase 10,000 I.U (에르위나제주, 한국비엘엔에이치)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1 바이알 중 L-asparaginase 10,000I.U

☐ 효능 효과 :

- 급만성 백혈병, 악성 임파종

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2007년 제10차 약제급여평가위원회 : 2007년 10월 19일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2007년 10월 2일
- 암질환심의위원회 심의일 : 2007년 10월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 기존 E. coli L-asparaginase와의 비교임상 논문에서 EFS(event free survival) 및 재발율 등의 효과가 통계적으로 유의하게 낮았으나, Coagulation abnormality 이상반응은 개선되어, 기등재된 E coli L-asparaginase에 과민반응이 있는 경우 고가의 비용에 대한 근거가 부족하므로 비용효과성이 불분명하여 비급여로 평가됨.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 심평원장 공고『항암화학요법』에 따르면 급만성 백혈병 및 악성임파종에 사용되는 요법이 다수 공고되어 있으며, 이중 신청품을 포함하지 아니한 요법도 다수 있으므로 환자의 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성 평가

- ALL(Acute lymphocytic leukemia)로 진단된 700명의 환자를 대상으로 신청품과 E. coli L-asparaginase의 비교 임상논문에서 Coagulation abnormality는 E. coli L-asparaginase(30.2%)가 신청품(11.8%)보다 높으나($p < 0.0001$),
- EFS(event free survival)는 신청품군에서 더 짧으며(6년 후의 비율 : 59.8%, 73.4% ; $P = 0.0004$) 재발율은 신청품 군에서 1.5배 정도 높고, 완전관해에 도달하지 않은 환자는 E. coli군에서는 1.2%(4명) 신청품 투여군에서는 3.8%(12명)로($P = 0.042$) 기존 E. coli L-asparaginase에 비하여 효과가 열등함.¹⁾
- E.coli L-asparaginase에 과민반응이 있는 환자에 에르위나제를 투여하였을 때 22.6%의 과민반응이 일어남.²⁾

○ 비용효과성 평가

- 비교약제는 E.coli L-asparaginase(로이나제주) 10,000KIU로 선정함.
- 신청품은 비교약제보다 과민반응률은 적으나 효과가 열등하고 비용만 고려시 기존 비교약제보다 [REDACTED] 고가로 검토되나, 비용효과성에 대한 경제성 평가 자료등 높은 비용에 대한 근거 자료가 제출되지 않아 비용효과성이 불분명한 것으로 평가됨.

○ 보험재정에 미치는 영향

- E.coli L-asparaginase의 과민반응을 보이는 시점이 개인간의 차이가 크고, 투여방법이 식약청 허가 사항과 교과서에 따라 다르며, 과민반응률의 범위가 넓어 정확한 사용량을 예측하기 곤란하여,
- 한국희귀의약품센터에서 2006년 10월부터 2007년 9월까지 1년간 출고한 에르위나제 [REDACTED]을 기준으로 소요재정을 계산할 경우 E.coli L-asparaginase(로이나제주)에 비하여 [REDACTED]추가 재정소요가 예상됨.
- 한국희귀의약품센터 공급 평균가격은 [REDACTED], 희귀의약품센터 공급가보다는 [REDACTED] 고가이므로 희귀의약품센터에서 수입되는 것보다 [REDACTED] 추가 소요될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품의 제외국 등재현황에 대한 제약사 제출자료는 없으며, A7 국가에서 약가가 색인되지 아니하여 기존 E.coli L-asparaginase대비 신청가격의 약가 수준을 확인할 수 없음.

Reference

- 1) Comparison of Escherichia coli-asparaginase with Erwinia-asparaginase in the treatment of childhood lymphoid malignancies: results of a randomized European Organisation for Research and Treatment of Cancer-Children's Leukemia Group phase 3 trial.
- 2) Allergic reactions to Erwinia asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia who had previous allergic reactions to Escherichia coli asparaginase. cancer 1992 Jul 1;70(1):201-6.
- 3) 한국희귀의약품센터 제공자료