

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Tolcapone (타스마, 한국희귀의약품센터)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 Tolcapone 200mg/정

☐ 효능 효과 :

- 특발성 파킨슨병의 증상 및 징후의 치료제인 levodopa와 carbidopa에 보조제로서 사용되어짐. 상당히 치명적인 위험과 급성 급발성 간손상을 주기 때문에 통상적으로 정당한 보조적인 치료법이 없을때이거나 만족할만한 반응이 나타나지 않는 경험적 증상 변이가 나타나는 파킨슨병 환자에게 levodopa/carbidopa와 함께 사용 되어져야만 함. TASMAR가 영향을 미쳤을때는 팔목 할만한 증상의 호전을 가져오므로, 치료시작 3주안에 실질적인 치료 이익이 보이지 않을때에는 간손상 위험이 있기 때문에 TASMAR의 투여를 중단하여야함.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

제7차 약제급여평가위원회 : 2007년 8월 17일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 7월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 대체가능한 다른 약제가 있으므로 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제가 아니며 간손상 등의 심각한 부작용이 있어 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여로 평가됨.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 대체 가능 약제인 Entacapone(콤탄)이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제가 아님.

○ 임상적 유용성 평가

- 교과서 및 의약품집 등¹⁾²⁾ 수재 내역에 의하면, 심각한 간의 위험 때문에 FDA에서 다른 보조 치료제로 효과가 없거나 금기인 경우에만 사용하도록 제한되었고 유럽 시장에서 1998년에 철회함. 또한 Tolcapone은 심각한 간과 혈액의 이상반응(side effect)이 나타날 수 있기 때문에 Entacapone이 더 선호됨.
- 가이드라인³⁾⁴⁾에 의하면 COMT 억제제인 Entacapone과 Tolcapone는 항상 levodopa와 병용투여 해야 함. 간독성 때문에 Tolcapone은 초기 파킨슨병에는 권장되지 않으며 다른 가능한 모든 약제에 반응하지 않을 때에만 권장되는 약제임.
- 학회의견에 의하면 대체약으로는 동일한 작용기전을 가진 Entacapone (COMT inhibitor)을 사용할 수 있으며, Tolcapone의 간독성으로 인해 Entacapone 사용이 더 적절하다는 의견임.⁵⁾

○ 비용 효과 및 재정 영향 평가

- 일일투약비용 검토시 대체가능 약제인 콤탄과 유사한 것으로 보임.
- 06년 센터제출 환자수는 3명에 [REDACTED] 해당함.

Reference

- 1) Martindale 34th, 2005 by Pharmaceutical Press
- 2) Harrison's PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE Sixteenth Edition, 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 3) Review of the therapeutic management of Parkinson's disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Movement Disorder Society - European Section. Part I: early (uncomplicated) Parkinson's disease.
- 4) Review of the therapeutic management of Parkinson's disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) and the Movement Disorder Society-European Section (MDS-ES). Part II: late (complicated) Parkinson's disease.
- 5) 대한신경과학회(2007.06.28)