

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

dolutegravir sodium (as dolutegravir 50mg)
(티비케이정 50밀리그램, (주)글락소스미스클라인)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 dolutegravir sodium(as dolutegravir 50mg)

☐ **효능 효과 :**

- 다른 항레트로바이러스제와 병용하여 성인 및 만12세 이상의 청소년에서 인체면역결핍바이러스(HIV-1) 감염 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제2차 약제급여평가위원회 : 2016년 2월 4일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 전, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 [REDACTED] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2016년 제2차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “다른 항레트로바이러스제와 병용하여 성인 및 만12세 이상의 청소년에서 인체면역결핍바이러스(HIV-1) 감염 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하나, 투약비용이 대체약제 대비 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 다만, 급여기준안을 고려할 경우 임상적 필요성이 인정되나 대체약제 대비 소요비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로, 제약사가 [REDACTED] 원 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 약가협상생략기준금액([REDACTED] 원) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다른 항레트로바이러스제와 병용하여 성인 및 만12세 이상의 청소년에서 인체면역결핍바이러스(HIV-1) 감염 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 raltegravir, elvitegravir¹⁾, dolutegravir²⁾ 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 항레트로바이러스 제제로 치료 경험이 없는 환자에게 NRTI backbone과 병용하여 사용하도록 임상진료지침³⁾에 수재되어 있음.
- 신청품은 HIV 바이러스 DNA가 숙주세포 염색체로 통합되는 과정을 차단하는 integrase inhibitor 계열의 경구제로, 해당 계열에 내성이 없는 환자에는 1회 50mg(1정) 1일 1회 투여하며, 내성이 있는 환자에는 1회 50mg 1일 2회 투여하도록 허가받았음.
- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에 의하면, INSTI-based regimen에 신청품 포함 요법 [dolutegravir+tenofovir/emtricitabine, dolutegravir+abacavir/lamivudine(HLA-B*5701

negative 대상]]은 raltegravir+tenofovir/emtricitabine, elvitegravir+cobicistat+tenofovir/emtricitabine(pre-ART CrCl >70 mL/min 대상) 요법과 함께, AI 등급의 권고 수준을 가지는 regimen으로 추천되고 있음.

- 3상 임상시험에서 antiretroviral-naive HIV 환자 대상, HIV RNA concentration 50 copies/ml 미만 환자의 비율이 48주와 96주 시점에서 신청품과 raltegravir 투여군 간 비열등했음⁶⁾⁷⁾. Antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naive HIV 환자 대상 HIV RNA concentration 50 copies/ml 미만 환자의 비율이 48주 시점에서 신청품군은 raltegravir 투여군 대비 개선을 보였음⁸⁾. Integrase-inhibitor resistant HIV 환자 대상으로 신청품을 투여한 단일군에서 기저상태 대비 8일째 평균 혈장 HIV RNA 수치에서 감소(-1.43 log₁₀c/mL)를 보였고, HIV RNA concentration 50 copies/ml 미만 환자 비율은 24주 시점에서 69%였음⁹⁾.
- 신청품의 임상시험(2b상 및 3상)에서 가장 중증으로 관찰된 이상반응은 과민반응이었으며, 가장 흔하게 관찰된 투여 후 이상반응은 구역(15%), 설사(16%), 두통(14%)이었음¹⁰⁾.
- 관련 학회의견¹¹⁾에서는 HIV 질환이 만성 질환화됨에 따라 효과와 더불어 복약 순응도와 내성 발생, 부작용 발생 등도 치료제를 선택하는데 있어 중요한 요소가 되었고, 신청약제는 기존 약제들과 비교 시 내성에 대한 유전적 한계가 높아 내성 발생이 낮았으며, 1일 1회 복용으로 기존의 1일 2회 이상 복용 약제들에 비하여 환자의 복약순응도를 높일 수 있다는 의견이 제시됨.

○ 비용 효과성

- 허가사항, 교과서 및 임상진료지침, 학회의견 등에 따라 신청품은 동일계열인 raltegravir, elvitegravir¹²⁾, dolutegravir¹³⁾를 대체 가능할 것으로 판단되며¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾, 신청품은 raltegravir와의 직접비교 임상시험¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾에서 비열등 또는 개선을 보였고, elvitegravir 대비 직접비교 임상시험은 없었으며 일일투약횟수는 동일하였음.
- 에이즈치료제의 각테일 요법에 따른 병용약제 약품비가 고려된 신청품 포함요법의 1일 투약비용(■원)은 대체요법의 가중 1일 투약비용(■원) 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위 비용은 ■원/정이며, 이는 약가협상생략기준금액에 해당함.²²⁾

○ 재정 영향²³⁾

[신청약가 기준]

- 해당적응증의 대상 환자수²⁴⁾는 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, raltegravir, elvitegravir²⁷⁾, dolutegravir²⁸⁾의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가할 것으로 예상됨²⁹⁾.

[대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준]

- 해당적응증의 대상 환자수는 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, raltegravir, elvitegravir³⁰⁾, dolutegravir³¹⁾의 대체로 인한 재정증감분은 없을 것으로 예상됨.
- 다만, 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 스위스, 이탈리아, 일본에 등재되어있으며, 프랑스 약가집에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.

Reference

- 1) elvitegravir는 NRTI backbone(tenofovir 300mg+ emtricitabine 200mg)과 cobistat 150mg(PK enhancer)의 복합제()가 등재되어 있음.
- 2) dolutegravir(50mg)는 NRTI backboneoe(lamivudine 300mg abacavir 702mg)와의 복합제()로 등재되어 있음.
- 3) DHHS(U.S. Department of Health and Human Services) panel guideline: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents (2014. 5.)
- 4) DHHS(U.S. Department of Health and Human Services) panel guideline: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents (2014. 5.)
- 5) Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 recommendations of the International Antiviral SocietyUSA Panel. JAMA. 2014;2330;.312(4):410-25.
- 6) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. The Lancet. 2013;381:735-43
- 7) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2013;13:927-35
- 8) Pedro Cahn, et al. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naïve adults with HIV : week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. Lancet 2013;382:700-8
- 9) Garrett Nichols et al. Dolutegravir in Antiretroviral-Experienced Patients With Raltegravir- and/or Elvitegravir-Resistant HIV-1: 24-Week Results of the Phase III VIKING-3 Study. The Journal of Infectious Diseases 2014;210:354 - 62
- 10) 티비케이정50밀리그램 품목허가증 - 사용상 주의사항, 식품의약품안전처
- 11) 대한감염학회 ()
- 12) elvitegravir는 NRTI backbone(tenofovir 300mg+ emtricitabine 200mg)과 cobistat 150mg(PK enhancer)의 복합제()가 등재되어 있음.
- 13) dolutegravir(50mg)는 NRTI backboneoe(lamivudine 300mg abacavir 702mg)와의 복합제()로 등재되어 있음.
- 14) 국내 HIV 감염인의 HIV/AIDS 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안: 2013년 개정판. 대한 에이즈학회. Infect Chemother 2013
- 15) DHHS(U.S. Department of Health and Human Services) panel guideline: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents(2014. 5.)
- 16) British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2012(Updated November 2013). HIV Medicine. 2014;15(Suppl. 1):1-85
- 17) 대한화학요법학회 ()
- 18) 대한에이즈학회 ()
- 19) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results from the randomised, double-blind, non-inferiority SPRING-2 study. The Lancet. 2013;381:735-43
- 20) Raffi, F. et al. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2013;13:927-35
- 21) Pedro Cahn, et al. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naïve

adults with HIV : week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study.
Lancet 2013;382:700-8

- 22) [REDACTED]
- 23) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 24) 2015년 연간 상병코드 [REDACTED]
[REDACTED]로 [REDACTED]
[REDACTED]를 투여한 환자수(EDI 청구자료)
- 25) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED], 3차년도: [REDACTED])
- 26) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 27) elvitegravir는 NRTI backbone(tenofovir 300mg+ emtricitabine 200mg)과 cobistat 150mg(PK enhancer)의 복합제([REDACTED])가 등재되어 있음.
- 28) dolutegravir(50mg)는 NRTI backbone(lamivudine 300mg abacavir 702mg)와의 복합제([REDACTED])로 등재되어 있음.
- 29) 재정영향 = 제약사 제출 예상 사용량 x (신청품 포함요법의 일일투약비용 - 대체약제 포함 요법의 가중일일투약비용) 병용약제 약품비를 포함하여 계산하였음.
- 30) elvitegravir는 NRTI backbone(tenofovir 300mg+ emtricitabine 200mg)과 cobistat 150mg(PK enhancer)의 복합제([REDACTED])가 등재되어 있음.
- 31) dolutegravir(50mg)는 NRTI backbone(lamivudine 300mg abacavir 702mg)와의 복합제([REDACTED])로 등재되어 있음.